



গণিত

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

$$(-a) \times (-b) = ab$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

গণিত
দাখিল
সপ্তম শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মোঃ আবদুল মতিন
ড. আব্দুস ছামাদ
সালেহ্ মতিন
ড. অমল হালদার
ড. অমূল্য চন্দ্র মণ্ডল
শেখ কুতুবউদ্দিন
হামিদা বানু বেগম
এ.কে.এম শহীদুল্লাহ
মোঃ শাহজাহান সিরাজ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে গণিতের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন থেকে গুরু করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গণিতের প্রয়োগ বর্তমান সময়ে অনেক বেড়েছে। এই সব বিষয় বিবেচনায় রেখে মাধ্যমিক পর্যায়ে দাখিল সপ্তম শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তকটি সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বেশ কিছু নতুন বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লাস্তিকর অনুষণ না হয়ে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা	১ – ১৭
দ্বিতীয়	সমানুপাত ও লাভ-ক্ষতি	১৮ – ৩৭
তৃতীয়	পরিমাপ	৩৮ – ৪৯
চতুর্থ	বীজগণিতীয় রাশির গুণ ও ভাগ	৫০ – ৬৮
পঞ্চম	বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ	৬৯ – ৮৮
ষষ্ঠ	বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ	৮৯ – ১০১
সপ্তম	সরল সমীকরণ	১০২ – ১১৮
অষ্টম	সমান্তরাল সরলরেখা	১১৯ – ১২৬
নবম	ত্রিভুজ	১২৭ – ১৪৪
দশম	সর্বসমতা ও সদৃশতা	১৪৫ – ১৬১
একাদশ	তথ্য ও উপাত্ত	১৬২ – ১৬৯
	উত্তরমালা	১৭০ – ১৭৫

প্রথম অধ্যায়

মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা


বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য আমরা গণনা ও সংখ্যার সাহায্যে উপলব্ধি করি। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা, পূর্ণসংখ্যা ও ভগ্নাংশ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি যা মূলদ সংখ্যা হিসেবে পরিচিত। এ সংখ্যাগুলোকে দুটি পূর্ণসংখ্যার অনুপাতে প্রকাশ করা যায়। সংখ্যাজগতে কিছু সংখ্যা রয়েছে যেগুলো দুটি পূর্ণসংখ্যার অনুপাতে প্রকাশ করা যায় না। এগুলো অমূলদ সংখ্যা নামে পরিচিত। এ অধ্যায়ে আমরা অমূলদ সংখ্যার সাথে পরিচিত হয়ে এদের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করব।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা—

- সংখ্যার বর্গ ও বর্গমূল ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- উৎপাদক ও ভাগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্গমূল নির্ণয় করতে পারবে;
- সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে বাস্তব জীবনে সমস্যার সমাধান করতে পারবে;
- মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা শনাক্ত করতে পারবে;
- সংখ্যারেখায় মূলদ ও অমূলদ সংখ্যার অবস্থান দেখাতে পারবে।

১.১ বর্গ ও বর্গমূল

বর্গ একটি আয়ত, যার বাহুগুলো পরস্পর সমান। বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য 'ক' একক হলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে $(ক \times ক)$ বর্গ একক বা $ক^2$ বর্গ একক। বিপরীতভাবে, বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $ক^2$ বর্গ একক হলে, এর প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য হবে 'ক' একক।



চিত্রে, ৯টি মার্বেলকে বর্গাকারে সাজানো হয়েছে। সমান দূরত্বে প্রতিটি সারিতে ৩টি করে ৩টি সারিতে মার্বেল সাজানো আছে এবং মোট মার্বেলের সংখ্যা $৩ \times ৩ = ৩^2 = ৯$ । এখানে, প্রত্যেক সারিতে মার্বেলের সংখ্যা এবং সারির সংখ্যা সমান। তাই চিত্রটি বর্গাকৃতির হয়েছে। ফলে ৩ এর বর্গ ৯ এবং ৯ এর বর্গমূল ৩।

∴ কোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায়, তা ঐ সংখ্যার বর্গ এবং সংখ্যাটি গুণফলের বর্গমূল।

$$৪ = ২ \times ২ = ২^2 = ৪ \text{ (২ এর বর্গ ৪)}$$

৪ এর বর্গমূল ২

১.২ পূর্ণবর্গ সংখ্যা

নিচের সারণিটি লক্ষ করি :

বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য (মি.)	বর্গের ক্ষেত্রফল (মি ^২)
১	$১ \times ১ = ১ = ১^২$
২	$২ \times ২ = ৪ = ২^২$
৩	$৩ \times ৩ = ৯ = ৩^২$
৫	$৫ \times ৫ = ২৫ = ৫^২$
৭	$৭ \times ৭ = ৪৯ = ৭^২$
a	$a \times a = a^2$

১, ৪, ৯, ২৫, ৪৯ সংখ্যাগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো যে, এগুলোকে অন্য কোনো পূর্ণসংখ্যার বর্গ হিসেবে প্রকাশ করা যায়। ১, ৪, ৯, ২৫, ৪৯ সংখ্যাগুলো পূর্ণ বর্গসংখ্যা।

পূর্ণবর্গ সংখ্যার বর্গমূল একটি স্বাভাবিক সংখ্যা।

যেমন: ২১ এর বর্গ $২১^২$ বা ৪৪১ একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা এবং ৪৪১ এর বর্গমূল ২১ একটি স্বাভাবিক সংখ্যা।

সাধারণভাবে একটি স্বাভাবিক সংখ্যা m কে যদি অন্য একটি স্বাভাবিক সংখ্যা n এর বর্গ (n^2) আকারে প্রকাশ করা যায় তবে m বর্গসংখ্যা। m কে পূর্ণবর্গসংখ্যা বলা হয়।

বর্গসংখ্যার ধর্ম

নিচের সারণিতে ১ থেকে ২০ সংখ্যার বর্গসংখ্যা দেওয়া হয়েছে। খালি ঘরগুলো পূরণ কর।

সংখ্যা	বর্গসংখ্যা	সংখ্যা	বর্গসংখ্যা	সংখ্যা	বর্গসংখ্যা	সংখ্যা	বর্গসংখ্যা
১	১	৬	৩৬	১১	১২১	১৬	২৫৬
২	৪	৭	<input type="text"/>	১২	<input type="text"/>	১৭	২৮৯
৩	৯	৮	৬৪	১৩	১৬৯	১৮	৩২৪
৪	<input type="text"/>	৯	৮১	১৪	১৯৬	১৯	৩৬১
৫	২৫	১০	<input type="text"/>	১৫	<input type="text"/>	২০	<input type="text"/>

সারণিভুক্ত বর্গসংখ্যাগুলোর এককের ঘরের অঙ্কগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি। লক্ষ করি যে, এ সংখ্যাগুলোর একক স্থানীয় অঙ্ক ০, ১, ৪, ৫, ৬ বা ৯। কোনো বর্গসংখ্যার একক স্থানে ২, ৩, ৭, বা ৮ অঙ্কটি নেই।

কাজ

১। কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক ০, ১, ৪, ৫, ৬, ৯ হলেই কি সংখ্যাটি বর্গসংখ্যা হবে?


২। নিচের সংখ্যাগুলোর কোনগুলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা নির্ণয় কর।

২০৬২, ১০৫৭, ২৩৪৫৩, ৩৩৩৩৩, ১০৬৮, ৩৯৬৯, ১৪১৬১

৩। পাঁচটি সংখ্যা লেখ যার একক স্থানের অঙ্ক দেখেই তা বর্গসংখ্যা নয় বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।


এবার সারণি থেকে একক স্থানে ১ রয়েছে এমন বর্গসংখ্যা নিই।

বর্গসংখ্যা	সংখ্যা
১	১
৮১	৯
১২১	১১
৩৬১	১৯




একইভাবে

বর্গসংখ্যা	সংখ্যা
৯	৩
৪৯	৭
১৬৯	১৩



এবং

বর্গসংখ্যা	সংখ্যা
১৬	৪
৩৬	৬
১৯৬	১৪
২৫৬	১৬



লক্ষণীয়-

- যে সংখ্যার সর্ব ডানদিকের অঙ্ক অর্থাৎ একক স্থানীয় অঙ্ক ২ বা ৩ বা ৭ বা ৮, তা পূর্ণবর্গ নয়।
- যে সংখ্যার শেষে বিজোড় সংখ্যক শূন্য (০) থাকে, ঐ সংখ্যা পূর্ণবর্গ নয়।
- একক স্থানীয় অঙ্ক ১ বা ৪ বা ৫ বা ৬ বা ৯ হলে, ঐ সংখ্যা পূর্ণবর্গ হতে পারে। যেমন: ৮১, ৬৪, ২৫, ৩৬, ৪৯ ইত্যাদি বর্গসংখ্যা।
- আবার সংখ্যার ডানদিকে জোড়সংখ্যক শূন্য, থাকলে ঐ সংখ্যা পূর্ণবর্গ হতে পারে। যেমন: ১০০, ৪৯০০ ইত্যাদি বর্গসংখ্যা।

কাজ

১। সারণি থেকে বর্গসংখ্যার একক স্থানে ৪ রয়েছে এরূপ সংখ্যার জন্য নিয়ম তৈরি কর।

২। নিচের সংখ্যাগুলোর বর্গসংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্কটি কত হবে?

১২৭৩, ১৪২৬, ১৩৬৪৫, ৯৮৭৬৪৭৪, ৯৯৫৮০

নিচে বর্গমূলসহ কয়েকটি পূর্ণ বর্গসংখ্যার তালিকা দেওয়া হলো:

বর্গসংখ্যা	বর্গমূল	বর্গসংখ্যা	বর্গমূল	বর্গসংখ্যা	বর্গমূল
১	১	৬৪	৮	২২৫	১৫
৪	২	৮১	৯	২৫৬	১৬
৯	৩	১০০	১০	২৮৯	১৭
১৬	৪	১২১	১১	৩২৪	১৮
২৫	৫	১৪৪	১২	৩৬১	১৯
৩৬	৬	১৬৯	১৩	৪০০	২০
৪৯	৭	১৯৬	১৪	৪৪১	২১

বর্গমূলের চিহ্ন

বর্গমূল প্রকাশের জন্য $\sqrt{\quad}$ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ২৫ এর বর্গমূল বোঝাতে লেখা হয় $\sqrt{২৫}$ ।
আমরা জানি, $৫ \times ৫ = ২৫$, কাজেই ২৫ এর বর্গমূল ৫ অর্থাৎ $\sqrt{২৫} = ৫$ ।

কাজ : কয়েকটি বর্গসংখ্যার বর্গমূলের তালিকা তৈরি কর।

মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয়

১৬ কে মৌলিক গুণনীয়কে বিশ্লেষণ করে পাই

$$১৬ = ২ \times ২ \times ২ \times ২ = (২ \times ২) \times (২ \times ২)$$

প্রতি জোড়া থেকে একটি করে গুণনীয়ক নিয়ে পাই, $২ \times ২ = ৪$

$$\therefore ১৬ এর বর্গমূল = \sqrt{১৬} = ৪$$

$$\begin{array}{r} ২ \overline{) ১৬} \\ \underline{৪} \\ ১২ \\ \underline{১২} \\ ০ \end{array}$$

আবার, ৩৬ কে মৌলিক গুণনীয়কে বিশ্লেষণ করে পাই,

$$৩৬ = ২ \times ২ \times ৩ \times ৩ = (২ \times ২) \times (৩ \times ৩)$$

প্রতি জোড়া থেকে একটি করে গুণনীয়ক নিয়ে পাই, $২ \times ৩ = ৬$

$$\therefore ৩৬ এর বর্গমূল = \sqrt{৩৬} = ৬$$

$$\begin{array}{r} ২ \overline{) ৩৬} \\ \underline{৪} \\ ১৮ \\ \underline{১৮} \\ ০ \end{array}$$

লক্ষ করি : মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে কোনো পূর্ণ বর্গসংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করার সময় –

- প্রথমে প্রদত্ত সংখ্যাটিকে মৌলিক গুণনীয়কে বিশ্লেষণ করতে হবে।
- প্রতি জোড়া এক জাতীয় গুণনীয়ককে একসাথে পাশাপাশি লিখতে হবে।
- প্রতি জোড়া এক জাতীয় গুণনীয়কের পরিবর্তে একটি করে গুণনীয়ক নিয়ে গুণ আকারে লিখতে হবে।
- প্রাপ্ত গুণনীয়কগুলোর ধারাবাহিক গুণফল হবে নির্ণেয় বর্গমূল।

- (৭) ভাগফলের ঘরের সংখ্যা ৪ এর দ্বিগুণ ৪×২ বা ৮ নিচের খাড়া দাগের বামপাশে বসাই। ৮ এবং খাড়া দাগের মধ্যে একটি অঙ্ক বসানোর মতো স্থান রাখি :

$$\begin{array}{r} \overline{২৩ ০৪} \quad ৪ \\ ১৬ \\ \hline ৮ \quad \overline{৯ ০৪} \end{array}$$

- (৮) এখন একটি এক অঙ্কের সংখ্যা খুঁজে বের করি যাকে ৮ এর ডানপাশে বসিয়ে প্রাপ্ত সংখ্যাকে ঐ সংখ্যাটি দ্বারা গুণ করে ৯০৪ এর সমান বা অনূর্ধ্ব ৯০৪ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ৮ হবে। ৮ সংখ্যাটি ভাগফলেও ৪ এর ডানপাশে বসাই।

$$\begin{array}{r} \overline{২৩ ০৪} \quad ৪৮ \\ ১৬ \\ \hline ৮৮ \quad \overline{৯ ০৪} \\ \quad \overline{৯ ০৪} \\ \quad \quad ০ \end{array}$$

- (৯) ভাগফলের স্থানে পাওয়া গেল ৪৮ । এটিই নির্ণেয় বর্গমূল।

$$\therefore \sqrt{২৩০৪} = ৪৮$$

লক্ষণীয় যে, ভাগের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় করার সময় সংখ্যার ডান দিক থেকে জোড় করতে গিয়ে শেষ অঙ্কের জোড় না থাকলে, একে জোড়া ছাড়াই গণ্য করতে হবে।

উদাহরণ ৩। ভাগের সাহায্যে ৩১৬৮৪ এর বর্গমূল নির্ণয় করো।

সমাধান :

$$\begin{array}{r} \overline{৩ ১৬ ৮৪} \quad ১৭৮ \\ ১ \\ \hline ২৭ \quad \overline{২ ১৬} \\ \quad \overline{১৮৯} \\ ৩৪৮ \quad \overline{২ ৭৮৪} \\ \quad \overline{২ ৭৮৪} \\ \quad \quad ০ \end{array}$$

$$\therefore ৩১৬৮৪ \text{ এর বর্গমূল} = \sqrt{৩১৬৮৪} = ১৭৮$$

নির্ণেয় বর্গমূল ১৭৮ ।

কাজ : ১। ভাগের সাহায্যে ১৪৪৪ এবং ১০৪০৪ এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

২। ৫২৯ , ৩৯২৫ , ৫০৪১ এবং ৪৪৮৯ সংখ্যাগুলোর বর্গমূল সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক নির্ণয় করো।

বর্গসংখ্যা ও বর্গমূল সম্বন্ধে উল্লেখ্য বিষয়

- কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক থেকে শুরু করে বামদিকে এক অঙ্ক পরপর যতটি ফোঁটা দেওয়া যায়, এর বর্গমূলের সংখ্যাটি তত অঙ্কবিশিষ্ট।

লক্ষণীয় যে,

$$\sqrt{৮১} = ৯ \text{ (এক অঙ্কবিশিষ্ট, এখানে ফোঁটার সংখ্যা ১ কারণ, ৮১)}$$

$$\sqrt{১০০} = ১০ \text{ (দুই অঙ্কবিশিষ্ট, এখানে ফোঁটার সংখ্যা ২ কারণ, ১০০)}$$

$$\sqrt{৪৭০৮৯} = ২১৭ \text{ (তিন অঙ্কবিশিষ্ট, এখানে ফোঁটার সংখ্যা ৩ কারণ, ৪ ৭ ০ ৮ ৯)}$$

কাজ : ৩১৩৬, ১২৩৪৩২১ এবং ৫২৯০০ সংখ্যাগুলোর বর্গমূল কত অঙ্কবিশিষ্ট তা নির্ণয় করো।

বর্গ ও বর্গমূল সংশ্লিষ্ট সমস্যা

উদাহরণ ৪। ৮৬৫৫ থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল একটি পূর্ণ বর্গসংখ্যা হবে?

সমাধান :

$$\begin{array}{r|l} \overline{৮৬৫৫} & ৯৩ \\ ৮১ & \\ \hline ১৮৩ & \begin{array}{l} ৫ ৫৫ \\ ৫ ৪৯ \\ \hline ৬ \end{array} \end{array}$$

এখানে, ৮৬৫৫ এর বর্গমূল ভাগের সাহায্যে নির্ণয় করতে গিয়ে ৬ অবশিষ্ট থাকে।

সুতরাং প্রদত্ত সংখ্যা থেকে ৬ বাদ দিলে প্রাপ্ত সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গসংখ্যা হবে।

নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ৬

উদাহরণ ৫। ৬৫১২০১ এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণ বর্গসংখ্যা হবে?

সমাধান :

$$\begin{array}{r|l} \overline{৬৫১২০১} & ৮০৬ \\ ৬৪ & \\ \hline ১৬০৬ & \begin{array}{l} ১ ১২ ০১ \\ ৯৬ ৩৬ \\ \hline ১৫ ৬৫ \end{array} \end{array}$$

যেহেতু সংখ্যাটির বর্গমূল ভাগের সাহায্যে নির্ণয় করার সময় ভাগশেষ ১৫৬৫ আছে। কাজেই প্রদত্ত সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গসংখ্যা নয়। ৬৫১২০১ এর সাথে কোনো ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ হবে এবং তখন এর বর্গমূল হবে

$$৮০৬ + ১ = ৮০৭$$

$$৮০৭ \text{ এর বর্গ} = (৮০৭)^2 = ৮০৭ \times ৮০৭ = ৬৫১২৪৯$$

$$\begin{aligned} \text{নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি} &= ৬৫১২৪৯ - ৬৫১২০১ \\ &= ৪৮ \end{aligned}$$

অনুশীলনী ১.১

- ১। মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় কর :
 (ক) ১৬৯ (খ) ৫২৯ (গ) ১৫২১ (ঘ) ১১০২৫
- ২। ভাগের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় কর :
 (ক) ২২৫ (খ) ৯৬১ (গ) ৩৯৬৯ (ঘ) ১০৪০৪
- ৩। নিচের সংখ্যাগুলোকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে গুণফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে?
 (ক) ১৪৭ (খ) ৩৮৪ (গ) ১৪৭০ (ঘ) ২৩৮০৫
- ৪। নিচের সংখ্যাগুলোকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে?
 (ক) ৯৭২ (খ) ৪০৫৬ (গ) ২১৯৫২
- ৫। ৪৬৩৯ থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল একটি পূর্ণ বর্গসংখ্যা হবে?
- ৬। ৫৬০৫ এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণ বর্গসংখ্যা হবে?

১.৪ দশমিক ভগ্নাংশের বর্গমূল নির্ণয়

পূর্ণসংখ্যা বা অখণ্ড সংখ্যার বর্গমূল ভাগের সাহায্যে যেভাবে নির্ণয় করা হয়েছে, দশমিক ভগ্নাংশের বর্গমূলও সেই নিয়মেই নির্ণয় করা হয়। দশমিক ভগ্নাংশের দুটি অংশ থাকে। দশমিক বিন্দুর বামদিকের অংশকে অখণ্ড বা পূর্ণ অংশ এবং দশমিক বিন্দুর ডানপাশের অংশকে দশমিক অংশ বলা হয়।

বর্গমূল করার নিয়ম

- অখণ্ড অংশে একক থেকে ক্রমান্বয়ে বামদিকে প্রতি দুই অঙ্কের উপর দাগ দিতে হয়।
- দশমিক অংশে দশমিক বিন্দুর ডানপাশের অঙ্ক থেকে শুরু করে ডানদিকে ক্রমান্বয়ে জোড়ায় জোড়ায় দাগ দিতে হয়। এবূপে যদি দেখা যায়, সর্বশেষে মাত্র একটি অঙ্ক বাকি আছে, তবে তারপরে একটি শূন্য বসিয়ে দুই অঙ্কের উপর দাগ দিতে হয়।
- সাধারণ নিয়মে বর্গমূল নির্ণয়ের প্রক্রিয়ায়, অখণ্ড অংশের কাজ শেষ করে দশমিক বিন্দুর পরের প্রথম দুটি অঙ্ক নামানোর আগেই বর্গমূলে দশমিক বিন্দু দিতে হয়।
- দশমিক বিন্দুর এক জোড়া শূন্যের জন্য বর্গমূলে দশমিক বিন্দুর পর একটি শূন্য দিতে হয়।

কাজ : ১। ৫০.৬৯৪৪ এর বর্গমূল নির্ণয় করো।

২। ৭.১২ এর বর্গমূল দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করো।

১.৫ পূর্ণবর্গ ভগ্নাংশ

$\frac{৫০}{৩২}$ কে লঘিষ্ঠ আকারে লিখে পাই $\frac{২৫}{১৬}$

এখানে, $\frac{২৫}{১৬}$ ভগ্নাংশের লব ২৫ একটি পূর্ণ বর্গসংখ্যা এবং হর ১৬ একটি পূর্ণ বর্গসংখ্যা। সুতরাং $\frac{২৫}{১৬}$ একটি পূর্ণবর্গ ভগ্নাংশ।

∴ কোনো ভগ্নাংশের লব ও হর পূর্ণ বর্গসংখ্যা বা ভগ্নাংশকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিণত করলে যদি তার লব ও হর পূর্ণ বর্গসংখ্যা হয়, তবে ঐ ভগ্নাংশকে পূর্ণবর্গ ভগ্নাংশ বলা হয়।

১.৬ ভগ্নাংশের বর্গমূল

ভগ্নাংশের লবের বর্গমূলকে হরের বর্গমূল দ্বারা ভাগ করলে ভগ্নাংশের বর্গমূল পাওয়া যায়।

উদাহরণ ৫। $\frac{৬৪}{৮১}$ এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

সমাধান : ভগ্নাংশটির লব ৬৪ এর বর্গমূল = $\sqrt{৬৪} = ৮$
এবং হর ৮১ এর বর্গমূল = $\sqrt{৮১} = ৯$

∴ $\frac{৬৪}{৮১}$ এর বর্গমূল = $\sqrt{\frac{৬৪}{৮১}} = \frac{৮}{৯}$

নির্ণেয় বর্গমূল $\frac{৮}{৯}$

উদাহরণ ৬। $৫২\frac{৯}{১৬}$ এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

সমাধান : $৫২\frac{৯}{১৬}$ এর বর্গমূল = $\sqrt{৫২\frac{৯}{১৬}} = \sqrt{\frac{৮৪১}{১৬}} = \frac{২৯}{৪} = ৭\frac{১}{৪}$

∴ $৫২\frac{৯}{১৬}$ এর বর্গমূল $৭\frac{১}{৪}$

ভগ্নাংশের হর যদি পূর্ণ বর্গসংখ্যা না হয়, তবে সেই সংখ্যার গুণন দ্বারা একে পূর্ণবর্গ করে নিতে হয়।

উদাহরণ ৭। $২\frac{৮}{১৫}$ এর বর্গমূল তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করো।

সমাধান : $২\frac{৮}{১৫}$ এর বর্গমূল

$$\begin{aligned} &= \sqrt{২\frac{৮}{১৫}} = \sqrt{\frac{৩৮}{১৫}} = \sqrt{\frac{৩৮ \times ১৫}{১৫ \times ১৫}} \\ &= \sqrt{\frac{৫৭০}{২২৫}} = \frac{২৩.৮৭৪৭}{১৫} = ১.৫৯১৬ \text{ (প্রায়)} \end{aligned}$$

∴ আসন্ন তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত বর্গমূল = ১.৫৯২ (প্রায়)

কাজ : ১। $২৭\frac{৪৬}{৪৯}$ এর বর্গমূল নির্ণয় করো।

২। $১\frac{৪}{৫}$ এর বর্গমূল দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করো।

১.৭ মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা

১,২,৩,৪, ইত্যাদি স্বাভাবিক সংখ্যা। সংখ্যাগুলোকে দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার ভগ্নাংশ আকারে নিম্নরূপে লেখা যায়।

$$১ = \frac{১}{১}, ২ = \frac{২}{১}, ৩ = \frac{৩ \times ২}{২} = \frac{৬}{২}, \dots \text{ ইত্যাদি।}$$

আবার, ০.১, ১.৫, ২.০৩, ইত্যাদি দশমিক সংখ্যা।

এখানে,

$$০.১ = \frac{১}{১০}, ১.৫ = \frac{১৫}{১০}, ২.০৩ = \frac{২০৩}{১০০}, \text{ যা সংখ্যাগুলোর ভগ্নাংশ আকার।}$$

আবার, $০ = \frac{০}{১}$, একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা।

উপরে বর্ণিত সংখ্যাগুলো মূলদ সংখ্যা।

অতএব, শূন্য, সকল স্বাভাবিক সংখ্যা ও ভগ্নাংশ সংখ্যা মূলদ সংখ্যা।

অমূলদ সংখ্যা : $\sqrt{২} = ১.৪১৪২১৩৫\dots\dots$ সংখ্যার দশমিকের পরে অঙ্ক সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। ফলে দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার ভগ্নাংশ আকারে লেখা যায় না। অনুরূপে $\sqrt{৩}, \sqrt{৫}, \sqrt{৬}, \dots\dots$ ইত্যাদি সংখ্যাগুলোকে ও দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না। তাই এগুলো অমূলদ সংখ্যা।

লক্ষ করি : $\sqrt{২}, \sqrt{৩}, \sqrt{৫}, \sqrt{৬}, \dots\dots$ ইত্যাদি অমূলদ সংখ্যা এবং ২, ৩, ৫, ৬, ইত্যাদি পূর্ণ বর্গসংখ্যা নয়। সুতরাং পূর্ণ বর্গসংখ্যা নয় এরূপ সংখ্যার বর্গমূল অমূলদ সংখ্যা।

উদাহরণ ৮। $০.১২, \sqrt{২৫}, \sqrt{৭২}, \frac{\sqrt{৪৯}}{৯}$ সংখ্যাগুলো থেকে অমূলদ সংখ্যা বাছাই কর।

সমাধান : এখানে, $০.১২ = \frac{১২}{১০০} = \frac{৩}{২৫}$, যা একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা

$\sqrt{২৫} = \sqrt{৫^2} = ৫$, যা একটি স্বাভাবিক সংখ্যা

$\sqrt{৭২} = \sqrt{২ \times ৩৬} = \sqrt{২ \times ৬^2} = ৬\sqrt{২}$, যা ভগ্নাংশ আকারে লেখা যায় না।

এবং $\frac{\sqrt{৪৯}}{৯} = \frac{\sqrt{৭^2}}{৯} = \frac{৭}{৯} = ১$, যা একটি স্বাভাবিক সংখ্যা।

$\therefore ০.১২, \sqrt{২৫}, \frac{\sqrt{৪৯}}{৯}$ মূলদ সংখ্যা এবং $\sqrt{৭২}$ অমূলদ সংখ্যা।

কাজ : $১\frac{১}{২}, \sqrt{\frac{৪}{২৫}}, \sqrt{\frac{২৭}{১৬}}, ১.০৫৬৩, \sqrt{৩২}, \sqrt{১২১}$ সংখ্যাগুলো থেকে মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা বের করো।

১.৮ সংখ্যারেখায় মূলদ ও অমূলদ সংখ্যাকে প্রকাশ

সংখ্যারেখায় মূলদ সংখ্যা

নিচের সংখ্যারেখাটি লক্ষ করি :



উপরের সংখ্যারেখাটিতে গাঢ় চিহ্নিত বৃত্তটি ২ এর অবস্থান নির্দেশ করে।

আবার,


উপরের সংখ্যারেখাটিতে গাঢ় চিহ্নিত বৃত্তটির অবস্থান ১ ও ২ এর মাঝে। গাঢ় চিহ্নিত অংশটুকু ৪ ভাগের ৩ অংশ। সুতরাং চিহ্নিত অংশটি $১ + \frac{৩}{৪}$ বা $১\frac{৩}{৪}$ নির্দেশ করে।

সংখ্যারেখায় অমূলদ সংখ্যা

$\sqrt{৩}$ একটি অমূলদ সংখ্যা যেখানে, $\sqrt{৩} = ১.৭৩২ \dots\dots\dots = ১.৭$ (আসন্ন মান)।

এবার সংখ্যারেখায় ১ ও ২ এর মাঝের অংশকে সমান ১০ অংশে ভাগ করে সপ্তম অংশটি গাঢ় করি যার

আসন্ন মান ১.৭ তথা $\sqrt{৩}$ নির্দেশ করে।



অতএব গাঢ় চিহ্নিত বৃত্তটি সংখ্যারেখায় $\sqrt{৩}$ অবস্থান।

কাজ :
১। সংখ্যারেখায় $৩, \frac{৩}{২}, ১.৪৫৫$ এবং $\sqrt{৫}$ সংখ্যাগুলো প্রকাশ কর।

উদাহরণ ৯। কোনো বাগানে ১২৯৬টি আমগাছ আছে। বাগানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের উভয় দিকের প্রত্যেক সারিতে সমান সংখ্যক আমগাছ থাকলে প্রত্যেক সারিতে গাছের সংখ্যা নির্ণয় কর।

সমাধান : বাগানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের উভয় দিকের প্রত্যেক সারিতে সমান সংখ্যক আমগাছ আছে।

∴ প্রত্যেক সারিতে আমগাছের সংখ্যা হবে ১২৯৬ এর বর্গমূল।

এখন,

$$\begin{array}{r|l} 12 & 96 \\ \hline 3 & \\ \hline 36 & 96 \\ 36 & 96 \\ \hline 0 & \end{array}$$

নির্ণেয় আমগাছের সংখ্যা ৩৬ টি।

উদাহরণ ১০। একটি স্কাউট দলকে ৯, ১০, এবং ১২ সারিতে সাজানো যায়। আবার তাদের বর্গাকারেও সাজানো যায়। ঐ স্কাউট দলে কমপক্ষে কতজন স্কাউট রয়েছে?

সমাধান : স্কাউট দলকে ৯, ১০ এবং ১২ সারিতে সাজানো যায়। ফলে স্কাউট এর সংখ্যা ৯, ১০ এবং ১২ দ্বারা বিভাজ্য। এরূপ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হবে ৯, ১০ এবং ১২ এর ল.সা.গু.।

এখানে,

$$\begin{array}{r|l} 2 & 9, 10, 12 \\ \hline 3 & 9, 5, 6 \\ \hline & 3, 5, 2 \end{array}$$

∴ ৯, ১০ এবং ১২ এর ল.সা.গু. = $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = (2 \times 2) \times (3 \times 3) \times 5$

প্রাপ্ত ল.সা.গু. $(2 \times 2) \times (3 \times 3) \times 5$ কে বর্গাকারে সাজানো যায় না।

$(2 \times 2) \times (3 \times 3) \times 5$ কে বর্গসংখ্যা করতে হলে কমপক্ষে ৫ দ্বারা গুণ করতে হবে।

∴ ৯, ১০ এবং ১২ সারিতে এবং বর্গাকারে সাজানোর জন্য স্কাউট এর সংখ্যা প্রয়োজন

$$(2 \times 2) \times (3 \times 3) \times (5 \times 5) = 900$$

নির্ণেয় স্কাউট এর সংখ্যা ৯০০।

উদাহরণ ১১। ২১৯৫২ এবং ৫৬০৫ দুটি সংখ্যা।

- (ক) $\frac{১২}{২৭}$ -এর বর্গমূল মূলদ সংখ্যা কিনা যাচাই করো।
 (খ) প্রথম সংখ্যাটি যদি পূর্ণবর্গ না হয়, তবে একে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে।
 (গ) দ্বিতীয় সংখ্যাটির সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে, যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে।

সমাধান : (ক) $\frac{১২}{২৭}$ এর বর্গমূল $\sqrt{\frac{১২}{২৭}} = \sqrt{\frac{৩ \times ৪}{৩ \times ৯}} = \sqrt{\frac{৪}{৯}} = \frac{২}{৩}$, যা দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার অনুপাত।

$\therefore \frac{১২}{২৭}$ -এর বর্গমূল একটি মূলদ সংখ্যা।

(খ)

এখানে,

$$\begin{array}{r} ২ \overline{) ২১৯৫২} \\ \underline{২} \\ ১০৯৭৬ \\ \underline{২} \\ ৫৪৮৮ \\ \underline{২} \\ ২৭৪৪ \\ \underline{২} \\ ১৩৭২ \\ \underline{২} \\ ৬৮৬ \\ \underline{১} \\ ৩৪৩ \\ \underline{১} \\ ৪৯ \\ \underline{১} \\ ০ \end{array}$$

সুতরাং $২১৯৫২ = ২ \times ১ \times ১ \times ১$

২১৯৫২ সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ নয়। সংখ্যাটিকে ১ দ্বারা ভাগ করলে প্রাপ্ত সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ হবে।

উত্তর: ১

গ. এখানে,

$$\begin{array}{r} ৫৬০৫ \overline{) ১৪৪} \\ \underline{৪৯} \\ ১৪৪ \overline{) ১৪৪} \\ \underline{১৪৪} \\ ০ \end{array}$$

যেহেতু সংখ্যাটির বর্গমূল নির্ণয় করার সময় ভাগশেষ ১২৯ আছে, সেহেতু সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ নয়।

৫৬০৫ এর সাথে কোনো একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ হবে।

\therefore তখন বর্গমূল হবে $(১৪+১) = ১৫$

১৫ এর বর্গ $= (১৫)^2 = (১৫ \times ১৫) = ২২৫$

সুতরাং, নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি $= ২২৫ - ৫৬০৫ = ২০$

উত্তর : ২০

অনুশীলনী ১.২

- ১। $\frac{২৮৯}{৩৬১}$ এর বর্গমূল কত?
- (ক) $\frac{১৩}{১৯}$ (খ) $\frac{১৭}{১৯}$ (গ) $\frac{১৯}{১৩}$ (ঘ) $\frac{১৯}{১৭}$
- ২। ১.১০২৫ এর বর্গমূল কত?
- (ক) ১.৫ (খ) ১.০০৫ (গ) ১.০৫ (ঘ) ০.০৫
- ৩। কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক ২ বা ৮ হলে তার বর্গসংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্কটি হবে—
- (ক) ২ (খ) ৪ (গ) ৬ (ঘ) ৮
- ৪। $৩ \times ৭ \times ৫ \times ৭ \times ৩$ কে কত দ্বারা গুণ বা ভাগ করলে গুণফল বা ভাগফল পূর্ণ বর্গসংখ্যা হবে?
- (ক) ৩ (খ) ৫ (গ) ৭ (ঘ) ১১
- ৫। নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা
- (ক) $\sqrt{২}$ (খ) $\sqrt{৯}$ (গ) $\sqrt{১৬}$ (ঘ) $\sqrt{২৫}$
- ৬। একজন কৃষক বাগান করার জন্য ৫৯৫টি চারাগাছ কিনে আনেন। প্রত্যেকটি চারাগাছের মূল্য ১২ টাকা।
- (ক) ১.২ সংখ্যাটি মূলদ সংখ্যা কিনা যাচাই করো।
- (খ) বাগানে প্রত্যেক সারিতে সমান সংখ্যক গাছ লাগানোর পর কয়টি চারাগাছ অবশিষ্ট থাকবে তা নির্ণয় কর।
- (গ) খরচের টাকার সংখ্যা ও চারাগাছের সংখ্যার বিয়োগফলের সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণ বর্গসংখ্যা হবে তা নির্ণয় করো।
- ৭। বর্গমূল নির্ণয় কর।
- (ক) ০.৩৬ (খ) ২.২৫ (গ) ০.০০৪৯ (ঘ) ৬৪১.১০২৪
- (ঙ) ০.০০০৫৭৬ (চ) ১৪৪.৮৪১২২৫
- ৮। দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত বর্গমূল নির্ণয় কর।
- (ক) ৭ (খ) ২৩.২৪ (গ) ০.০৩৬
- ৯। নিচের ভগ্নাংশগুলোর বর্গমূল নির্ণয় কর।
- (ক) $\frac{১}{৬৪}$ (খ) $\frac{৪৯}{১২১}$ (গ) $১১ \frac{৯৭}{১৪৪}$ (ঘ) $৩২ \frac{২৪১}{৩২৪}$

- ১০। তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত বর্গমূল নির্ণয় কর।
- (ক) $\frac{৬}{৭}$ (খ) $২\frac{৫}{৬}$ (গ) $৭\frac{৯}{১৩}$
- ১১। ৫৬৭২৮ জন সৈন্য থেকে কমপক্ষে কতজন সৈন্য সরিয়ে রাখলে বা তাদের সাথে কমপক্ষে আর কতজন সৈন্য যোগ দিলে সৈন্যদলকে বর্গাকারে সাজানো যাবে?
- ১২। কোনো মাদরাসার ২৭০৪ জন শিক্ষার্থীকে প্রাত্যহিক সমাবেশ করার জন্য বর্গাকারে সাজানো হলো। প্রত্যেক সারিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা নির্ণয় কর।
- ১৩। একটি সমবায় সমিতির যতজন সদস্য ছিল প্রত্যেকে তত ২০ টাকা করে চাঁদা দেওয়ায় মোট ২০৪৮০ টাকা হলো। ঐ সমিতির সদস্য সংখ্যা নির্ণয় কর।
- ১৪। কোনো বাগানে ১৮০০টি চারাগাছ বর্গাকারে লাগাতে গিয়ে ৩৬টি গাছ বেশি হলো। প্রত্যেক সারিতে চারাগাছের সংখ্যা নির্ণয় কর।
- ১৫। কোন ক্ষুদ্রতম পূর্ণ বর্গসংখ্যা ৯, ১৫ এবং ২৫ দ্বারা বিভাজ্য?
- ১৬। একটি ধানক্ষেতের ধান কাটতে শ্রমিক নেওয়া হলো। প্রত্যেক শ্রমিকের দৈনিক মজুরি তাদের সংখ্যার ১০ গুণ। দৈনিক মোট মজুরি ৬২৫০ টাকা হলে শ্রমিকের সংখ্যা বের কর।
- ১৭। এমন দুটি ক্ষুদ্রতম ত্রিমিক সংখ্যা নির্ণয় কর যাদের বর্গের অন্তর একটি পূর্ণ বর্গসংখ্যা।
- ১৮। একটি সৈন্যদলকে ৬, ৭, ৮ সারিতে সাজানো যায়, কিন্তু বর্গাকারে সাজানো যায় না।
- (ক) ৮ এর গুণনীয়কগুলো বের কর।
- (খ) সৈন্য সংখ্যাকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে বর্গাকারে সাজানো যাবে তা নির্ণয় কর।
- (গ) ঐ দলে কমপক্ষে কতজন সৈন্য যোগ দিলে সৈন্যদলকে বর্গাকারে সাজানো যাবে তা নির্ণয় কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। ০.০১ এর বর্গমূল নিচের কোনটি?
- (ক) ০.০১ (খ) ০.১ (গ) ০.০০১ (ঘ) ০.০০০১
- ২। ১৬ সংখ্যাটি—
- (i) একটি মূলদ সংখ্যা
(ii) একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা
(iii) মৌলিক সংখ্যা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর ১৯। এই তথ্যানুসারে নিচের ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩। একটি সংখ্যা ১০ হলে অপরটি কত?

(ক) ১২ (খ) ১১ (গ) ৯ (ঘ) ৮

৪। সংখ্যা দুটির বর্গের অন্তর থেকে কত বিয়োগ করলে বিয়োগফলের বর্গমূল একটি মূলদ সংখ্যা হবে?

ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন

৫। ৩৮৪ ও ২১৮৭ দুটি সংখ্যা।

(ক) $\frac{৫}{২}$ সংখ্যাটিকে সংখ্যারেখায় দেখাও।

(খ) প্রথম সংখ্যাটি যদি পূর্ণবর্গ না হয় তবে একে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে গুণফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তা নির্ণয় করো।

(গ) দ্বিতীয় সংখ্যাটির সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তা নির্ণয় করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৬। ক) দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর ৩৭ হলে, সংখ্যা দুটি নির্ণয় করো।

খ) $\sqrt{\frac{৩২}{৫৪}}$ সংখ্যাটি মূলদ সংখ্যা কিনা যাচাই করো।

গ) দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত ৩.২৭-এর বর্গমূল নির্ণয় করো।

ঘ) ৩৯টি চারাগাছকে কত সংখ্যক সারিতে সাজানো যাবে তা নির্ণয় করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমানুপাত ও লাভ-ক্ষতি

আমরা প্রতিদিন এমন অনেক সমস্যার মুখোমুখি হই, যোগুলো অনুপাত ও সমানুপাতের ধারণা ব্যবহার করে সহজেই সমাধান করা যায়। তাই শিক্ষার্থীদের অনুপাত ও সমানুপাতের ধারণা ও এর প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করা দরকার। একইভাবে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে লেনদেন আর যার সাথে জড়িত লাভ-ক্ষতি। এ কারণে লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাই এ অধ্যায়ে অনুপাত-সমানুপাত ও লাভ-ক্ষতি সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা –

- বছরশিক ও ধারাবাহিক অনুপাত ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- সমানুপাতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- সমানুপাত সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবে;
- লাভ-ক্ষতি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে;
- কর, ভ্যাট, কমিশন ও মুদ্রাবিনিময় সংক্রান্ত দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধান করতে পারবে;
- ঐকিক ও অনুপাত ব্যবহার করে বাস্তব জীবনে সময় ও কাজ, নল ও চৌবাচ্চা, সময় ও দূরত্ব এবং নৌকা ও শ্রোত বিষয়ক সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

২.১ বছরশিক অনুপাত ও ধারাবাহিক অনুপাত

বছরশিক অনুপাত : মনে করি, একটি বাস্কের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৮ সে.মি., ৫ সে.মি. ও ৬ সে.মি.

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত = ৮ : ৫ : ৬

সংক্ষেপে, দৈর্ঘ্য : প্রস্থ : উচ্চতা = ৮ : ৫ : ৬

এখানে তিনটি রাশির অনুপাত উপস্থাপন করা হয়েছে। এরূপ তিন বা ততোধিক রাশির অনুপাতকে বছরশিক অনুপাত বলে।

ধারাবাহিক অনুপাত : মনে করি, পুত্র ও পিতার বয়সের অনুপাত = ১৫ : ৪১ (পূর্ব রাশি: উত্তর রাশি)

এবং পিতা ও দাদার বয়সের অনুপাত = ৪১ : ৬৫

দুটি অনুপাতকে একত্র করে পাই, পুত্রের বয়স : পিতার বয়স : দাদার বয়স = ১৫ : ৪১ : ৬৫। এ ধরনের অনুপাতকে ধারাবাহিক অনুপাত বলে। এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি ও দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি সমান। প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি ও দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি সমান না হলে তাদেরকে সমান করে ধারাবাহিক অনুপাত বের করতে হয়।

দুটি অনুপাতকে ধারাবাহিক অনুপাতে রূপান্তরের জন্য প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি দ্বারা দ্বিতীয় অনুপাতের উভয় রাশিকে গুণ করতে হবে এবং দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি দ্বারা প্রথম অনুপাতের উভয় রাশিকে গুণ করতে হবে।

উদাহরণ ১। ৭ : ৫ এবং ৮ : ৯ দুটি অনুপাত। এদেরকে ধারাবাহিক অনুপাতে প্রকাশ কর।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : ১ম অনুপাত} &= ৭ : ৫ \\ &= \frac{৭}{৫} \\ &= \frac{৭ \times (৮)}{৫ \times (৮)} = \frac{৫৬}{৪০} \\ &= ৫৬ : ৪০ \\ \text{২য় অনুপাত} &= ৮ : ৯ \\ &= \frac{৮}{৯} \\ &= \frac{৮ \times (৫)}{৯ \times (৫)} = \frac{৪০}{৪৫} \\ &= ৪০ : ৪৫ \end{aligned}$$

বিকল্প সমাধান :

$$\begin{aligned} \text{১ম অনুপাত} &= ৭ : ৫ = ৭ \times (৮) : ৫ \times (৮) \\ &= ৫৬ : ৪০ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{২য় অনুপাত} &= ৮ : ৯ = ৮ \times (৫) : ৯ \times (৫) \\ &= ৪০ : ৪৫ \end{aligned}$$

∴ অনুপাত দুটির ধারাবাহিক অনুপাত ৫৬ : ৪০ : ৪৫

কাজ :

নিচের অনুপাতগুলোকে ধারাবাহিক অনুপাতে প্রকাশ করো।

- | | | | |
|----|--------------------|----|-------------------|
| ১। | ১২ : ১৭ এবং ৫ : ১২ | ৪। | ৫ : ৮ এবং ১২ : ১৭ |
| ২। | ২৩ : ১১ এবং ৭ : ১৩ | | |
| ৩। | ১৯ : ২৫ এবং ৯ : ১৭ | | |

২.২ সমানুপাত

মনে করি, সোহাগ কোনো দোকান থেকে ১০ টাকা দিয়ে একটি চিপসের প্যাকেট এবং ২৫ টাকা দিয়ে ১ কেজি লবণ কিনল। এখানে লবণ ও চিপস এর দামের অনুপাত = ২৫ : ১০ বা ৫ : ২।

আবার, সোহাগদের শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭০। এদের মধ্যে ছাত্র ৫০জন এবং ছাত্রী ২০জন। এখানে ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যার অনুপাত = ৫০ : ২০ বা ৫ : ২। উভয়ক্ষেত্রে অনুপাত দুটি সমান।

অতএব, আমরা বলতে পারি, ২৫ : ১০ = ৫০ : ২০। এই অনুপাতে ৪টি রাশি আছে। এই ৪টি রাশি একটি সমানুপাত তৈরি করেছে।


এর মধ্যে ১ম রাশি ২৫, ২য় রাশি ১০, ৩য় রাশি ৫০ এবং ৪র্থ রাশি ২০ হিসেবে বিবেচনা করলে আমরা লিখতে পারি, $\boxed{১ম রাশি : ২য় রাশি = ৩য় রাশি : ৪র্থ রাশি।}$

চারটি রাশির ১ম ও ২য় রাশির অনুপাত এবং ৩য় ও ৪র্থ রাশির অনুপাত পরস্পর সমান হলে, রাশি চারটি একটি সমানুপাত তৈরি করে। সমানুপাতের প্রত্যেক রাশিকে সমানুপাতী বলে।

সমানুপাতের ১ম ও ২য় রাশি সমজাতীয় এবং ৩য় ও ৪র্থ রাশি সমজাতীয় হবে। অর্থাৎ ৪ টি রাশি সমজাতীয় হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক অনুপাতের রাশি দুইটি সমজাতীয় হলেই সমানুপাত তৈরি হয়।

সমানুপাতের ১ম ও ৪র্থ রাশিকে প্রান্তীয় রাশি এবং ২য় ও ৩য় রাশিকে মধ্য রাশি বলে। সমানুপাতে '=' চিহ্নের পরিবর্তে '::' চিহ্নও ব্যবহার করা হয়। অতএব আমরা লিখতে পারি, $২৫ : ১০ :: ৫০ : ২০$ ।

আবার, ১ম রাশি : ২য় রাশি = ৩য় রাশি : ৪র্থ রাশি



$$\text{বা, } \frac{১ম রাশি}{২য় রাশি} = \frac{৩য় রাশি}{৪র্থ রাশি} \quad \text{বা, } ১ম রাশি \times ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি \times ৩য় রাশি$$

ত্রৈরাশিক

আমরা জানি, ১ম রাশি \times ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি \times ৩য় রাশি

মনে করি, ১ম, ২য় ও ৩য় রাশি যথাক্রমে ৯, ১৮, ২০।

$$\text{তবে, } ৯ \times ৪র্থ রাশি = ১৮ \times ২০$$

$$\therefore ৪র্থ রাশি = \frac{১৮ \times ২০}{৯} = ৪০$$

$$\therefore ৪র্থ রাশি = ৪০$$

এভাবে সমানুপাতের তিনটি রাশি জানা থাকলে ৪র্থ রাশি নির্ণয় করা যায়। এই ৪র্থ রাশি নির্ণয় করার পদ্ধতিকে ত্রৈরাশিক বলে।

লক্ষ করি,

- সমানুপাতের ১ম ও ৪র্থ রাশিকে প্রান্তীয় রাশি বলে।
- সমানুপাতের ২য় ও ৩য় রাশিকে মধ্য রাশি বলে।

উদাহরণ ২। ৩, ৬, ৭ এর ৪র্থ সমানুপাতী নির্ণয় কর।

সমাধান : এখানে ১ম রাশি ৩, ২য় রাশি ৬, ৩য় রাশি ৭

আমরা জানি, ১ম রাশি \times ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি \times ৩য় রাশি

$$৩ \times ৪র্থ রাশি = ৬ \times ৭$$

$$\text{বা, } ৪র্থ রাশি = \frac{৬ \times ৭}{৩} \quad \text{বা, } ১৪$$

নির্ণয়ে ৪র্থ সমানুপাতী ১৪

উদাহরণ ৩। ৮, ৭ এবং ১৪ এর ৩য় রাশি নির্ণয় কর।

সমাধান : এখানে ১ম রাশি ৮, ২য় রাশি ৭ এবং ৪র্থ রাশি ১৪

আমরা জানি, ১ম রাশি \times ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি \times ৩য় রাশি

$$\text{বা, } ৮ \times ১৪ = ৭ \times \text{৩য় রাশি}$$

$$\therefore \text{৩য় রাশি} = \frac{৮ \times ১৪}{৭}$$

$$= ১৬$$

কাজ :

নিচের খালি ঘর পূরণ করো।

(ক) : ৯ :: ১৬ : ৮

(খ) ৯ : ১৮ :: ২৫ :

ক্রমিক সমানুপাত

মনে করি, ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ২০ টাকা এই তিনটি রাশি দ্বারা ৫ : ১০ এবং ১০ : ২০ এই দুটি অনুপাত নেওয়া হলো। এখানে, ৫ : ১০ :: ১০ : ২০। এ ধরনের সমানুপাতকে ক্রমিক সমানুপাত বলে। ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ২০ টাকাকে ক্রমিক সমানুপাতী বলে।

তিনটি রাশির ১ম ও ২য় রাশির অনুপাত এবং ২য় ও ৩য় রাশির অনুপাত পরস্পর সমান হলে, সমানুপাতটিকে ক্রমিক সমানুপাত বলে। রাশি তিনটিকে ক্রমিক সমানুপাতী বলে।

ক : খ :: খ : গ সমানুপাতটির তিনটি রাশি ক, খ, গ ক্রমিক সমানুপাতী হলে, $\frac{ক}{খ} = \frac{খ}{গ}$ বা ক \times গ = (খ)^২ হবে।

অর্থাৎ, ১ম ও ৩য় রাশির গুণফল দ্বিতীয় রাশির বর্গের সমান।

- লক্ষ করি :
- ২য় রাশিকে ১ম ও ৩য় রাশির মধ্য সমানুপাতী বা মধ্য রাশি বলে।
 - ক্রমিক সমানুপাতের তিনটি রাশিই সমজাতীয়।

উদাহরণ ৪। একটি ক্রমিক সমানুপাতের ১ম ও ৩য় রাশি যথাক্রমে ৪ ও ১৬ হলে, মধ্য সমানুপাতী ও ক্রমিক সমানুপাত নির্ণয় কর।

সমাধান : আমরা জানি, ১ম রাশি \times ৩য় রাশি = (২য় রাশি)^২

এখানে, ১ম রাশি = ৪ এবং ৩য় রাশি = ১৬

$$\therefore ৪ \times ১৬ = (\text{মধ্য রাশি})^২$$

$$\text{অথবা, } (\text{মধ্য রাশি})^২ = ৬৪$$

$$\therefore \text{মধ্য রাশি} = \sqrt{৬৪} = ৮$$

নির্ণয়ে ক্রমিক সমানুপাত ৪ : ৮ :: ৮ : ১৬ এবং নির্ণয়ে মধ্য সমানুপাতী ৮

উদাহরণ ৫। ৫টি খাতার দাম ২০০ টাকা হলে, ৭টি খাতার দাম কত?

সমাধান : এখানে খাতার সংখ্যা বাড়লে দামও বাড়বে।

অর্থাৎ, খাতার সংখ্যার অনুপাত = খাতার দামের অনুপাত

$$৫ : ৭ = ২০০ \text{ টাকা} : ৭ \text{ টি খাতার দাম}$$

$$\text{বা, } \frac{৫}{৭} = \frac{২০০ \text{ টাকা}}{৭ \text{ টি খাতার দাম}}$$

$$\text{বা, } ৭ \text{ টি খাতার দাম} = \frac{৭ \times ২০০ \text{ টাকা}}{৫} = ২৮০ \text{ টাকা।}$$

উদাহরণ ৬। ১২ জন লোক একটি কাজ ৯ দিনে করতে পারে। একই হারে কাজ করলে ১৮ জনে কাজটি কত দিনে করতে পারবে?

সমাধান : লক্ষ করি, লোকসংখ্যা বাড়লে সময় কম লাগবে, আবার লোকসংখ্যা কমলে সময় বেশি লাগবে। লোকসংখ্যার সরল অনুপাত সময়ের ব্যস্ত অনুপাতের সমান হবে।

$$১২ : ১৮ = \text{নির্ণেয় সময়} : ৯ \text{ দিন}$$

$$\text{বা, } \frac{১২}{১৮} = \frac{\text{নির্ণেয় সময়}}{৯ \text{ দিন}}$$

$$\text{বা, নির্ণেয় সময়} = \frac{২ \times ৯}{৩} \text{ দিন} = ৬ \text{ দিন}$$

সমানুপাতিক ভাগ

মনে করি, ৫০০ টাকা ৩ : ২ অনুপাতে বণ্টন করতে হবে।

এখানে ৩ : ২ অনুপাতের পূর্বরাশি ও উত্তর রাশির যোগফল = ৩+২ = ৫

$$\therefore ১ম \text{ ভাগ} = ৫০০ \text{ টাকার } \frac{৩}{৫} \text{ অংশ} = ৩০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{এবং } ২য় \text{ ভাগ} = ৫০০ \text{ টাকার } \frac{২}{৫} \text{ অংশ} = ২০০ \text{ টাকা।}$$

অতএব, একটি অংশের পরিমাণ = প্রদত্ত রাশি \times $\frac{\text{ঐ অংশের আনুপাতিক সংখ্যা}}{\text{অনুপাতের পূর্ব ও উত্তর রাশির যোগফল}}$

এভাবে উপরের পদ্ধতিতে একটি রাশিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

একটি প্রদত্ত রাশিকে একাধিক নির্দিষ্ট সংখ্যার অনুপাতে বিভক্ত করাকে সমানুপাতিক ভাগ বলে।

উদাহরণ ৭। ২০ মিটার কাপড়কে তিন ভাইবোন আরিফ, আসিফ ও সাফার মধ্যে ৫ : ৩ : ২ অনুপাতে ভাগ করলে প্রত্যেকের কাপড়ের পরিমাণ কত?

সমাধান : কাপড়ের পরিমাণ = ২০ মিটার

প্রদত্ত অনুপাত = ৫ : ৩ : ২

অনুপাতের সংখ্যাগুলোর যোগফল = ৫ + ৩ + ২ = ১০

∴ আরিফের অংশ = ২০ মিটারের $\frac{৫}{১০}$ অংশ = ১০ মিটার

আসিফের অংশ = ২০ মিটারের $\frac{৩}{১০}$ অংশ = ৬ মিটার

এবং সাফার অংশ = ২০ মিটারের $\frac{২}{১০}$ অংশ = ৪ মিটার

আরিফ, আসিফ ও সাফার কাপড়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১০ মিটার, ৬ মিটার ও ৪ মিটার।

কাজ

১। ক : খ = ৪ : ৫, খ : গ = ৭ : ৯ হলে, ক : খ : গ নির্ণয় করো।

২। ৪৮০০ টাকা আয়েশা, ফিরোজা ও খাদিজার মধ্যে ৪ : ৩ : ১ অনুপাতে ভাগ করে দিলে কে কত টাকা পাবে?

৩। তিনজন ছাত্রের মধ্যে ৫৭০ টাকা তাদের বয়সের অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হলো। তাদের বয়স যথাক্রমে ১০, ১৩ ও ১৫ বছর হলে, কে কত টাকা পাবে?

উদাহরণ ৮। হাসান ও মাসুদের আয়ের অনুপাত ৪ : ৩। মাসুদ ও সাজিদের আয়ের অনুপাত ৫ : ৪। হাসানের আয় ১২০ টাকা হলে, সাজিদের আয় কত?

সমাধান : হাসান ও মাসুদের আয়ের অনুপাত $৪ : ৩ = \frac{৪}{৩} = \frac{৪ \times ৫}{৩ \times ৫} = \frac{২০}{১৫} = ২০ : ১৫$

মাসুদ ও সাজিদের আয়ের অনুপাত $\frac{৫}{৪} = \frac{৫ \times ৩}{৪ \times ৩} = \frac{১৫}{১২} = ১৫ : ১২$

হাসানের আয় : মাসুদের আয় : সাজিদের আয় = ২০ : ১৫ : ১২

∴ হাসানের আয় : সাজিদের আয় = ২০ : ১২

বা, $\frac{\text{হাসানের আয়}}{\text{সাজিদের আয়}} = \frac{২০}{১২}$

বা, সাজিদের আয় = $\frac{\text{হাসানের আয়} \times ১২}{২০}$ টাকা

= $\frac{১২০ \times ১২}{২০}$ টাকা বা ৭২ টাকা।

২০২০

∴ সাজিদের আয় ৭২ টাকা

অনুশীলনী ২.১

- ১। নিচের রাশিগুলো দিয়ে সমানুপাত লেখো।
- (ক) ৩ কেজি, ৫ টাকা, ৬ কেজি, ১০ টাকা
 (খ) ৯ বছর, ১০ দিন, ১৮ বছর ও ২০ দিন
 (গ) ৭ সে.মি., ১৫ সেকেন্ড, ২৮ সে.মি. ও ১ মিনিট
 (ঘ) ১২টি খাতা, ১৫টি পেনসিল, ২০ টাকা ও ২৫ টাকা
 (ঙ) ১২৫ জন ছাত্র ও ২৫জন শিক্ষক, ২৫০০ টাকা ও ৫০০ টাকা
- ২। নিচের ক্রমিক সমানুপাতের প্রান্তীয় রাশি দুটি দেওয়া আছে। সমানুপাত তৈরি করো।
- (ক) ৬, ২৪ (খ) ২৫, ৮১ (গ) ১৬, ৪৯ (ঘ) $\frac{৫}{৭}, ১\frac{২}{৫}$ (ঙ) ১.৫, ১৩.৫।
- ৩। শূন্যস্থান পূরণ করো।
- (ক) ১১ : ২৫ :: : ৫০ (খ) ৭ : :: ৮ : ৬৪ (গ) ২.৫ : ৫.০ :: ৭ :
- (ঘ) $\frac{১}{৩} : \frac{১}{৫} :: \frac{১}{\text{input type="text"/>} : \frac{৭}{১০}$ (ঙ) : ১২.৫ :: ৫ : ২৫
- ৪। নিচের রাশিগুলোর ৪র্থ সমানুপাতী নির্ণয় করো।
- (ক) ৫, ৭, ১০ (খ) ১৫, ২৫, ৩৩ (গ) ১৬, ২৪, ৩২
 (ঘ) ৮, $৮\frac{১}{২}$, ৪ (ঙ) ৫, ৪.৫, ৭
- ৫। ১৫ কেজি চালের দাম ৬০০ টাকা হলে, এরূপ ২৫ কেজি চালের দাম কত?
- ৬। একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে দৈনিক ৫৫০টি শার্ট তৈরি হয়। ঐ ফ্যাক্টরিতে একই হারে ১ সপ্তাহে কতটি শার্ট তৈরি হয়?
- ৭। কবির সাহেবের তিন পুত্রের বয়স যথাক্রমে ৫ বছর, ৭ বছর ও ৯ বছর। তিনি ৪২০০ টাকা তিন পুত্রকে তাদের বয়স অনুপাতে ভাগ করে দিলেন, কে কত টাকা পাবে?
- ৮। ২১৬০ টাকা বুমি, জেসমিন ও কাকলির মধ্যে ১ : ২ : ৩ অনুপাতে ভাগ করে দিলে কে কত টাকা পাবে?
- ৯। কিছু টাকা লাবিব, সামি ও সিয়ামের মধ্যে ৫ : ৪ : ২ অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হলো। সিয়াম ১৮০ টাকা পেলে লাবিব ও সামি কত টাকা পাবে নির্ণয় করো।

- ১০। সবুজ, ডালিম ও লিংকন তিন ভাই। তাদের পিতা ৬৩০০ টাকা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। এতে সবুজ ডালিমের $\frac{৩}{৫}$ অংশ এবং ডালিম লিংকনের দ্বিগুণ টাকা পায়। প্রত্যেকের টাকার পরিমাণ বের করো।
- ১১। তামা, দস্তা ও রুপা মিশিয়ে এক রকমের গহনা তৈরি করা হলো। ঐ গহনায় তামা ও দস্তার অনুপাত ১ : ২ এবং দস্তা ও রুপার অনুপাত ৩ : ৫। ১৯ গ্রাম ওজনের গহনায় কত গ্রাম রুপা আছে?
- ১২। দুটি সমান মাপের গ্লাস শরবতে পূর্ণ আছে। ঐ শরবতে পানি ও সিরাপের অনুপাত যথাক্রমে প্রথম গ্লাসে ৩ : ২ ও দ্বিতীয় গ্লাসে ৫ : ৪। ঐ দুটি গ্লাসের শরবত একত্রে মিশ্রণ করলে পানি ও সিরাপের অনুপাত নির্ণয় করো।
- ১৩। ক : খ = ৪ : ৭, খ : গ = ১০ : ৭ হলে, ক : খ : গ নির্ণয় করো।
- ১৪। ৯৬০০ টাকা সারা, মাইমুনা ও রাইসার মধ্যে ৪ : ৩ : ১ অনুপাতে ভাগ করে দিলে কে কত টাকা পাবে?
- ১৫। তিনজন ছাত্রের মধ্যে ৪২০০ টাকা তাদের শ্রেণি অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হলো। তারা যদি যথাক্রমে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী হয়, তবে কে কত টাকা পাবে?
- ১৬। সোলায়মান ও সালমানের আয়ের অনুপাত ৫ : ৭। সালমান ও ইউসুফের আয়ের অনুপাত ৪ : ৫। সোলায়মানের আয় ১২০ টাকা হলে ইউসুফের আয় কত?

২.৩ লাভ-ক্ষতি

- একজন দোকানদার ১ ডজন বলপেন ৬০ টাকায় ক্রয় করে ৭২ টাকায় বিক্রয় করলেন। এখানে দোকানদার ১২টি বলপেন ৬০ টাকায় ক্রয় করলেন। ফলে ১টি বলপেনের ক্রয়মূল্য $\frac{৬০}{১২}$ টাকা বা ৫ টাকা। আবার তিনি ১২টি বলপেন ৭২ টাকায় বিক্রয় করলেন। ফলে ১টি বলপেনের বিক্রয়মূল্য $\frac{৭২}{১২}$ টাকা বা ৬ টাকা। ১টি বলপেনের ক্রয়মূল্য ৫ টাকা ও বিক্রয়মূল্য ৬ টাকা।

কোনো জিনিস যে মূল্যে ক্রয় করা হয়, তাকে ক্রয়মূল্য এবং যে মূল্যে বিক্রয় করা হয়, তাকে বিক্রয়মূল্য বলে। ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য বেশি হলে, লাভ হয়।

লাভ = বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য = (৬ টাকা – ৫ টাকা) বা ১ টাকা।

এখানে দোকানদার প্রতিটি বলপেনে ১ টাকা করে লাভ করলেন।

আবার মনে করি, একজন কলাবিক্রেতা ১ হালি কলা ২০ টাকায় ক্রয় করে ১৮ টাকায় বিক্রয় করলেন।

ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য কম হলে, ক্ষতি বা লোকসান হয়।

ক্ষতি = ক্রয়মূল্য – বিক্রয়মূল্য = (২০ – ১৮) টাকা
= ২ টাকা

এখানে কলাবিক্রেতা প্রতি হালিতে ২ টাকা করে ক্ষতি করলেন।

ফর্মা নং-৪, গণিত-৭ম শ্রেণি, দাখিল

মনে করি, একজন কাপড় ব্যবসায়ী মার্কেটের একটি দোকান ভাড়া নিয়ে ৫ জন কর্মচারী নিয়োগ দিলেন। তিনি দোকানের ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন, দোকানের বিদ্যুৎ বিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বহন করেন। এ সকল খরচ তাঁর কাপড়ের ক্রয়মূল্যের সাথে যোগ করা হয়। এই যোগফলকেই মোট খরচ বলে। যদি ঐ কাপড় ব্যবসায়ী মাসে ২,০০,০০০ টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে ২,৫০,০০০ টাকায় ঐ কাপড় বিক্রয় করেন, তবে তার (২,৫০,০০০ – ২,০০,০০০) টাকা বা ৫০,০০০ টাকা লাভ হবে। আবার যদি মাস শেষে ১,৮০,০০০ টাকার কাপড় বিক্রয় করে থাকেন তাহলে তাঁর (২,০০,০০০ – ১,৮০,০০০) টাকা বা ২০,০০০ টাকা ক্ষতি বা লোকসান হবে।

লক্ষ করি :

- লাভ = বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য
বা, বিক্রয়মূল্য = ক্রয়মূল্য + লাভ
বা, ক্রয়মূল্য = বিক্রয়মূল্য – লাভ
- ক্ষতি = ক্রয়মূল্য – বিক্রয়মূল্য
বা, ক্রয়মূল্য = বিক্রয়মূল্য + ক্ষতি
বা, বিক্রয়মূল্য = ক্রয়মূল্য – ক্ষতি

লাভ বা ক্ষতিকে আমরা শতকরায় প্রকাশ করতে পারি। যেমন, উপরের আলোচনায় ৫ টাকায় বলপেন কিনে ৬ টাকায় বিক্রয় করায় ১ টাকা লাভ হয়।

অর্থাৎ, ৫ টাকায় লাভ হয় ১ টাকা

$$\therefore ১ \text{ " " " } \frac{১}{৫} \text{ "}$$

$$\therefore ১০০ \text{ " " " } \frac{১ \times ১০০}{৫} \text{ " } = ২০ \text{ টাকা}$$

\therefore নির্ণেয় লাভ ২০%।

অনুরূপভাবে, কলা বিক্রেতা ২০ টাকার কলা কিনে ১৮ টাকায় বিক্রয় করায় ২ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অর্থাৎ, ২০ টাকায় ক্ষতি হয় ২ টাকা

$$\therefore ১ \text{ " " " } \frac{২}{২০} \text{ "}$$

$$\therefore ১০০ \text{ " " " } \frac{২ \times ১০০}{২০} \text{ " } \text{ বা } ১০ \text{ টাকা}$$

\therefore নির্ণেয় ক্ষতি ১০%

উদাহরণ ৯। একজন কমলা বিক্রেতা প্রতিশত কমলা ১০০০ টাকায় কিনে ১২০০ টাকায় বিক্রয় করলেন। তাঁর কত লাভ হলো?

সমাধান : ১০০টি কমলার ক্রয়মূল্য ১০০০ টাকা

এবং ১০০টি ” বিক্রয়মূল্য ১২০০ ”

এখানে ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য বেশি হওয়ায় লাভ হয়েছে।

অর্থাৎ, লাভ = বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য

$$= ১২০০ \text{ টাকা} - ১০০০ \text{ টাকা}$$

$$= ২০০ \text{ টাকা}$$

নির্ণেয় লাভ ২০০ টাকা।

উদাহরণ ১০। একজন দোকানদার ৫০ কেজির ১ বস্তা চাল ১৬০০ টাকায় কিনলেন। চালের দাম কমে যাওয়ায় ১৫০০ টাকায় বিক্রয় করেন, তাঁর কত ক্ষতি হলো?

সমাধান : এখানে, ১ বস্তা চালের ক্রয়মূল্য ১৬০০ টাকা

এবং ১ ” ” বিক্রয়মূল্য ১৫০০ ”

∴ ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য কম হওয়ায় ক্ষতি হয়েছে।

∴ ক্ষতি = ক্রয়মূল্য – বিক্রয়মূল্য

$$= ১৬০০ \text{ টাকা} - ১৫০০ \text{ টাকা} = ১০০ \text{ টাকা}$$

নির্ণেয় ক্ষতি ১০০ টাকা।

উদাহরণ ১১। ৭৫ টাকায় ১৫টি বলপেন কিনে ৯০ টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে?

সমাধান : এখানে, ১৫টি বলপেনের ক্রয়মূল্য ৭৫ টাকা

এবং ১৫টি ” বিক্রয়মূল্য ৯০ টাকা

ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য বেশি হওয়ায় লাভ হয়েছে।

∴ লাভ = বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য

$$= ৯০ \text{ টাকা} - ৭৫ \text{ টাকা} = ১৫ \text{ টাকা}$$

∴ ৭৫ টাকায় লাভ হয় ১৫ টাকা

$$১ \text{ ” ” ” } \frac{১৫}{৭৫} \text{ ”}$$

$$\therefore ১০০ \text{ ” ” ” } \frac{১৫ \times ১০০}{৭৫} \text{ ” বা } ২০ \text{ টাকা}$$

উদাহরণ ১২। একজন মাছ বিক্রেতা প্রতি হালি ইলিশ মাছ ১৬০০ টাকায় কিনে প্রতিটি মাছ ৩৫০ টাকা করে বিক্রয় করলেন। তাঁর শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হলো?

সমাধান : প্রতি হালি বা ৪টি ইলিশের দাম = ১৬০০ টাকা

$$\therefore ১টি \text{ " " } = \frac{১৬০০}{৪} \text{ টাকা} = ৪০০ \text{ টাকা}$$

আবার, ১টি ইলিশের বিক্রয়মূল্য ৩৫০ টাকা

এখানে, ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য কম হওয়ায় ক্ষতি হয়েছে।

$$\therefore \text{ক্ষতি} = \text{ক্রয়মূল্য} - \text{বিক্রয়মূল্য}$$

$$= ৪০০ \text{ টাকা} - ৩৫০ \text{ টাকা} = ৫০ \text{ টাকা}$$

\therefore ৪০০ টাকায় ক্ষতি হয় ৫০ টাকা

$$১ \text{ " " } = \frac{৫০}{৪০০} \text{ " "}$$

$$\therefore ১০০ \text{ " " } = \frac{৫০ \times ১০০}{৪০০} \text{ " " } \text{ বা } \frac{২৫}{২} \text{ টাকা বা } ১২ \frac{১}{২} \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{ক্ষতি } ১২ \frac{১}{২} \%$$

উদাহরণ ১৩। একবাল্ল আঙ্গুর ২৭৫০ টাকায় বিক্রয় করায় ৪৫০ টাকা ক্ষতি হলো। ঐ আঙ্গুর ৩৬০০ টাকায় বিক্রয় করলে কত লাভ বা ক্ষতি হতো?

সমাধান : আঙ্গুরের বিক্রয়মূল্য = ২৭৫০ টাকা

$$\begin{array}{r} \text{ক্ষতি} = ৪৫০ \text{ টাকা} \\ \hline \text{ক্রয়মূল্য} = ৩২০০ \text{ টাকা} \end{array} \quad (\text{যোগ করে})$$

আবার, বিক্রয়মূল্য = ৩৬০০ টাকা

$$\begin{array}{r} \text{ক্রয়মূল্য} = ৩২০০ \text{ টাকা} \\ \hline \text{লাভ} = ৪০০ \text{ টাকা} \end{array} \quad (\text{বিয়োগ করে})$$

\therefore লাভ ৪০০ টাকা।

উদাহরণ ১৪। একজন চা ব্যবসায়ী একবাল্ল চা পাতা কেজি প্রতি ৮০ টাকা হিসাবে ক্রয় করেন। সব চা পাতা কেজি প্রতি ৭৫ টাকা দরে বিক্রয় করায় ৫০০ টাকা ক্ষতি হয়। তিনি কত কেজি চা পাতা ক্রয় করেছিলেন?

সমাধান : কেজি প্রতি চা পাতার ক্রয়মূল্য ৮০ টাকা

” ” ” ” বিক্রয়মূল্য ৭৫ টাকা

∴ ১ কেজি চা পাতা বিক্রয় করলে ক্ষতি হয় ৫ টাকা

∴ ৫ টাকা ক্ষতি হয় ১ কেজিতে

$$১ \text{ ” ” ” } \frac{১}{৫} \text{ ”}$$

$$৫০০ \text{ ” ” ” } \frac{১ \times ৫০০ \times ১০০}{৫} \text{ ”}$$

$$= ১০০ \text{ কেজিতে}$$

∴ চা পাতা ক্রয় করেছিলেন ১০০ কেজি।

উদাহরণ ১৫। একজন ডিম বিক্রেতা প্রতি ডজন ডিম ১০১ টাকা দরে ৫ ডজন এবং ৯০ টাকা দরে ৬ ডজন ডিম কিনে কত দরে বিক্রয় করলে তাঁর ডজন প্রতি ৩ টাকা লাভ হবে?

সমাধান : ১ ডজন ডিমের ক্রয়মূল্য ১০১ টাকা

∴ ৫ ” ” ” ১০১ × ৫ টাকা বা ৫০৫ টাকা

আবার, ১ ডজন ডিমের ক্রয়মূল্য ৯০ টাকা

∴ ৬ ” ” ” ৯০ × ৬ টাকা বা ৫৪০ টাকা

∴ (৫+৬) ডজন বা ১১ ডজন ডিমের ক্রয়মূল্য (৫০৫ + ৫৪০) টাকা বা ১০৪৫ টাকা

$$\therefore ১ \text{ ” ” ” } \frac{১০৪৫}{১১} \text{ টাকা বা } ৯৫ \text{ টাকা}$$

গড়ে ১ ডজন ডিমের ক্রয়মূল্য ৯৫ টাকা

ডজন প্রতি ৩ টাকা লাভে ১ ডজন ডিমের বিক্রয়মূল্য (৯৫ + ৩) টাকা বা ৯৮ টাকা

∴ প্রতি ডজন ডিমের বিক্রয়মূল্য ৯৮ টাকা হলে ডজন প্রতি ৩ টাকা লাভ হবে।

উদাহরণ ১৬। একটি ছাগল ১০% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো। বিক্রয়মূল্য ৪৫০ টাকা বেশি হলে ৫% লাভ হতো। ছাগলটির ক্রয়মূল্য কত?

সমাধান : মনে করি, ছাগলটির ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য (১০০ - ১০) টাকা বা, ৯০ টাকা

৫% লাভে বিক্রয়মূল্য (১০০ + ৫) টাকা = ১০৫ টাকা

$$\begin{aligned}
 & ৫\% \text{ লাভে বিক্রয়মূল্য} - ১০\% \text{ ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য} \\
 & = (১০৫ - ৯০) \text{ টাকা বা, } ১৫ \text{ টাকা} \\
 \therefore & \text{ বিক্রয়মূল্য } ১৫ \text{ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য } ১০০ \text{ টাকা} \\
 & \quad ১ \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{১০০}{১৫} \quad " \\
 \therefore & ৪৫০ \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{১০০ \times ৪৫০^{৩০}}{১৫} \quad " \\
 & = ৩০০০ \text{ টাকা}
 \end{aligned}$$

ছাগলটির ক্রয়মূল্য ৩০০০ টাকা

উদাহরণ ১৭। নাবিল মিষ্টির দোকান থেকে প্রতি কেজি ২৫০ টাকা হিসাবে ২ কেজি সন্দেশ ক্রয় করল।
ভ্যাটের হার ৪ টাকা হলে, সন্দেশ ক্রয় বাবদ সে দোকানিকে কত টাকা দেবে?

$$\begin{aligned}
 \text{সমাধান : } & ১ \text{ কেজি সন্দেশের দাম } ২৫০ \text{ টাকা} \\
 \therefore & ২ \quad " \quad " \quad " \quad (২৫০ \times ২) \text{ টাকা} \\
 & = ৫০০ \text{ টাকা}
 \end{aligned}$$

১০০ টাকায় ভ্যাট ৪ টাকা

$$\begin{aligned}
 \therefore & ১ \quad " \quad " \quad \frac{৪}{১০০} \quad " \\
 \therefore & ৫০০ \quad " \quad " \quad \frac{৪ \times ৫০০^{৫}}{১০০} \quad " = ২০ \text{ টাকা}
 \end{aligned}$$

\therefore নাবিল সন্দেশ ক্রয় বাবদ দোকানিকে দেবে $(৫০০ + ২০)$ টাকা বা ৫২০ টাকা।

লক্ষণীয় : কোনো দ্রব্যের ক্রয়মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট হারে প্রদানকৃত করকে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট (Value Added Tax) বলে।

কাজ : ১। কণা শপিংমলে গিয়ে ১,২০০ টাকায় একটি সিল্কের শাড়ি ও ১,৮০০ টাকায় একটি থ্রিপিস ক্রয় করল। ভ্যাটের হার ৪ টাকা হলে, সে দোকানিকে কত টাকা দেবে?

২। ইশরাক মনিহারি দোকানে গিয়ে এক ডজন পেনসিল ক্রয় করে দোকানিকে ২৫০ টাকা দিল। ভ্যাটের হার ৪ টাকা হলে, প্রতিটি পেনসিলের দাম কত?

উদাহরণ ১৮। নাসির সাহেবের মাসিক মূল বেতন ২৭,৬৫০ টাকা। বার্ষিক মোট আয়ের প্রথম দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার আয়কর ০ (শূন্য) টাকা। পরবর্তী টাকার উপর আয়করের হার ১০ টাকা হলে, নাসির সাহেব কত টাকা আয়কর দেন?

সমাধান : ১ মাসের মূল বেতন ২৭,৬৫০ টাকা

$$\therefore ১২ \text{ " " " } (২৭,৬৫০ \times ১২) \text{ টাকা}$$

$$= ৩,৩১,৮০০ \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{করযোগ্য টাকার পরিমাণ } (৩,৩১,৮০০ - ২,৫০,০০০) \text{ টাকা বা } ৮১,৮০০ \text{ টাকা}$$

১০০ টাকায় আয়কর ১০ টাকা

$$\therefore ১ \text{ " " } \frac{১০}{১০০} \text{ " "}$$

$$\therefore ৮১,৮০০ \text{ " " } \frac{১০ \times ৮১,৮০০}{১০০} \text{ " " বা } ৮,১৮০ \text{ টাকা}$$

\therefore নাসির সাহেব ৮,১৮০ টাকা আয়কর দেন।

উদাহরণ ১৯। যদি ১ ইউএস ডলার = ১২০.৫০ টাকা হয়, তবে ৭০০০ ইউএস ডলার বাংলাদেশি কত টাকার সমান হবে?

সমাধান : ১ ইউএস ডলার ১২০.৫০ টাকা

$$৭০০০ \text{ " " } ১২০.৫০ \times ৭০০০ \text{ টাকা}$$

$$= ৮,৪৩,৫০০.০০ \text{ টাকা}$$

নির্ণেয় টাকার পরিমাণ = ৮,৪৩,৫০০.০০ টাকা।

অনুশীলনী ২.২

- ১। একজন দোকানদার প্রতি মিটার ২০০ টাকা দরে ৫ মিটার কাপড় কিনে প্রতি মিটার ২২৫ টাকা দরে বিক্রয় করলে কত লাভ হয়েছে?
- ২। একজন কমলা বিক্রেতা প্রতি হালি ৬০ টাকা দরে ৫ ডজন কমলা কিনে প্রতি হালি ৫০ টাকা দরে বিক্রয় করলে কত ক্ষতি হয়েছে?
- ৩। রবি প্রতি কেজি ৪০ টাকা দরে ৫০ কেজি চাউল কিনে প্রতি কেজি ৪৪ টাকা দরে বিক্রয় করলে কত লাভ বা ক্ষতি হবে?
- ৪। প্রতি লিটার মিল্কভিটা দুধ ৫২ টাকায় কিনে ৫৫ টাকা দরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হয়?

- ৫। প্রতিটি চকলেট ৮ টাকা হিসেবে ক্রয় করে ৮.৫০ টাকা হিসেবে বিক্রয় করে ২৫ টাকা লাভ হলো, মোট কয়টি চকলেট ক্রয় করা হয়েছিল?
- ৬। প্রতি মিটার ১২৫ টাকা দরে কাপড় ক্রয় করে ১৫০ টাকা দরে বিক্রয় করলে দোকানদারের ২০০০ টাকা লাভ হয়। দোকানদার মোট কত মিটার কাপড় ক্রয় করেছিলেন?
- ৭। একটি দ্রব্য ১৯০ টাকায় ক্রয় করে ১৭৫ টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?
- ৮। ২৫ মিটার কাপড় যে মূল্যে ক্রয় করে, সেই মূল্যে ২০ মিটার কাপড় বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?
- ৯। ৫ টাকায় ৮টি লেবু ক্রয় করে ৫ টাকায় ৬টি দরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?
- ১০। একটি গাড়ির বিক্রয়মূল্য গাড়িটির ক্রয়মূল্যের $\frac{8}{5}$ অংশের সমান। শতকরা লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করো।
- ১১। একটি দ্রব্য ৪০০ টাকায় বিক্রয় করলে যত ক্ষতি হয় ৪৮০ টাকায় বিক্রয় করলে, তার তিনগুণ লাভ হয়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য নির্ণয় করো।
- ১২। একটি ঘড়ি ৬২৫ টাকায় বিক্রয় করলে ১০% ক্ষতি হয়। কত টাকায় বিক্রয় করলে ১০% লাভ হবে?
- ১৩। মাইশা প্রতি মিটার ২০ টাকা দরে ১৫ মিটার লাল ফিতা ক্রয় করল। ভ্যাটের হার ৪ টাকা। সে দোকানিকে ৫০০ টাকার একটি নোট দিল। দোকানি তাকে কত টাকা ফেরত দেবেন?
- ১৪। মি. রায় একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি তীর্থস্থান পরিদর্শনের জন্য ভারতে যাবেন। যদি বাংলাদেশি ১ টাকা সমান ভারতীয় ০.৮৫ রুপি হয়, তবে ভারতীয় ৪২,৫০০ রুপির জন্য বাংলাদেশের কত টাকা প্রয়োজন হবে?
- ১৫। নীলিম সাহেব একজন চাকুরিজীবী। তাঁর মাসিক মূল বেতন ২২,২৫০ টাকা। বার্ষিক মোট আয়ের প্রথম দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার আয়কর ০ (শূন্য) টাকা। পরবর্তী টাকার উপর আয়করের হার ১০ টাকা হলে নীলিম কর বাবদ কত টাকা পরিশোধ করেন?

২.৪ গতি বিষয়ক সমস্যা

স্থির পানি ও শ্রোতস্বিনী নদীতে নৌকার বেগ এক হবে না। শ্রোতস্বিনী নদীতে শ্রোতের অনুকূলে (একই দিকে) নৌকা চালালে নৌকার নিজস্ব বেগের সাথে শ্রোতের বেগ যোগ করতে হবে। শ্রোতের প্রতিকূলে (বিপরীত দিকে) নৌকার নিজস্ব বেগ থেকে শ্রোতের বেগ বিয়োগ করতে হবে। শ্রোতের অনুকূলে বা প্রতিকূলে নৌকা যে গতিতে চলে তা হলো নৌকার কার্যকরী গতিবেগ।

শ্রোতের অনুকূলে নৌকার কার্যকরী গতিবেগ = নৌকার প্রকৃত গতিবেগ + শ্রোতের গতিবেগ।

শ্রোতের প্রতিকূলে নৌকার কার্যকরী গতিবেগ = নৌকার প্রকৃত গতিবেগ - শ্রোতের গতিবেগ।

উদাহরণ ২০। একটি নৌকা স্থির পানিতে ঘণ্টায় ৬ কি.মি. যেতে পারে। শ্রোতের প্রতিকূলে ৬ কি.মি. যেতে নৌকাটির ৩ গুণ সময় লাগে। শ্রোতের অনুকূলে ৫০ কি.মি. যেতে নৌকাটির কত সময় লাগবে?

সমাধান : নৌকাটি স্থির পানিতে ৬ কি.মি. যায় ১ ঘণ্টায়

শ্রোতের প্রতিকূলে ৬ কি.মি. যায় 1×3 ঘণ্টায় বা ৩ ঘণ্টায়

প্রশ্নমতে, ৩ ঘণ্টায় যায় ৬ কি.মি.

\therefore ১ " " $\frac{6}{3}$ " বা ২ কি.মি.

শ্রোতের প্রতিকূলে (বিপরীত দিকে) নৌকার কার্যকরী বেগ = নৌকার প্রকৃত বেগ – শ্রোতের বেগ

\therefore শ্রোতের বেগ = নৌকার প্রকৃত বেগ – নৌকার কার্যকরী বেগ

$$= (6 - 2) \text{ কি.মি. বা } 4 \text{ কি.মি. প্রতি ঘণ্টায়}$$

শ্রোতের অনুকূলে নৌকার (একই দিকে) কার্যকরী বেগ = নৌকার প্রকৃত গতিবেগ + শ্রোতের বেগ

$$= (6 + 4) \text{ কি.মি. বা } 10 \text{ কি.মি. প্রতি ঘণ্টায়}$$

শ্রোতের অনুকূলে ১০ কি.মি. যায় ১ ঘণ্টায়

" " ১ " " $\frac{1}{10}$ "

\therefore " " ৫০ " " $\frac{1 \times 50}{10}$ ঘণ্টায় বা ৫ ঘণ্টায়

শ্রোতের অনুকূলে যেতে ৫ ঘণ্টা লাগবে।

উদাহরণ ২১। একটি চৌবাচ্চায় তিনটি নল আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় নল দ্বারা যথাক্রমে ৩০ মিনিট ও ২০ মিনিটে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হয়। তৃতীয় নল দ্বারা পূর্ণ চৌবাচ্চাটি ৬০ মিনিটে খালি হয়।

(ক) তৃতীয় নল দ্বারা ১ মিনিটে চৌবাচ্চাটির কত অংশ খালি হয়?

(খ) তিনটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি কত মিনিটে পূর্ণ হবে?

(গ) প্রথম নল কখন বন্ধ করলে ১ম ও ২য় নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি ১৮ মিনিটে পানি পূর্ণ হবে?

সমাধান: (ক) তৃতীয় নল দ্বারা ৬০ মিনিটে খালি হয় ১টি চৌবাচ্চা

" " " ১ " " " $\frac{1}{60}$ অংশ

(খ) ১ম নল দ্বারা ৩০ মিনিটে পূর্ণ হয় ১ অংশ

" " " ১ " " " $\frac{1}{30}$

২য় নল দ্বারা ২০ মিনিটে পূর্ণ হয় ১ অংশ

" " " ১ " " " $\frac{1}{20}$

এবং ৩য় নল দ্বারা ৬০ মিনিটে খালি হয় ১ অংশ

৩য় " " ১ " " " $\frac{1}{60}$

তিনটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে ১মিনিটে পূর্ণ হয় $(\frac{১}{৩০} + \frac{১}{২০} - \frac{১}{৬০})$ অংশ

$$= \frac{২+৩-১}{৬০} \text{ অংশ} = \frac{৪}{৬০} \text{ অংশ} = \frac{১}{১৫} \text{ অংশ}$$

$\frac{১}{১৫}$ অংশ পূর্ণ হয় ১ মিনিটে

$$\text{সুতরাং } ১ \text{ ,, ,, ,, } ১ \times \frac{১৫}{১} \text{ ,,}$$

$$= ১৫ \text{ মি.}$$

গ. ২য় নল দ্বারা ২০ মিনিট পূর্ণ হয় ১ অংশ

২য় ,, ,, ১ ,, ,, ,, $\frac{১}{২০}$ অংশ

২য় ,, ,, ১৮ ,, ,, ,, $\frac{১ \times ১৮}{২০}$ অংশ

$$= \frac{৯}{১০} \text{ অংশ।}$$

সুতরাং, অবশিষ্ট থাকে $(১ - \frac{৯}{১০})$ অংশ = $\frac{১০-৯}{১০}$ অংশ

$$= \frac{১}{১০} \text{ অংশ।}$$

১ম নল দ্বারা ১ মিনিটে পূর্ণ হয় $\frac{১}{৩০}$ অংশ।

$\frac{১}{৩০}$ অংশ পূর্ণ হতে সময় লাগে ১ মিনিট

১ ,, ,, ,, ,, ,, $\frac{১ \times ৩০}{১}$ মিনিট

$\frac{১}{১০}$,, ,, ,, ,, ,, $\frac{১ \times ৩০}{১ \times ১০}$ মিনিট

$$= ৩ \text{ মিনিট}$$

সুতরাং প্রথম নলটি ৩ মিনিট পর বন্ধ করলে ১ম ও ২য় নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি ১৮ মিনিটে পানি পূর্ণ হবে।

উদাহরণ ২২। ৬০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেনের গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৮ কি.মি.। রেললাইনের পাশের একটি খুঁটিকে অতিক্রম করতে ট্রেনটির কত সময় লাগবে?

সমাধান : খুঁটিটি অতিক্রম করতে ট্রেনটিকে নিজের দৈর্ঘ্যের সমান দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে।

৪৮ কি.মি. = ৪৮ × ১০০০ মিটার বা ৪৮০০০ মিটার

ট্রেনটি ৪৮০০০ মি. অতিক্রম করে ১ ঘণ্টায়

" ১ " " " $\frac{১}{৪৮০০০}$ ঘণ্টায় বা $\frac{১ \times ৬০ \times ৬০}{৪৮০০০}$ সেকেন্ডে

" ৬০ " " " $\frac{১ \times ৬০ \times ৬০ \times ৬০}{৪৮০০০ \times ৬০}$ সেকেন্ডে
 $= \frac{৯}{২}$ সেকেন্ড $= ৪ \frac{১}{২}$ সেকেন্ড

ট্রেনটি $৪ \frac{১}{২}$ সেকেন্ডে খুঁটিটি অতিক্রম করবে।

অনুশীলনী ২.৩

- ১। ৪ : ৯ এর দ্বিভাজিত অনুপাত কোনটি?
 (ক) ২ : ৩ (খ) ৪ : ৯ (গ) ৯ : ৪ (ঘ) ১৬ : ৮১
- ২। ক : খ = ৪ : ৭ এবং খ : গ = ১০ : ৭ হলে গ : খ : ক = কত?
 (ক) ৪৯ : ৭০ : ৪০ (খ) ৪৯ : ৪০ : ৭০ (গ) ৪০ : ৭০ : ৪৯ (ঘ) ৪০ : ৪৯ : ৭০
- ৩। ৪ : ৩ ও ৫ : ৬ এর ধারাবাহিক অনুপাতের দ্বিতীয় রাশির মান কত?
 (ক) ২০ (খ) ১৮ (গ) ১৬ (ঘ) ১৫
- ৪। ৫ : ৩ এবং ২ : ৫ এর ধারাবাহিক অনুপাত কোনটি?
 (ক) ১০ : ৬ : ১৫ (খ) ৩ : ৫ : ৬ (গ) ৫ : ৬ : ৫ (ঘ) ১৫ : ৬ : ১০
- ৫। ৩, ৫, ১৫ এর চতুর্থ সমানুপাতী কোনটি?
 (ক) ২০ (খ) ২৫ (গ) ৩০ (ঘ) ৩৫
- ৬। একজন কলাবিক্রেতা প্রতি হালি কলা ২৫ টাকা দরে ক্রয় করে প্রতি হালি ২৭ টাকা দরে বিক্রয় করলে, তাঁর ৫০ টাকা লাভ হয়। সে কত হালি কলা ক্রয় করেছিল?
 (ক) ২৫ হালি (খ) ২০ হালি (গ) ৫০ হালি (ঘ) ২৭ হালি
- ৭। ৫ জন শ্রমিক ৬ দিনে ৮ বিঘা জমির ফসল উঠাতে পারে। ২০ বিঘা জমির ফসল উঠাতে ২৫ জন শ্রমিকের কত দিন লাগবে?
- ৮। স্বপন একটি কাজ ২৪ দিনে করতে পারে। রতন উক্ত কাজ ১৬ দিনে করতে পারে। স্বপন ও রতন একত্রে কাজটি কত দিনে শেষ করতে পারবে?
- ৯। হাবিবা ও হালিমা একটি কাজ একত্রে ২০ দিনে করতে পারে। হাবিবা ও হালিমা একত্রে ৮ দিন কাজ করার পর হাবিবা চলে গেল। হালিমা বাকি কাজ ২১ দিনে শেষ করল। সম্পূর্ণ কাজটি হালিমা কত দিনে করতে পারত?

- ১০। ৩০জন শ্রমিক ২০ দিনে একটি বাড়ি তৈরি করতে পারে। কাজ শুরু ১০ দিন পরে খারাপ আবহাওয়ার জন্য ৬ দিন কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে কাজটি শেষ করতে অতিরিক্ত কতজন শ্রমিক লাগবে?
- ১১। একটি কাজ ক ও খ একত্রে ১৬ দিনে, খ ও গ একত্রে ১২ দিনে এবং ক ও গ একত্রে ২০ দিনে করতে পারে। ক, খ ও গ একত্রে কাজটি কত দিনে করতে পারবে?
- ১২। একটি চৌবাচ্চায় দুটি নল আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় নল দ্বারা যথাক্রমে ১২ ঘণ্টা ও ১৮ ঘণ্টায় খালি চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হয়। দুটি নল এক সাথে খুলে দিলে খালি চৌবাচ্চাটি কত ঘণ্টায় পূর্ণ হবে?
- ১৩। শ্রোতের অনুকূলে একটি নৌকা ৪ ঘণ্টায় ৩৬ কি.মি. পথ অতিক্রম করে। শ্রোতের বেগ প্রতি ঘণ্টায় ৩ কি.মি. হলে, স্থির পানিতে নৌকার বেগ কত?
- ১৪। শ্রোতের প্রতিকূলে একটি জাহাজ ১১ ঘণ্টায় ৭৭ কি.মি. পথ অতিক্রম করে। স্থির পানিতে জাহাজের গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ৯ কি.মি. হলে, শ্রোতের গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় কত?
- ১৫। দাঁড় বেয়ে একটি নৌকা শ্রোতের অনুকূলে ১৫ মিনিটে ৩ কি.মি. এবং শ্রোতের প্রতিকূলে ১৫ মিনিটে ১ কি.মি. পথ অতিক্রম করে। স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগ ও শ্রোতের পানিতে নৌকার গতিবেগ নির্ণয় করো।
- ১৬। লিলি একা একটি কাজ ১০ ঘণ্টায় করতে পারেন। মিলি একা ঐ কাজটি ৮ ঘণ্টায় করতে পারেন। লিলি ও মিলি একত্রে ঐ কাজটি কত ঘণ্টায় করতে পারবেন?
- ১৭। দুটি নল দ্বারা একটি খালি চৌবাচ্চা যথাক্রমে ২০ মিনিটে ও ৩০ মিনিটে পানি-পূর্ণ করা যায়। চৌবাচ্চাটি খালি থাকা অবস্থায় দুটি নল এক সাথে খুলে দেওয়া হলো। প্রথম নলটি কখন বন্ধ করলে চৌবাচ্চাটি ১৮ মিনিটে পানি-পূর্ণ হবে?
- ১৮। ১০০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেনের গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৮ কিলোমিটার। ঐ ট্রেনটি ৩০ সেকেন্ডে একটি সেতু অতিক্রম করে। সেতুটির দৈর্ঘ্য কত?
- ১৯। ১২০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ৩৩০ মিটার দীর্ঘ একটি সেতু অতিক্রম করবে। ট্রেনটির গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০ কি.মি. হলে, সেতুটি অতিক্রম করতে ট্রেনটির কত সময় লাগবে?
- ২০। তামা, দস্তা ও রূপা মিশিয়ে একটি গহনা তৈরি করা হলো। ঐ গহনায় তামা ও দস্তার অনুপাত ১:২ এবং দস্তা: রূপার অনুপাত ৩:৫। গহনার ওজন ১৯০ গ্রাম।
 (ক) তামা, দস্তা ও রূপার অনুপাত নির্ণয় করো।
 (খ) গহনায় তামা, দস্তা ও রূপার ওজন পৃথকভাবে নির্ণয় করো।
 (গ) ঐ গহনায় কি পরিমাণ দস্তা মিশালে তামা ও দস্তার অনুপাত ১:৩ হবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। একজন দোকানদার একটি দিয়াশলাই বাক্স ১.৫০ টাকায় ক্রয় করে ২.০০ টাকায় বিক্রয় করলে তাঁর শতকরা কত লাভ হবে?
 (ক) ২০% (খ) ১৫% (গ) ২৫% (ঘ) $33\frac{1}{3}\%$
- ২। দুইটি অনুপাত ২ : ৩ ও ৮ : ১২ হলে—
 (i) ২য় অনুপাতের উত্তর রাশি ৮
 (ii) অনুপাত দুটির ধারাবাহিক অনুপাত ১৬ : ২৪ : ৩৬
 (iii) অনুপাত দুটির চারটি রাশি সমানুপাত তৈরি করে।
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের ভিত্তিতে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩০ মিটার কাপড় মাইশা, মারিয়া ও তনিয়ার মধ্যে ৫ : ৩ : ২ অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হল।

- ৩। মাইশা কত মিটার কাপড় পেল?
 (ক) ১৫ (খ) ৯ (গ) ৬ (ঘ) ৫
- ৪। তনিয়া থেকে মারিয়া কত মিটার কাপড় বেশি পেল?
 (ক) ৩ (খ) ৫ (গ) ৬ (ঘ) ৯

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ৫। একজন ব্যবসায়ী ২৫% লাভে ১৬০০ টাকায় একটি ক্যালকুলেটর বিক্রয় করেন এবং একটি ঘড়ি ৮০০ টাকায় বিক্রয় করায় তার ক্ষতি হলো। ঘড়িটি ১২০০ টাকায় বিক্রয় করতে পারলে ক্ষতির তিনগুণ টাকা লাভ হতো।
 (ক) ৫ সে.মি., ৭ সে.মি., ১৪ সে.মি. এবং ১০ সে.মি. রাশি চারটি দ্বারা সমানুপাত লেখো।
 (খ) ক্যালকুলেটরটি বিক্রয় করে ওই ব্যবসায়ীর কত টাকা লাভ হয়েছিল তা নির্ণয় করো।
 (গ) ঘড়িটি ৮০০ টাকায় বিক্রয় করায় ওই ব্যবসায়ীর শতকরা কত টাকা ক্ষতি হয় তা নির্ণয় করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ৬। ক) অমি ও সুমির মধ্যে ৬০ টাকা ভাগ করে দেওয়া হলো। অমি সুমি অপেক্ষা ১২ টাকা বেশি পেলে তাদের প্রাপ্ত টাকার অনুপাত নির্ণয় করো।
 খ) ক্রমিক সমানুপাতে থাকা চারজন লোকের তিন জনের বয়স ১১ বছর, ১৬ বছর, ২২ বছর হলে, চতুর্থ জনের বয়স কত বছর তা নির্ণয় করো।
 গ) একটি দ্রব্য ১২০ টাকায় ক্রয় করে ২০ টাকা লাভে বিক্রয় করলে ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত নির্ণয় করো।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিমাপ

বাস্তব জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের বস্তু ব্যবহার করি। সেই সব বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করাই হচ্ছে পরিমাপ। সাধারণত আমরা কঠিন বস্তুর ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য, ওজন, ক্ষেত্রফল ও আয়তন প্রভৃতি পরিমাপ করা হয়। কিন্তু তরল পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই বিধায় একে কোনো পাত্রে রেখে পাত্রের আয়তন নির্ণয়ের মাধ্যমে তরলের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এই অধ্যায়ে আমরা দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, ওজন ও তরলের আয়তন পরিমাপের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

- দৈর্ঘ্য পরিমাপের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবে;
- ওজন ও তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ কীভাবে করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং এ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান করতে পারবে;
- স্কেল ব্যবহার করে আয়তাকার ও বর্গাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপ করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবে;
- ওজন পরিমাপের বিভিন্ন পরিমাপক ব্যবহার করে দ্রব্যাদির ওজন পরিমাপ করতে পারবে;
- তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের বিভিন্ন পরিমাপক ব্যবহার করে যেকোনো তরল পদার্থের পরিমাপ করতে পারবে;
- দৈনন্দিন জীবনে আনুমানিক পরিমাপ করতে পারবে।

৩.১ দৈর্ঘ্য পরিমাপ


আমরা বাজারে গিয়ে কাপড়, বৈদ্যুতিক তার, রশি ইত্যাদি কিনে থাকি। একটা নির্দিষ্ট মাপের দৈর্ঘ্যের সাথে তুলনা করে এগুলো ক্রয়-বিক্রয় হয়। আবার বাড়ি হতে স্কুল, বাজার বা স্টেশন কত দূর তা-ও আমাদের জানার প্রয়োজন হয়। এই দূরত্বও আমরা ঐ নির্দিষ্ট মাপের দৈর্ঘ্যের সাথে তুলনা করে বের করি। এই দৈর্ঘ্যকে পরিমাপের একক বলা হয়। দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য ২টি পদ্ধতি প্রচলিত। (১) ব্রিটিশ পদ্ধতি ও (২) মেট্রিক পদ্ধতি



ব্রিটিশ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক হিসেবে গজ, ফুট, ইঞ্চি চালু আছে। তবে বর্তমানে পৃথিবীতে অধিকাংশ দেশে দৈর্ঘ্য পরিমাপে ব্যবহৃত হচ্ছে মেট্রিক পদ্ধতি। মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক হিসেবে মিটার, সেন্টিমিটার, কিলোমিটারে চালু রয়েছে। পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের

দ্রাঘিমা বরাবর বিষুবরেখা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের কোটিভাগের একভাগকে ১ মিটার হিসেবে গণ্য করা হয়। মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক হচ্ছে মিটার।

১ মিটার = উত্তর মেরু থেকে বিষুবরেখা পর্যন্ত মোট দূরত্বের ১ কোটি ভাগের ১ ভাগ



প্লাটিনাম ও ইরিডিয়াম ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরি মিটারের আসল নমুনাটি দৈর্ঘ্য পরিমাপের এককটি পৃথিবীর সব দেশের জন্য আদর্শ বা স্ট্যান্ডার্ডরূপে গণ্য করা হয়। এটি ফ্রান্সের জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। বিভিন্ন দেশের প্রয়োজনে আদর্শ নমুনা থেকে স্থানীয় নমুনা তৈরি করে নেওয়া হয়।

লক্ষ করি, ১৯৮২ সাল থেকে বাংলাদেশের সর্বত্র দৈর্ঘ্য মাপার জন্য, ওজন নির্ণয়ের জন্য এবং তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের জন্য 'আন্তর্জাতিক আদর্শমান' বা 'সিস্টেম অব ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট'(SI) গ্রহণ করা হয়েছে।

দৈর্ঘ্য পরিমাপের এককাবলি

মেট্রিক পদ্ধতি		ব্রিটিশ পদ্ধতি	
১০ মিলিমিটার (মি.মি.)	= ১ সেন্টিমিটার (সে. মি.)	১২ ইঞ্চি	= ১ ফুট
১০ সেন্টিমিটার	= ১ ডেসিমিটার (ডেসি. মি.)	৩ ফুট	= ১ গজ
১০ ডেসিমিটার	= ১ মিটার (মি.)	১৭৬০ গজ	= ১ মাইল
১০ মিটার	= ১ ডেকামিটার (ডেকা. মি.)		
১০ ডেকামিটার	= ১ হেক্টোমিটার (হে. মি.)		
১০ হেক্টোমিটার	= ১ কিলোমিটার (কি. মি.)		

মেট্রিক ও ব্রিটিশ পরিমাপের সম্পর্ক

১ ইঞ্চি	=	২.৫৪ সে. মি. (প্রায়)
১ মাইল	=	১.৬১ কি. মি. (প্রায়)
১ মিটার	=	৩৯.৩৭ ইঞ্চি (প্রায়)
১ কি. মি.	=	০.৬২ মাইল (প্রায়)

কাজ : ১। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয় বা কাজে লাগে এমন কিছু বস্তুর নাম কর, যাদের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে হয়।
 ২। স্কেল দিয়ে তোমার একটি বইয়ের ও টেবিলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইঞ্চিতে এবং সেন্টিমিটারে মাপ। এ হতে ১ ইঞ্চি সমান কত সেন্টিমিটার তা নির্ণয় করো।
 ৩। মাপার ফিতা দিয়ে শ্রেণিকক্ষের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপ করো।

৩.২ ক্ষেত্রফল পরিমাপ

ক্ষেত্রফল পরিমাপের ধারণা আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বসবাসের জন্য ঘর-বাড়ি হতে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সরকারি বিভিন্ন ভবন ইত্যাদি আমাদের খুবই প্রয়োজনীয় স্থাপনা। এগুলো যে জমির উপর তৈরি করতে হয় তার ক্ষেত্রফল জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।


কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ স্থান হলো ক্ষেত্র এবং এই ক্ষেত্রের পরিমাপকে তার ক্ষেত্রফল বা কালি বলে।

যেকোনো ক্ষেত্রের সাধারণত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থাকে। এ জন্য ক্ষেত্রফলের একক হিসেবে এক একক দৈর্ঘ্যের বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলকে ধরা হয়। ক্ষেত্রফলের একককে বর্গ একক লেখা হয়। যে বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য ১ মিটার, তার ক্ষেত্রফল ১ বর্গমিটার। অনুরূপ ১ বর্গফুট, ১ বর্গসেন্টিমিটার, ইত্যাদিও ক্ষেত্রফলের একক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।



কোনো ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হলে, এর মধ্যে কতগুলো বর্গএকক আছে তা বের করতে হয়।

মনে করি, নিচের বর্গক্ষেত্রের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ১ মিটার। অতএব, এর ক্ষেত্রফল ১ বর্গমিটার। বর্গক্ষেত্রটির প্রত্যেক বাহুকে সমান ১০ অংশে বিভক্ত করে বিপরীত বিন্দুগুলো পরস্পর সংযুক্ত করা হলো।



চিত্র : ১ এ প্রতিটি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য ১ ডেসিমিটার। চিত্র : ২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে চিত্র ১এর ১টি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রে ১০০টি অতি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র রয়েছে।

১ ডেসিমিটার \times ১ ডেসিমিটার = ১ বর্গডেসিমিটার।


অতএব, ১ বর্গমিটার = ১০০ বর্গডেসিমিটার।

তদ্রূপ, ১ ডেসিমিটার দৈর্ঘ্যের বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র নিয়ে এর প্রত্যেক বাহুকে ১০টি সমান অংশে ভাগ করে আগের মতো সংযুক্ত করে দেখানো যায় যে, ১ বর্গডেসিমিটার = (১০×১০) বর্গসে.মি. বা ১০০ বর্গসেন্টিমিটার।


অতএব, ১ বর্গমিটার = ১০০×১০০ বর্গসেন্টিমিটার = $১০,০০০$ বর্গসেন্টিমিটার।

লক্ষ করি, ৪ মিটার বর্গ এবং ৪ বর্গমিটার এক কথা নয়। ৪ মিটার বর্গ দ্বারা এমন একটি বর্গক্ষেত্রকে বোঝায় যার প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ৪ মিটার এবং যার ক্ষেত্রফল (৪×৪) বর্গমিটার বা ১৬ বর্গমিটার। কিন্তু ৪ বর্গমিটার দ্বারা এমন একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বোঝায় যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মিটারের এককে মেপে গুণ করলে ৪ হয়।


নিচে কয়েকটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র দেওয়া হলো :

আয়ত  b প্রস্থ

আয়তাকারক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য \times প্রস্থ
 $= l \times b$

সামান্তরিক  h উচ্চতা

সামান্তরিকক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = ভূমি \times উচ্চতা
 $= l \times h$

ত্রিভুজ  h উচ্চতা

ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times$ ভূমি \times উচ্চতা
 $= \frac{1}{2} \times (b \times h)$

ক্ষেত্রফল পরিমাপে মেট্রিক ও ব্রিটিশ পদ্ধতির সম্পর্ক

ব্রিটিশ পদ্ধতিতে

১ বর্গইঞ্চি	= ৬.৪৫ বর্গসেন্টিমিটার (প্রায়)
১ বর্গফুট	= ৯২৯ বর্গসেন্টিমিটার (প্রায়)
১ বর্গগজ	= ০.৮৮ বর্গমিটার (প্রায়)

স্থানীয় পদ্ধতিতে

১ বর্গসেন্টিমিটার	= ০.১৫৫ বর্গইঞ্চি (প্রায়)
১ বর্গমিটার	= ১০.৭৬ বর্গফুট (প্রায়)
১ হেক্টর	= ২.৪৭ একর (প্রায়)

কাজ :	
১।	স্কেল দিয়ে তোমার একটি বইয়ের ও পড়ার টেবিলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সেন্টিমিটারে মেপে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।
২।	দলগতভাবে তোমরা বেঞ্চ, টেবিল, দরজা, জানালা ইত্যাদির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ স্কেলের সাহায্যে মেপে ক্ষেত্রফল বের করো।

৩.৩ ওজন পরিমাপ

প্রত্যেক বস্তুর ওজন আছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন এককের সাহায্যে বস্তু ওজন করা হয়। মেট্রিক পদ্ধতিতে ওজন পরিমাপের একটি একক গ্রাম।

৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১ ঘন সে. মি. বিশুদ্ধ পানির ওজন ১ গ্রাম।

মেট্রিক পদ্ধতিতে ওজন পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত আরও দুটি একক আছে। অধিক পরিমাণ বস্তুর ওজনের জন্য এ দুটি একক ব্যবহার করা হয়। একক দুটি হচ্ছে কুইন্টাল ও মেট্রিক টন।


ফর্মা নং-৬, গণিত-৭ম শ্রেণি, দাখিল

ওজন পরিমাপের মেট্রিক একক

১০ মিলিগ্রাম (মি. গ্রা.)	=	১ সেন্টিগ্রাম (সে. গ্রা.)
১০ সেন্টিগ্রাম	=	১ ডেসিগ্রাম (ডেসিগ্রা.)
১০ ডেসিগ্রাম	=	১ গ্রাম (গ্রা.)
১০ গ্রাম	=	১ ডেকাগ্রাম (ডেকাগ্রা.)
১০ ডেকাগ্রাম	=	১ হেক্টোগ্রাম (হে. গ্রা.)
১০ হেক্টোগ্রাম	=	১ কিলোগ্রাম (কে. জি.)
১ কিলোগ্রাম বা ১ কে.জি.	=	১০০০ গ্রাম
১০০ কিলোগ্রাম (কে. জি.)	=	১ কুইন্টাল
১০০০ কিলোগ্রাম বা ১০ কুইন্টাল	=	১ মেট্রিক টন

শহরে ও গ্রামে ওজন পরিমাপের জন্য দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা ব্যবহার করা হয়। এ বাটখারা ৫ গ্রাম, ১০ গ্রাম, ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কে. জি., ২ কে. জি., ৫ কে. জি., ১০ কে. জি. ইত্যাদি ওজনের হয়।

অনেক ক্ষেত্রে শহরে দাগকাটা ব্যালেন্স দ্বারা ওজন পরিমাপ করা হয়। এটি দেখতে অনেকটাই একটি কর্তিত পিরামিডের নিচের অংশের মতো যার উপরে দ্রব্য রাখা যায় এবং যার গায়ে একপাশে দেয়ালঘড়ির ডায়ালের দাগের মতো গোলাকার রেখায় দাগ কাটা থাকে। ওজনের সমহারে কিলোগ্রামের মাপে দাগের পাশে সংখ্যা বসানো থাকে এবং ঘড়ির মিনিটের কাঁটার মতো একটা নির্দেশক কাঁটা থাকে। মাপার জন্য ব্যালেন্সের উপর কোনো দ্রব্য বসালেই কাঁটাটি যে সংখ্যাকে নির্দেশ করে সে সংখ্যাই ঐ বস্তুর ওজন। এতে প্রতি কে. জি.কে ১০ ভাগে ভাগ করে দাগ কাটা আছে।



দাগকাটা ব্যালেন্স



ডিজিটাল ব্যালেন্স

বর্তমানে দাগকাটা ব্যালেন্স এর স্থলে ডিজিটাল ব্যালেন্স ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি একটি ছোট বাক্সের মতো যার গায়ে এক পাশে সংখ্যায় গ্রামে ওজন প্রদর্শিত হয়। এর সাহায্যে দ্রব্যের মূল্যও নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। কারণ এই ব্যালেন্সে ক্যালকুলেটরের সুবিধাও থাকে। প্রতি কিলোগ্রাম দ্রব্যের মূল্যমান দিয়ে প্রদর্শিত সংখ্যাকে ক্যালকুলেটরের নিয়মে গুণ করলেই দ্রব্যের মোট মূল্য পাওয়া যায়। এ জন্য এই ব্যালেন্স ব্যবহার করা সুবিধাজনক। তবে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ওজন করতে এখনও দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হয়।

কাজ : দলীয়ভাবে দাঁড়িপাল্লা অথবা ডিজিটাল ব্যালেন্স ব্যবহার করে স্কেল, পুস্তক, টিফিনবক্সের ওজন পরিমাপ করে মেট্রিক পদ্ধতিতে লেখো।

৩.৪ তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ


কোনো তরল পদার্থ যতটা জায়গা জুড়ে থাকে তা এর আয়তন।

একটি ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা আছে। কিন্তু কোনো তরল পদার্থের তা নেই। যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। এ জন্য নির্দিষ্ট আয়তনের কোনো ঘনবস্তুর আকৃতির মাপনি দ্বারা তরল পদার্থ মাপা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত লিটার মাপনি ব্যবহার করি। এ মাপনিগুলো $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{2}$, ১, ২, ৩, ৪,

ইত্যাদি লিটার বিশিষ্ট অ্যালুমিনিয়াম বা টিন শিট দ্বারা তৈরি এক প্রকারের কোণক আকৃতির পাত্র বা সিলিন্ডার আকৃতির মগ। আবার স্বচ্ছ কাচের তৈরি ২৫, ৫০, ১০০, ২০০, ৩০০, ৫০০, ১০০০ মিলিলিটার দাগকাটা খাড়া পাত্রও ব্যবহার করা হয়। সাধারণত দুধ ও তৈল মাপার ক্ষেত্রে উল্লিখিত পাত্রগুলো ব্যবহার করা হয়।



১ লিটার মাপনি



১ লিটার দাগকাটা মগ

ক্রোতা-বিক্রেতার সুবিধার্থে বর্তমানে ভোজ্যতৈল বোতলজাত করে বিক্রি হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ১, ২, ৫ ও ৮ লিটারের বোতল বেশি ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকারের পানীয় ২৫০, ৫০০, ১০০০, ২০০০ মিলিলিটার বা অন্যান্য আয়তনে বোতলজাত করে বিক্রি করা হয়।



১ লিটার বোতল



৫ লিটার বোতল

১ ঘন সেন্টিমিটারকে সংক্ষেপে ইংরেজিতে সি. সি. (Cubic Centimetre) লেখা হয়।

২
২০২৩

১ ঘন সে.মি. (সি.সি.) = ১ মিলিলিটার

১ ঘন ইঞ্চি = ১৬.৩৯ মিলিলিটার (প্রায়)

আয়তন পরিমাপে মেট্রিক একক

১০০০ ঘন সেন্টিমিটার (ঘন সে. মি.)	=	১ ঘন ডেসিমিটার (ঘ. ডেসিমি.)
১০০০ ঘন ডেসিমিটার	=	১ ঘন মিটার (ঘ. মি.)
১০০০ ঘন সেন্টিমিটার	=	১ লিটার
১ লিটার পানির ওজন	=	১ কিলোগ্রাম

কাজ :

- একটি পানীয়জলের পাত্রের ধারণক্ষমতা কত সি. সি. তা পরিমাপ করো।
- শিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত অজানা আয়তনের একটি পাত্রের আয়তন অনুমান কর। তারপর এর সঠিক আয়তন বের করে ভুলের পরিমাণ নির্ণয় করো।

উদাহরণ ১। ১৬ একর জমিতে ৪২০ মেট্রিক টন আলু উৎপন্ন হলে, ১ একর জমিতে কী পরিমাণ আলু উৎপন্ন হয়?

সমাধান : ১৬ একর জমিতে উৎপন্ন হয় ৪২০ মেট্রিক টন আলু

$$\therefore 1 \text{ " " " " } \frac{820 \text{ " " " "}}{16}$$

$$= 26\frac{1}{8} \text{ মে. টন বা } 26 \text{ মেট্রিক টন } 2 \text{ কুইন্টাল } 50 \text{ কেজি আলু।}$$

$$1 \text{ মে. টন} = 1000 \text{ কেজি}$$

\therefore ১ একরে আলুর উৎপাদন ২৬ মেট্রিক টন ২৫০ কেজি।

উদাহরণ ২। রায়হান এক একর জমিতে ধান চাষ করে ৪ কুইন্টাল ধান পেয়েছে। প্রতি কেজি ধানে ৭০০ গ্রাম চাল হলে, সে কী পরিমাণ চাল পেল?

সমাধান : ১ কে. জি. ধানে চাল হয় ৭০০ গ্রাম

$$\therefore 800 \text{ " " " " } 900 \times 800 \text{ "}$$

$$= 280000 \text{ গ্রাম}$$

$$= 280 \text{ কেজি}$$

$$= 2 \text{ কুইন্টাল } 80 \text{ কেজি}$$

\therefore প্রাপ্ত চালের পরিমাণ ২৮০ কেজি বা ২ কুইন্টাল ৮০ কেজি।

উদাহরণ ৩। একটি মোটরপাড়ি ১০ লিটার ডিজেলে ৮০ কিলোমিটার যায়। ১ কিলোমিটার যেতে কী পরিমাণ ডিজেলের প্রয়োজন?

সমাধান : ৮০ কিলোমিটার যায় ১০ লিটার ডিজেলে

$$\therefore 1 \text{ " " " } \frac{10}{80} \text{ " " " " } = \frac{1000}{8} \text{ মিলিলিটার বা } 125 \text{ মিলিলিটার ডিজেলে}$$

\therefore প্রয়োজনীয় ডিজেলের পরিমাণ ১২৫ মিলিলিটার।

উদাহরণ ৪। একটি ত্রিভুজাকার ভূমির দৈর্ঘ্য ৬ মিটার ও উচ্চতা ৪ মিটার। ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত?

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল} &= \frac{১}{২} \times (\text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}) \\ &= \frac{১}{২} \times (৬ \times ৪) \text{ বর্গমিটার} = ১২ \text{ বর্গমিটার} \end{aligned}$$

∴ ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল ১২ বর্গমিটার।

উদাহরণ ৫। একটি ত্রিভুজাকৃতি জমির ক্ষেত্রফল ২১৬ বর্গমিটার। এর ভূমি ১৮ মিটার হলে, উচ্চতা নির্ণয় করো।

সমাধান : আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \frac{১}{২} \times \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা} &= \text{ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} \\ \text{বা, } \frac{১}{২} \times ১৮ \text{ মিটার} \times \text{উচ্চতা} &= ২১৬ \text{ বর্গমিটার} \\ \text{বা, } ৯ \text{ মিটার} \times \text{উচ্চতা} &= ২১৬ \text{ বর্গমিটার} \\ \text{বা, উচ্চতা} &= \frac{২১৬}{৯} \text{ মিটার বা } ২৪ \text{ মিটার} \end{aligned}$$

∴ উচ্চতা ২৪ মিটার।

উদাহরণ ৬। পাড়সহ একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ৮০ মিটার ও প্রস্থ ৫০ মিটার। যদি পুকুরের প্রত্যেক পাড়ের বিস্তার ৪ মিটার হয়, তবে পুকুরপাড়ের ক্ষেত্রফল কত?


সমাধান :

$$\begin{aligned} \text{পাড়সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল} &= (৮০ \times ৫০) \text{ বর্গমিটার} \\ &= ৪০০০ \text{ বর্গমিটার} \\ \text{পাড় বাদে পুকুরের দৈর্ঘ্য} &= \{৮০ - (৪ \times ২)\} \text{ মিটার} \\ &= ৭২ \text{ মিটার} \\ \text{পাড় বাদে পুকুরের প্রস্থ} &= \{৫০ - (৪ \times ২)\} \text{ মিটার} \\ &= ৪২ \text{ মিটার} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{পাড় বাদে পুকুরের ক্ষেত্রফল} &= (৭২ \times ৪২) \text{ বর্গমিটার} \\ &= ৩০২৪ \text{ বর্গমিটার} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{পুকুরপাড়ের ক্ষেত্রফল} &= (৪০০০ - ৩০২৪) \text{ বর্গমিটার} \\ &= ৯৭৬ \text{ বর্গমিটার।} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{পুকুরপাড়ের ক্ষেত্রফল } ৯৭৬ \text{ বর্গমিটার।}$$



উদাহরণ ৭। একটি আয়তাকার ঘরের পরিসীমা একটি বর্গাকার ঘরের পরিসীমার সমান। আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ৩ গুণ। প্রতি বর্গমিটারে ৭৫ টাকা দরে ঘরের মেঝে কাপেট দিয়ে মুড়তে মোট ১১০২৫ টাকা ব্যয় হয়।

- (ক) প্রস্থকে 'ক' ধরে আয়তাকার ঘরের ক্ষেত্রফল 'ক' এর মাধ্যমে বের করো।
 (খ) আয়তাকার ঘরটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো।
 (গ) ৪০ সে.মি. বর্গাকার টাইলস দ্বারা বর্গাকার ঘরের মেঝে ঢাকতে কয়টি টাইলস লাগবে?

সমাধান: (ক) মনে করি, আয়তাকার ঘরের প্রস্থ ক মিটার।

সুতরাং দৈর্ঘ্য ৩ক মিটার

অতএব ক্ষেত্রফল = (৩ক × ক) বর্গমিটার।

= ৩ক^২ বর্গমিটার।

(খ) ঘরটিতে ৭৫ টাকা খরচ হয় ১ বর্গ মি. মেঝে মোড়াতে

” ১ ” ” ” $\frac{১}{৭৫}$ ” ” ”

” ১১০২৫ ” ” ” $\frac{১ \times ১১০২৫}{৭৫}$ ” ” ”

= ১৪৭ বর্গমি. মেঝে মোড়াতে

সুতরাং মেঝের ক্ষেত্রফল ১৪৭ বর্গ মিটার।

প্রশ্নমতে, ৩ক^২ = ১৪৭ [‘ক’ থেকে প্রাপ্ত]

বা ক^২ = $\frac{১৪৭}{৩}$ বা, ক^২ = ৪৯

বা, ক = $\sqrt{৪৯}$ = ৭ মি.

সুতরাং ঘরটির প্রস্থ = ৭ মি.

সুতরাং ঘরটির দৈর্ঘ্য = ৩ক মি. = (৩ × ৭) = ২১ মি.

অতএব দৈর্ঘ্য ২১ মি., প্রস্থ ৭ মি.

(গ) খ থেকে প্রাপ্ত আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য ২১ মিটার এবং প্রস্থ ৭ মিটার

আয়তাকার ঘরের পরিসীমা = ২ (২১+৭) মিটার = ৫৬ মিটার

বর্গাকার ঘরের পরিসীমা = ৫৬ মিটার।

বর্গাকার ঘরের বাহুর দৈর্ঘ্য $\frac{৫৬}{৪}$ মিটার = ১৪ মিটার।

বর্গক্ষেত্রের মেঝের ক্ষেত্রফল = (১৪ × ১৪) বর্গমিটার = ১৯৬ বর্গমিটার।

একটি বর্গাকার টাইলস -এর ক্ষেত্রফল ৪০ সে.মি. × ৪০ সে.মি.

= ০.৪ মিটার × ০.৪ মিটার = ০.১৬ বর্গমিটার

অতএব বর্গাকার ঘরের মেঝে ঢাকতে টাইলস লাগবে = $\frac{১৯৬}{০.১৬}$ টি = ১২২৫ টি।

অনুশীলনী ৩

- ১। কোনো সামান্তরিকের ভূমি ১০ সে.মি. এবং উচ্চতা ৬ সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল কত সে.মি.?
 (ক) ৩০ (খ) ৩২ (গ) ৬০ (ঘ) ১২০


নিচের তথ্যের আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিনগুণ। এর চারদিকে সীমানা বরাবর একবার প্রদক্ষিণ করলে হাঁটা হয় ৪০০ মিটার।

- ২। বাগানের দৈর্ঘ্য কত মিটার?
 (ক) ৫০ (খ) ১০০
 (গ) ১৫০ (ঘ) ২০০
- ৩। বাগানের ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার?
 (ক) ৪০০ (খ) ২৫০০
 (গ) ৫০০০ (ঘ) ৭৫০০
- ৪। ল্যাটিন ভাষায় ডেসি অর্থ কী?
 (ক) পঞ্চমাংশ (খ) দশমাংশ
 (গ) সহস্রাংশ (ঘ) শতাংশ
- ৫। কিলোমিটারে প্রকাশ কর।
 (ক) ৪০৩৯০ সে. মি. (খ) ৭৫ মিটার ২৫০ মি. মি.
- ৬। ৫.৩৭ ডেকামিটারকে মিটার ও ডেসিমিটারে প্রকাশ করো।
- ৭। নিচে কয়েকটি ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রের ভূমি ও উচ্চতা দেওয়া হলো। ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।
 (ক) ভূমি ১০মি. ও উচ্চতা ৬ মি.।
 (খ) ভূমি ২৫ সে.মি. ও উচ্চতা ১৪ সে. মি.।
- ৮। একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ৩ গুণ। এর চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ করলে ১ কিলোমিটার হাঁটা হয়। আয়তাকার ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো।
- ৯। প্রতি মিটার ১০০ টাকা দরে ১০০ মিটার লম্বা ও ৫০ মিটার চওড়া একটি আয়তাকার পার্কের চারদিকে বেড়া দিতে কত খরচ লাগবে?
- ১০। একটি সামান্তরিক ক্ষেত্রের ভূমি ৪০ মিটার ও উচ্চতা ৫০ মিটার। এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।
- ১১। একটি ঘনকের একধারের দৈর্ঘ্য ৪ মিটার। ঘনকটির তলগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।
- ১২। আবুল তাঁর এক খণ্ড জমিতে ৫ কুইন্টাল ৭০০ গ্রাম আলু উৎপাদন করেন। তিনি একই ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ১১ খণ্ড জমিতে কী পরিমাণ আলু উৎপাদন করবেন?
- ১৩। মফিজের ১৬ একর জমিতে ২৮ মেট্রিক টন ধান উৎপন্ন হয়েছে। তাঁর প্রতি একর জমিতে কী পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়েছে?
- ১৪। একটি স্টিল মিলে এক মাসে ২০০০০ মেট্রিক টন রড তৈরি হয়। ঐ মিলে দৈনিক কী পরিমাণ রড তৈরি হয়?

- ১৫। এক ব্যবসায়ী কোনো একদিন ২০ কে. জি. ৪০০ গ্রাম ডাল বিক্রয় করেন। এ হিসাবে কী পরিমাণ ডাল তিনি এক মাসে বিক্রয় করবেন?
- ১৬। একখণ্ড জমিতে ২০ কে. জি. ৮৫০ গ্রাম সরিষা উৎপন্ন হলে, অনুরূপ ৭ খণ্ড জমিতে মোট কী পরিমাণ সরিষা উৎপন্ন হবে?
- ১৭। একটি মগের ভিতরের আয়তন ১৫০০ ঘন সেন্টিমিটার হলে, ২৭০ লিটারে কত মগ পানি হবে?
- ১৮। এক ব্যবসায়ী কোনো একদিন ১৮ কে. জি. ৩০০ গ্রাম চাল এবং ৫ কে. জি. ৭৫০ গ্রাম লবণ বিক্রয় করেন। এ হিসাবে মাসে তিনি কী পরিমাণ চাল ও লবণ বিক্রয় করেন?
- ১৯। কোনো পরিবারে দৈনিক ১.২৫ লিটার দুধ লাগে। প্রতি লিটার দুধের দাম ৫২ টাকা হলে, ঐ পরিবারে ৩০ দিনে কত টাকার দুধ লাগবে?
- ২০। একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৬০ মিটার ও ৪০ মিটার। এর ভিতরে চতুর্দিকে ২ মিটার চওড়া রাস্তা আছে। রাস্তাটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।
- ২১। একটি ঘরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থের ৩ গুণ। প্রতি বর্গমিটারে ৭.৫০ টাকা দরে ঘরের মেঝে কার্পেট দিয়ে মুড়তে মোট ১১০২.৫০ টাকা ব্যয় হয়। ঘরটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো।

২২।



চিত্রে $ABCD$ সামান্তরিকটির পরিসীমা ৩০ মিটার।

- ক) সামান্তরিকের ক্ষুদ্রতম বাহুর দৈর্ঘ্য বের করো।
- খ) ADF ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।
- গ) $\square BCDF$ এর ক্ষেত্রফল কত বর্গসেন্টিমিটার তা নির্ণয় করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। ১ বর্গফুট = কত বর্গ সে.মি.?
 (ক) ৭২৯ বর্গ সে.মি. (খ) ৮২৯ বর্গ সে.মি. (গ) ৯২৯ বর্গ সে.মি. (ঘ) ৯৯২ বর্গ সে.মি.
- ২। একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য ৫ সে.মি. হলে—
 (i) এর বাহুর দৈর্ঘ্য ৫০ মিলিমিটার (ii) এর পরিসীমা ২০ সে.মি. (iii) এর ক্ষেত্রফল ২৫ সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি জমির দৈর্ঘ্য ২০ মিটার এবং প্রস্থ ১৫ মিটার। জমিটির ভিতরে সীমানা বরাবর ২ মিটার চওড়া রাস্তা তৈরি করা হল।

- ৩। জমিটির পরিসীমা কত?
 (ক) ৩৫ মিটার (খ) ৭০ মিটার (গ) ১৫০ মিটার (ঘ) ৩০০ মিটার
- ৪। রাস্তাবাদে জমির ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার?
 (ক) ৭০ (খ) ১২৪ (গ) ১৭৬ (ঘ) ৩০০

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ৫। একটি আয়তাকার বাগানের ক্ষেত্রফল ২০২০ বর্গমিটার। এর ভিতরে চারদিকে সীমানা ঘেষে ২ মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে। রাস্তাবাদে বাগানটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৪৬ মিটার ৫০ সে.মি. এবং ৩৬ মিটার। রাস্তায় ঘাস লাগাতে প্রতি বর্গমিটারে ২০ টাকা খরচ হয়।
 (ক) ১০০ ঘন সে.মি. আয়তনের একটি পাত্রে কত মিলিলিটার পানি ধরে তা নির্ণয় করো।
 (খ) রাস্তাটিতে ঘাস লাগাতে কত টাকা খরচ হবে তা নির্ণয় করো।
 (গ) বাগানটির পরিসীমা কত ফুট তা নির্ণয় করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ৬। ক) একটি মগের আয়তন ৫০০ ঘনসে.মি. হলে, ওই মগে কত লিটার পানি ধরে তা নির্ণয় করো।
 খ) একটি ত্রিভুজাকৃতি জমির ভূমির দৈর্ঘ্য ১২ মিটার এবং উচ্চতা ৮ মিটার হলে, এর ক্ষেত্রফল কত তা নির্ণয় করো।
 গ) তোমার পড়ার টেবিলের দৈর্ঘ্য ৭০ সে.মি. ও প্রস্থ ৬০ সে.মি. হলে, টেবিলটির ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার তা নির্ণয় করো।
 ঘ) তোমার বন্ধুর উচ্চতা ১৫২.৪ সে.মি. হলে, তার উচ্চতা কত ফুট তা নির্ণয় করো।

চতুর্থ অধ্যায়

বীজগণিতীয় রাশির গুণ ও ভাগ

গণিতের চারটি মৌলিক প্রক্রিয়া হলো যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ। বিয়োগ হচ্ছে যোগের বিপরীত প্রক্রিয়া আর ভাগ হচ্ছে গুণের বিপরীত প্রক্রিয়া। পাটিগণিতে কেবল ধনাত্মক চিহ্নযুক্ত সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বীজগণিতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় চিহ্নযুক্ত সংখ্যা এবং সংখ্যাসূচক প্রতীকও ব্যবহার করা হয়। আমরা দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণিতে চিহ্নযুক্ত রাশির যোগ-বিয়োগ এবং বীজগণিতীয় রাশির যোগ ও বিয়োগ সম্বন্ধে ধারণা পেয়েছি। এ অধ্যায়ে চিহ্নযুক্ত রাশির গুণ ও ভাগ এবং বীজগণিতীয় রাশির গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা –

- বীজগণিতীয় রাশির গুণ ও ভাগ করতে পারবে;
- বন্ধনী ব্যবহারের মাধ্যমে বীজগণিতীয় রাশির যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ সংক্রান্ত দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

৪.১ বীজগণিতীয় রাশির গুণ

গুণের বিনিময়বিধি

আমরা জানি, $2 \times 3 = 6$, আবার $3 \times 2 = 6$

$\therefore 2 \times 3 = 3 \times 2$, যা গুণের বিনিময়বিধি।

a, b যেকোনো দুটি বীজগণিতীয় রাশি হলে, $a \times b = b \times a$ অর্থাৎ, গুণ্য ও গুণকের স্থান বিনিময় করলে, গুণফলের কোনো পরিবর্তন হয় না। যা গুণের বিনিময়বিধি।

গুণের সংযোগবিধি

$(2 \times 3) \times 4 = 6 \times 4 = 24$; আবার, $2 \times (3 \times 4) = 2 \times 12 = 24$

$\therefore (2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4)$, যা গুণের সংযোগবিধি।

a, b, c যেকোনো তিনটি বীজগণিতীয় রাশির জন্য
 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$, যা গুণের সংযোগবিধি।

গুণের সূচকবিধি

আমরা জানি, $a \times a = a^2$, $a \times a \times a = a^3$, $a \times a \times a \times a = a^4$

$\therefore a^2 \times a^4 = (a \times a) \times (a \times a \times a \times a) = a \times a \times a \times a \times a \times a = a^6 = a^{2+4}$

সাধারণভাবে, $a^m \times a^n = a^{m+n}$ যেখানে m, n যেকোনো পূর্ণসংখ্যা।

এই প্রক্রিয়াকে গুণের সূচকবিধি বলা হয়।

আবার, $(a^3)^2 = a^3 \times a^3 = a^6 = a^{3 \times 2} = a^6$

সাধারণভাবে, $(a^m)^n = a^{mn}$


গুণের বণ্টন বিধি

আমরা জানি, $2(a + b) = (a + b) + (a + b) [\because 2x = x + x]$
 $= (a + a) + (b + b)$
 $= 2a + 2b$

আবার পাশের চিত্র হতে পাই,

$ABEF$ আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল

$=$ দৈর্ঘ্য \times প্রস্থ $= BE \times AB = a \times 2 = 2 \times a = 2a$



আবার, $ECDF$ আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল $=$ দৈর্ঘ্য \times প্রস্থ

$= EC \times CD = b \times 2 = 2 \times b = 2b$

$\therefore ABCD$ আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল

$= ABEF$ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $+ ECDF$ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$= 2a + 2b$

আবার, $ABCD$ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$=$ দৈর্ঘ্য \times প্রস্থ

$= BC \times AB$

$= AB \times (BE + EC) \quad [\because BC=BE+EC]$

$= 2 \times (a + b) = 2(a + b)$

$\therefore 2(a + b) = 2a + 2b.$

$m(a + b + c + \dots) = ma + mb + mc + \dots$
 এই নিয়মকে গুণের বণ্টনবিধি বলা হয়।

৪.২ চিহ্নযুক্ত রাশির গুণ

আমরা জানি, ২ কে ৪ বার নিলে $2 + 2 + 2 + 2 = 8 = 2 \times 4$ হয়। এখানে বলা যায় যে, ২ কে ৪ দ্বারা গুণ করা হয়েছে।

অর্থাৎ, $2 \times 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8$

যেকোনো বীজগণিতীয় রাশি a ও b এর জন্য

$a \times b = ab \dots\dots\dots(i)$

আবার, $(-2) \times 4 = (-2) + (-2) + (-2) + (-2) = -8 = -(2 \times 4)$

অর্থাৎ, $(-2) \times 4 = -(2 \times 4) = -8$

সাধারণভাবে, $\boxed{(-a) \times b = -(a \times b) = -ab}$ (ii)

আবার, $a \times (-b) = (-b) \times a$, গুণের বিনিময়বিধি

$$= -(b \times a)$$

$$= -(a \times b)$$

$$= -ab$$

অর্থাৎ, $\boxed{a \times (-b) = -(a \times b) = -ab}$ (iii)

আবার, $(-a) \times (-b) = -\{(-a) \times b\}$ [(iii) অনুযায়ী]

$$= -\{- (a \times b)\} \quad [(ii) \text{ অনুযায়ী}]$$

$$= -(-ab)$$

$$= ab$$

[: $-x$ এর যোগাত্মক বিপরীত x]

অর্থাৎ, $\boxed{(-a) \times (-b) = ab}$ (iv)

লক্ষ করি :

* একই চিহ্নযুক্ত দুটি রাশির গুণফল (+) চিহ্নযুক্ত হবে।

* বিপরীত চিহ্নযুক্ত দুটি রাশির গুণফল (-) চিহ্নযুক্ত হবে।

$(+1) \times (+1)$	$=$	$+1$
$(-1) \times (-1)$	$=$	$+1$
$(+1) \times (-1)$	$=$	-1
$(-1) \times (+1)$	$=$	-1

৪.৩ একপদী রাশিকে একপদী রাশি দ্বারা গুণ

দুটি একপদী রাশির গুণের ক্ষেত্রে তাদের সাংখ্যিক সহগদ্বয়কে চিহ্নযুক্ত সংখ্যার গুণের নিয়মে গুণ করতে হয়। উভয়পদে বিদ্যমান বীজগণিতীয় প্রতীকগুলোকে সূচক নিয়মে গুণ করে গুণফলে লিখতে হয়।

অন্যান্য প্রতীকগুলো অপরিবর্তিত অবস্থায় গুণফলে নেওয়া হয়।

উদাহরণ ১। $5x^2y^4$ কে $3x^2y^3$ দ্বারা গুণ করো। **উদাহরণ ২।** $12a^2xy^2$ কে $-6ax^3b$ দ্বারা গুণ

সমাধান : $5x^2y^4 \times 3x^2y^3$

$$= (5 \times 3) \times (x^2 \times x^2) \times (y^4 \times y^3)$$

$$= 15x^4y^7 \quad [\text{সূচক নিয়ম অনুযায়ী}]$$

নির্ণেয় গুণফল $15x^4y^7$

করো।

সমাধান : $12a^2xy^2 \times (-6ax^3b)$

$$= 12 \times (-6) \times (a^2 \times a) \times b \times (x \times x^3) \times y^2$$

$$= -72a^3bx^4y^2$$

নির্ণেয় গুণফল $-72a^3bx^4y^2$

উদাহরণ ৩। $-7a^2b^4c$ কে $4a^2c^3d$ দ্বারা গুণ করো।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & (-7a^2b^4c) \times 4a^2c^3d \\ & = (-7 \times 4) \times (a^2 \times a^2) \times b^4 \times (c \times c^3) \times d \\ & = -28a^4b^4c^4d \end{aligned}$$

নির্ণেয় গুণফল $-28a^4b^4c^4d$

উদাহরণ ৪। $-5a^3bc^5$ কে $-4ab^5c^2$ দ্বারা গুণ করো।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & (-5a^3bc^5) \times (-4ab^5c^2) \\ & = (-5) \times (-4) \times (a^3 \times a) \times (b \times b^5) \times (c^5 \times c^2) \\ & = 20a^4b^6c^7 \end{aligned}$$

নির্ণেয় গুণফল $20a^4b^6c^7$

কাজ : ১। গুণ করো।

(ক) $7a^2b^5$ কে $8a^5b^2$ দ্বারা

(খ) $-10x^3y^4z$ কে $3x^2y^5$ দ্বারা

(গ) $9ab^2x^3y$ কে $-5xy^2$ দ্বারা

(ঘ) $-8a^3x^4by^2$ কে $-4abxy$ দ্বারা

৪.৪ বহুপদী রাশিকে একপদী রাশি দ্বারা গুণ

একের অধিক পদযুক্ত বীজগণিতীয় রাশিই বহুপদী রাশি। যেমন, $5x^2y + 7xy^2$ একটি বহুপদী রাশি।

বহুপদী রাশিকে একপদী রাশি দ্বারা গুণ করতে হলে গুণ্যের (প্রথম রাশি) প্রত্যেক পদকে গুণক (দ্বিতীয় রাশি) দ্বারা গুণ করতে হয়।

উদাহরণ ৫। $(5x^2y + 7xy^2)$ কে $5x^3y^3$ দ্বারা গুণ করো।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & (5x^2y + 7xy^2) \times 5x^3y^3 \\ & = (5x^2y \times 5x^3y^3) + (7xy^2 \times 5x^3y^3) \quad [\text{বন্টনবিধি অনুসারে}] \\ & = (5 \times 5) \times (x^2 \times x^3) \times (y \times y^3) + (7 \times 5) \times (x \times x^3) \times (y^2 \times y^3) \\ & = 25x^5y^4 + 35x^4y^5 \end{aligned}$$

নির্ণেয় গুণফল $25x^5y^4 + 35x^4y^5$

$$\begin{array}{l} \text{বিকল্প পদ্ধতি :} \\ 5x^2y + 7xy^2 \\ \times 5x^3y^3 \\ \hline 25x^5y^4 + 35x^4y^5 \end{array}$$

নির্ণেয় গুণফল $25x^5y^4 + 35x^4y^5$

উদাহরণ ৬। $2a^3 - b^3 + 3abc$ কে a^4b^2 দ্বারা গুণ করো।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & (2a^3 - b^3 + 3abc) \times a^4b^2 \\ & = (2a^3 \times a^4b^2) - (b^3 \times a^4b^2) + (3abc \times a^4b^2) \\ & = 2a^7b^2 - a^4b^5 + 3a^5b^3c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{বিকল্প পদ্ধতি : } & 2a^3 - b^3 + 3abc \\ & \times a^4b^2 \\ \hline & 2a^7b^2 - a^4b^5 + 3a^5b^3c \end{aligned}$$

$$\text{নির্ণেয় গুণফল } 2a^7b^2 - a^4b^5 + 3a^5b^3c$$

উদাহরণ ৭। $-3x^2zy^3 + 4z^3xy^2 - 5y^4x^3z^2$ কে $-6x^2y^2z$ দ্বারা গুণ কর।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & (-3x^2zy^3 + 4z^3xy^2 - 5y^4x^3z^2) \times (-6x^2y^2z) \\ & = (-3x^2zy^3) \times (-6x^2y^2z) + (4z^3xy^2) \times (-6x^2y^2z) - (5y^4x^3z^2) \times (-6x^2y^2z) \\ & = \{(-3) \times (-6) \times x^2 \times x^2 \times y^3 \times y^2 \times z \times z\} + \{4 \times (-6) \times x \times x^2 \times y^2 \times y^2 \times z^3 \times z\} \\ & \quad - \{5 \times (-6) \times x^3 \times x^2 \times y^4 \times y^2 \times z^2 \times z\} \\ & = 18x^4y^5z^2 + (-24x^3y^4z^4) - (-30x^5y^6z^3) \\ & = 18x^4y^5z^2 - 24x^3y^4z^4 + 30x^5y^6z^3 \\ \text{নির্ণেয় গুণফল } & 18x^4y^5z^2 - 24x^3y^4z^4 + 30x^5y^6z^3 \end{aligned}$$

কাজ : ১। প্রথম রাশিকে দ্বিতীয় রাশি দ্বারা গুণ কর :

(ক) $5a^2 + 8b^2, 4ab$

(খ) $3p^2q + 6pq^3 + 10p^3q^5, 8p^3q^2$

(গ) $-2c^2d + 3d^3c - 5cd^2, -7c^3d^5$

৪.৫ বহুপদী রাশিকে বহুপদী রাশি দ্বারা গুণ

- বহুপদী রাশিকে বহুপদী রাশি দ্বারা গুণ করতে হলে গুণ্যের প্রত্যেক পদকে গুণকের প্রত্যেক পদ দ্বারা আলাদা আলাদাভাবে গুণ করে সদৃশ পদগুলোকে নিচে নিচে সাজিয়ে লিখতে হয়।
- চিহ্নযুক্ত রাশির যোগের নিয়মে যোগ করতে হয়।
- বিসদৃশ পদ থাকলে সেগুলোকে পৃথকভাবে লিখতে হয় এবং গুণফলে বসাতে হয়।

উদাহরণ ৮। $3x + 2y$ কে $x + y$ দ্বারা গুণ করো।

$$\begin{array}{r} \text{সমাধান :} \\ 3x + 2y \quad \longleftarrow \text{গুণ্য} \\ x + y \quad \longleftarrow \text{গুণক} \\ \hline 3x^2 + 2xy \quad \longleftarrow x \text{ দ্বারা গুণ} \\ 3xy + 2y^2 \quad \longleftarrow y \text{ দ্বারা গুণ} \\ \hline \text{যোগ করে, } 3x^2 + 5xy + 2y^2 \quad \longleftarrow \text{গুণফল} \\ \text{নির্ণেয় গুণফল } 3x^2 + 5xy + 2y^2 \end{array}$$

ব্যাখ্যা:

	$3x$	$2y$
x	$3x^2$	$2xy$
y	$3xy$	$2y^2$

$$(3x + 2y) \times (x + y) = 3x^2 + 5xy + 2y^2$$

১০ (১)। $A = x^2 - xy + y^2$, $B = x^2 + xy + y^2$ এবং $C = x^4 + x^2y^2 + y^4$

ক) $A - B =$ কত?

খ) A ও B এর গুণফল নির্ণয় করো।

গ) দেখাও যে, $(C \div A) / B = 1$

উত্তর: ক) $A - B$

$$\begin{aligned} &= (x^2 - xy + y^2) - (x^2 + xy + y^2) \\ &= x^2 - xy + y^2 - x^2 - xy - y^2 \\ &= -2xy \quad \text{Ans.} \end{aligned}$$

খ) A ও B এর গুণফল $= A \times B$

$$\begin{aligned} &= (x^2 - xy + y^2) \times (x^2 + xy + y^2) \\ &= (x^2 + y^2 - xy)(x^2 + y^2 + xy) \\ &= (x^2 + y^2)^2 - (xy)^2 \\ &= (x^2)^2 + 2x^2y^2 + (y^2)^2 - x^2y^2 \\ &= x^4 + 2x^2y^2 + y^4 - x^2y^2 \\ &= x^4 + x^2y^2 + y^4 \quad \text{Ans.} \end{aligned}$$

গ) বামপক্ষ $(C \div A) / B$

$$\begin{aligned} &= \{(x^4 + x^2y^2 + y^4) \div (x^2 - xy + y^2)\} / (x^2 + xy + y^2) \\ &= \frac{x^4 + x^2y^2 + y^4}{x^2 - xy + y^2} \times \frac{1}{(x^2 + xy + y^2)} \\ &= \frac{(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)}{(x^2 - xy + y^2)} \times \frac{1}{(x^2 + xy + y^2)} \quad [\text{খ থেকে প্রাপ্ত}] \\ &= 1 \end{aligned}$$

অতএব, বামপক্ষ $=$ ডানপক্ষ (দেখানো হলো)

অনুশীলনী ৪.১

১ম রাশিকে ২য় রাশি দ্বারা গুণ করো (১ থেকে ২৪)।

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| ১। $3ab, 4a^3$ | ২। $5xy, 6az$ |
| ৩। $5a^2x^2, 3ax^5y$ | ৪। $8a^2b, -2b^2$ |
| ৫। $-2abx^2, 10b^3xyz$ | ৬। $-3p^2q^3, -6p^5q^4$ |
| ৭। $-12m^2a^2x^3, -2ma^2x^2$ | ৮। $7a^3bx^5y^2, -3x^5y^3a^2b^2$ |
| ৯। $2x+3y, 5xy$ | ১০। $5x^2-4xy, 9x^2y^2$ |
| ১১। $2a^2-3b^2+c^2, a^3b^2$ | ১২। x^3-y^3+3xyz, x^4y |
| ১৩। $2a-3b, 3a+2b$ | ১৪। $a+b, a-b$ |
| ১৫। x^2+1, x^2-1 | ১৬। $a^2+b^2, a+b$ |
| ১৭। $a^2-ab+b^2, a+b$ | ১৮। $x^2+2xy+y^2, x+y$ |
| ১৯। $x^2-2xy+y^2, x-y$ | ২০। $x^2+2x-3, x+3$ |
| ২১। a^2+ab+b^2, b^2-ab+a^2 | ২২। $a+b+c, a+b+c$ |
| ২৩। x^2+xy+y^2, x^2-xy+y^2 | ২৪। $y^2-y+1, 1+y+y^2$ |
- ২৫। $A = x^2 + xy + y^2$ এবং $B = x - y$ হলে, প্রমাণ করো যে, $AB = x^3 - y^3$
- ২৬। $A = a^2 - ab + b^2$ এবং $B = a + b$ হলে, $AB =$ কত?
- ২৭। দেখাও যে, $(a+1)(a-1)(a^2+1) = a^4 - 1$
- ২৮। দেখাও যে, $(x+y)(x-y)(x^2+y^2) = x^4 - y^4$

৪.৬ বীজগণিতীয় রাশির ভাগ

ভাগের সূচক বিধি

$$a^5 \div a^2 = \frac{a^5}{a^2} = \frac{a \times a \times a \times a \times a}{a \times a} = a \times a \times a \text{ [লব ও হর থেকে সাধারণ উৎপাদক বর্জন করে]।}$$

$$= a^3 = a^{5-2}, a \neq 0$$

সাধারণভাবে, $\boxed{a^m \div a^n = a^{m-n}}$, যেখানে m ও n স্বাভাবিক সংখ্যা এবং $m > n, a \neq 0$.

এই প্রক্রিয়াকে ভাগের সূচক বিধি বলা হয়।

লক্ষ করি : $a \neq 0$ হলে,

ফর্ম্যা নং-৮, গণিত-৭ম শ্রেণি, দাখিল

$$a^m \div a^m = \frac{a^m}{a^m} = a^{m-m} = a^0$$

$$\text{আবার, } a^m \div a^m = \frac{a^m}{a^m} = 1$$

$$\therefore a^0 = 1, (a \neq 0)$$

অনুসিদ্ধান্ত : $a^0 = 1, a \neq 0$

৪.৭ চিহ্নযুক্ত রাশির ভাগ

আমরা জানি, $a \times (-b) = (-a) \times b = -ab$

সুতরাং, $-ab \div a = -b$

একইভাবে, $-ab \div b = -a$

$$-ab \div (-a) = b$$

$$-ab \div (-b) = a$$

$$\begin{aligned} -\frac{ab}{a} &= \frac{a \times (-b)}{a} = -b \\ -\frac{ab}{b} &= \frac{(-a) \times b}{b} = -a \\ -\frac{ab}{b} &= \frac{(-a) \times b}{b} = b \\ -\frac{ab}{-a} &= \frac{-a}{-a} = a \\ -\frac{ab}{-b} &= \frac{a \times (-b)}{-b} = a \end{aligned}$$

লক্ষ করি :

- একই চিহ্নযুক্ত দুটি রাশির ভাগফল (+) চিহ্নযুক্ত হবে।
- বিপরীত চিহ্নযুক্ত দুটি রাশির ভাগফল (-) চিহ্নযুক্ত হবে।

$\frac{+ 1}{+ 1}$	$=$	$+ 1$
$\frac{- 1}{- 1}$	$=$	$+ 1$
$\frac{- 1}{+ 1}$	$=$	$- 1$
$\frac{+ 1}{- 1}$	$=$	$- 1$

৪.৮ একপদী রাশিকে একপদী রাশি দ্বারা ভাগ

একপদী রাশিকে একপদী রাশি দ্বারা ভাগ করতে হলে, সাংখ্যিক সহগকে পাটিগণিতীয় নিয়মে ভাগ এবং বীজগণিতীয় প্রতীককে সূচক নিয়মে ভাগ করতে হয়।

উদাহরণ ১১। $10a^5b^7$ কে $5a^2b^3$ দ্বারা ভাগ করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } \frac{10a^5b^7}{5a^2b^3} &= \frac{10}{5} \times \frac{a^5}{a^2} \times \frac{b^7}{b^3} \\ &= 2 \times a^{5-2} \times b^{7-3} = 2a^3b^4\end{aligned}$$

নির্ণেয় ভাগফল $2a^3b^4$

উদাহরণ ১২। $40x^8y^{10}z^5$ কে $-8x^4y^2z^4$ দ্বারা ভাগ করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } \frac{40x^8y^{10}z^5}{-8x^4y^2z^4} &= \frac{40}{-8} \times \frac{x^8}{x^4} \times \frac{y^{10}}{y^2} \times \frac{z^5}{z^4} \\ &= -5 \times x^{8-4} \times y^{10-2} \times z^{5-4} = -5x^4y^8z\end{aligned}$$

নির্ণেয় ভাগফল $-5x^4y^8z$

উদাহরণ ১৩। $-45x^{13}y^9z^4$ কে $-5x^6y^3z^2$ দ্বারা ভাগ করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } \frac{-45x^{13}y^9z^4}{-5x^6y^3z^2} &= \frac{-45}{-5} \times \frac{x^{13}}{x^6} \times \frac{y^9}{y^3} \times \frac{z^4}{z^2} \\ &= 9 \times x^{13-6} \times y^{9-3} \times z^{4-2} = 9x^7y^6z^2\end{aligned}$$

নির্ণেয় ভাগফল $9x^7y^6z^2$

কাজ : প্রথম রাশিকে দ্বিতীয় রাশি দ্বারা ভাগ করো।

(ক) $12a^3b^5c$, $3ab^2$

(খ) $-28p^3q^2r^5$, $7p^2qr^3$

(গ) $35x^5y^7$, $-5x^5y^2$

(ঘ) $-40x^{10}y^5z^9$, $-8x^6y^2z^5$

৪.৯ বহুপদী রাশিকে একপদী রাশি দ্বারা ভাগ

আমরা জানি, $a+b+c$ একটি বহুপদী রাশি।

$$\begin{aligned}
& \text{এখন } (a+b+c) \div d \\
&= (a+b+c) \times \frac{1}{d} \\
&= a \times \frac{1}{d} + b \times \frac{1}{d} + c \times \frac{1}{d} \quad [\text{গুণের বন্টনবিধি}] \\
&= \frac{a}{d} + \frac{b}{d} + \frac{c}{d} \\
& \text{আবার, } (a+b+c) \div d \\
&= \frac{a+b+c}{d} = \frac{a}{d} + \frac{b}{d} + \frac{c}{d}
\end{aligned}$$

উদাহরণ ১৪। $10x^5y^3 - 12x^3y^8 + 6x^4y^7$ কে $2x^2y^2$ দ্বারা ভাগ কর।

$$\begin{aligned}
\text{সমাধান : } & \frac{10x^5y^3 - 12x^3y^8 + 6x^4y^7}{2x^2y^2} \\
&= \frac{10x^5y^3}{2x^2y^2} - \frac{12x^3y^8}{2x^2y^2} + \frac{6x^4y^7}{2x^2y^2} \\
&= 5x^{5-2}y^{3-2} - 6x^{3-2}y^{8-2} + 3x^{4-2}y^{7-2} \\
&= 5x^3y - 6xy^6 + 3x^2y^5
\end{aligned}$$

নির্ণেয় ভাগফল $5x^3y - 6xy^6 + 3x^2y^5$

উদাহরণ ১৫। $35a^5b^4c + 20a^6b^8c^3 - 40a^5b^6c^4$ কে $5a^2b^3c$ দ্বারা ভাগ কর।

$$\begin{aligned}
\text{সমাধান : } & \frac{35a^5b^4c + 20a^6b^8c^3 - 40a^5b^6c^4}{5a^2b^3c} \\
&= \frac{35a^5b^4c}{5a^2b^3c} + \frac{20a^6b^8c^3}{5a^2b^3c} - \frac{40a^5b^6c^4}{5a^2b^3c} \\
&= 7a^{5-2}b^{4-3}c^{1-1} + 4a^{6-2}b^{8-3}c^{3-1} - 8a^{5-2}b^{6-3}c^{4-1} \\
&= 7a^3b + 4a^4b^5c^2 - 8a^3b^3c^3 \quad [∵ c^{1-1} = c^0 = 1]
\end{aligned}$$

নির্ণেয় ভাগফল $7a^3b + 4a^4b^5c^2 - 8a^3b^3c^3$

কাজ : ১। $9x^4y^5 + 12x^8y^5 + 21x^9y^6$ কে $3x^3y^2$ দ্বারা ভাগ কর।

২। $28a^5b^6 - 16a^6b^8 - 20a^7b^5$ কে $4a^4b^3$ দ্বারা ভাগ কর।

৪.১০ বহুপদী রাশিকে বহুপদী রাশি দ্বারা ভাগ

বহুপদী রাশিকে বহুপদী রাশি দ্বারা ভাগ করার ক্ষেত্রে প্রথমে ভাজ্য ও ভাজক উভয়ের মধ্যে আছে এমন একটি বীজগণিতীয় প্রতীকের ঘাতের অধঃক্রম অনুসারে রাশিদ্বয়কে সাজাতে হবে। যেমন $x^2+2x^4+110-48x$ একটি বহুপদী। একে x এর মানের অধঃক্রম অনুসারে সাজালে আমরা পাই : $2x^4+ x^2-48x+110$ । এরপর পাটিগণিতের ভাগ প্রক্রিয়ার মতো নিচের নিয়মে ধাপে ধাপে ভাগ করতে হবে।

- ভাজ্যের প্রথম পদটিকে ভাজকের প্রথম পদ দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল হয় তা নির্ণেয় ভাগফলের প্রথম পদ।
- ভাগফলের ঐ প্রথম পদ দ্বারা ভাজকের প্রত্যেক পদকে গুণ করে গুণফল সদৃশ পদ অনুযায়ী ভাজ্যের নিচে বসিয়ে ভাজ্য থেকে বিয়োগ করতে হয়।
- বিয়োগফল নতুন ভাজ্য হবে। বিয়োগফল এমনভাবে লিখতে হবে যেন তা আগের মতো বিবেচ্য প্রতীকের অধঃক্রম অনুসারে থাকে।
- নতুন ভাজ্যের প্রথম পদটিকে ভাজকের প্রথম পদ দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল হয় তা নির্ণেয় ভাগফলের দ্বিতীয় পদ।
- এভাবে ক্রমান্বয়ে ভাগ করতে হয়।

উদাহরণ ১৬। $6x^2 + x - 2$ কে $2x - 1$ দ্বারা ভাগ করো।

সমাধান : এখানে ভাজ্য ও ভাজক উভয়েই x এর ঘাতের অধঃক্রম অনুসারে সাজানো আছে।

$$\begin{array}{r}
 2x - 1 \) \ 6x^2 + x - 2 \ (3x + 2 \\
 \underline{6x^2 - 3x} \\
 (-) \ (+) \\
 4x - 2 \\
 \underline{4x - 2} \\
 (-) \ (+) \\
 0
 \end{array}$$

এখানে, $6x^2 \div 2x = 3x$

এই $3x$ দ্বারা ভাজক $2x-1$ কে গুণ করে গুণফল ভাজ্যের সদৃশ পদের নিচে লিখে বিয়োগ করা হল :

নতুন ভাজ্য $4x-2$ এর ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করা হল

নির্ণেয় ভাগফল $3x + 2$

উদাহরণ ১৭। $2x^2 - 7xy + 6y^2$ কে $x - 2y$ দ্বারা ভাগ করো।

সমাধান : এখানে রাশি দুইটি x এর ঘাতের অধঃক্রম অনুসারে সাজানো আছে।

$$\begin{array}{r}
 x - 2y \) \ 2x^2 - 7xy + 6y^2 \ (2x - 3y \\
 \underline{2x^2 - 4xy} \\
 (-) \ (+) \\
 -3xy + 6y^2 \\
 \underline{-3xy + 6y^2} \\
 (+) \ (-) \\
 0
 \end{array}$$

$2x^2 \div x = 2x$

$-3xy \div x = -3y$

নির্ণেয় ভাগফল $2x - 3y$

উদাহরণ ১৮। $16x^4 + 36x^2 + 81$ কে $4x^2 - 6x + 9$ দ্বারা ভাগ করো।

সমাধান : এখানে রাশি দুটি x এর ঘাতের অধঃক্রম অনুসারে সাজানো আছে।

$$\begin{array}{r}
 4x^2 - 6x + 9 \overline{) 16x^4 + 36x^2 + 81} \\
 \underline{16x^4 + 36x^2 - 24x^3} \\
 (-) \quad (-) \quad (+) \\
 24x^3 + 81 \\
 \underline{24x^3 - 36x^2 + 54x} \\
 (-) \quad (+) \quad (-) \\
 36x^2 - 54x + 81 \\
 \underline{36x^2 - 54x + 81} \\
 (-) \quad (+) \quad (-) \\
 0
 \end{array}$$

$$1\text{ম ধাপ : } 16x^4 \div 4x^2 = 4x^2$$

$$2\text{য় ধাপ : } 24x^3 \div 4x^2 = 6x$$

$$3\text{য় ধাপ : } 36x^2 \div 4x^2 = 9$$

নির্ণেয় ভাগফল $4x^2 + 6x + 9$

মন্তব্য : ২য় ধাপে নতুন ভাজ্যকেও x এর ঘাতের অধঃক্রম অনুসারে সাজিয়ে লেখা হয়েছে।

উদাহরণ ১৯। $2x^4 + 110 - 48x$ কে $4x + 11 + x^2$ দ্বারা ভাগ করো।

সমাধান : ভাজ্য ও ভাজক উভয়কে x এর ঘাতের অধঃক্রম অনুসারে সাজিয়ে পাই,

$$\text{ভাজ্য} = 2x^4 + 110 - 48x = 2x^4 - 48x + 110$$

$$\text{ভাজক} = 4x + 11 + x^2 = x^2 + 4x + 11$$

এখন, $(x^2 + 4x + 11) \overline{) 2x^4 - 48x + 110}$

$$\begin{array}{r}
 \underline{2x^4 + 8x^3 + 22x^2} \\
 -8x^3 - 22x^2 - 48x + 110 \\
 \underline{-8x^3 - 32x^2 - 88x} \\
 10x^2 + 40x + 110 \\
 \underline{10x^2 + 40x + 110} \\
 0
 \end{array}$$

নির্ণেয় ভাগফল $2x^2 - 8x + 10$

উদাহরণ ২০। $x^4 - 1$ কে $x^2 + 1$ দ্বারা ভাগ করো।

সমাধান : এখানে রাশি দুটি x এর ঘাতের অধঃক্রম অনুসারে সাজানো আছে।

$$\begin{array}{r} x^2 + 1 \) \ x^4 - 1 \ (\ x^2 - 1 \\ \underline{x^4 + x^2} \\ -x^2 - 1 \\ \underline{-x^2 - 1} \\ 0 \end{array}$$

নির্ণেয় ভাগফল $x^2 - 1$

কাজ : ১। $2m^2 - 5mn + 2n^2$ কে $2m - n$ দ্বারা ভাগ করো।

২। $a^4 + a^2b^2 + b^4$ কে $a^2 - ab + b^2$ দ্বারা ভাগ করো।

৩। $81p^4 + q^4 - 22p^2q^2$ কে $9p^2 + 2pq - q^2$ দ্বারা ভাগ করো।

অনুশীলনী ৪.২

প্রথম রাশিকে দ্বিতীয় রাশি দ্বারা ভাগ করো :

- | | |
|--|--|
| ১। $45a^4, 9a^2$ | ২। $-24a^5, 3a^2$ |
| ৩। $30a^4x^3, -6a^2x$ | ৪। $-28x^4y^3z^2, 4xyz^2$ |
| ৫। $-36a^3z^3y^2, -4ayz$ | ৬। $-22x^3y^2z, -2xyz$ |
| ৭। $3a^3b^2 - 2a^2b^3, a^2b^2$ | ৮। $36x^4y^3 + 9x^5y^2, 9xy$ |
| ৯। $a^3b^4 - 3a^7b^7, -a^3b^3$ | ১০। $6a^5b^3 - 9a^3b^4, 3a^2b^2$ |
| ১১। $15x^3y^3 + 12x^3y^2 - 12x^5y^3, 3x^2y^2$ | ১২। $6x^8y^6z - 4x^4y^3z^2 + 2x^2y^2z^2, 2x^2y^2z$ |
| ১৩। $24a^2b^2c - 15a^4b^4c^4 - 9a^2b^6c^2, -3ab^2$ | ১৪। $a^3b^2 + 2a^2b^3, a + 2b$ |
| ১৫। $6x^2 + x - 2, 2x - 1$ | ১৬। $6y^2 + 3x^2 - 11xy, 3x - 2y$ |
| ১৭। $x^3 + y^3, x + y$ | ১৮। $a^2 + 4axyz + 4x^2y^2z^2, a + 2xyz$ |
| ১৯। $16p^4 - 81q^4, 2p + 3q$ | ২০। $64 - a^3, a - 4$ |
| ২১। $x^2 - 8xy + 16y^2, x - 4y$ | ২২। $x^4 + 8x^2 + 15, x^2 + 5$ |
| ২৩। $x^4 + x^2 + 1, x^2 - x + 1$ | ২৪। $4a^4 + b^4 - 5a^2b^2, 4a^2 - b^2$ |
| ২৫। $2a^2b^2 + 5abd + 3d^2, ab + d$ | ২৬। $x^4y^4 - 1, x^2y^2 + 1$ |
| ২৭। $1 - x^6, 1 - x + x^2$ | ২৮। $x^2 - 8abx + 15a^2b^2, x - 3ab$ |
| ২৯। $x^3y - 2x^2y^2 + axy, x^2 - 2xy + a$ | ৩০। $a^2bc + b^2ca + c^2ab, a + b + c$ |
| ৩১। $a^2x - 4ax + 3ax^2, a + 3x - 4$ | ৩২। $81x^4 + y^4 - 22x^2y^2, 9x^2 + 2xy - y^2$ |
| ৩৩। $12a^4 + 11a^2 + 2, 3a^2 + 2$ | ৩৪। $x^4 + x^2y^2 + y^4, x^2 - xy + y^2$ |
| ৩৫। $a^5 + 11a - 12, a^2 - 2a + 3$ | |

৪.১১ বন্ধনীর ব্যবহার


একটি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি তাদের স্কুলের 10 জন গরীব শিক্ষার্থীর জন্য দুঃস্থ কল্যাণ তহবিল থেকে a টাকা বরাদ্দ করল। সেই টাকা থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিটি b টাকা মূল্যের 2 টি করে খাতা ও প্রতিটি c টাকা মূল্যের 1 টি করে কলম বিতরণ করা হলো। এতে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হলো। এই টাকার সাথে আরও d টাকা যোগ করে তা 2 জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হলো। উপরে বর্ণিত তথ্যগুলোকে বীজগণিতীয় রাশির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি :

$$[\{a - (2b + c) \times 10\} + d] \div 2$$

এখানে, ১ম বন্ধনী (), ২য় বন্ধনী { }, ৩য় বন্ধনী [] ব্যবহার করা হয়েছে। বন্ধনী স্থাপনের নিয়ম হচ্ছে [{ () }]। এ ছাড়াও রাশিটিতে প্রক্রিয়া চিহ্ন +, -, \times ও \div ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ রাশির সরলীকরণে 'BEDMAS' (B for Bracket, E for Exponent, D for Division, M for Multiplication, A for Addition, S for Subtraction) অনুসরণ করা হয়। আবার, বন্ধনীর ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় বন্ধনীর কাজ করতে হয়।

বন্ধনী অপসারণ :


লক্ষ করি : $b > c$



চিত্রে দেখা যায়, $a + (b - c) = a + b - c$

বন্ধনীর আগে '+' চিহ্ন থাকলে, বন্ধনী অপসারণে বন্ধনীর ভিতরের পদগুলোর চিহ্নের পরিবর্তন হয় না।

আবার, লক্ষ করি : $b > c$, $a > b - c$




চিত্রে দেখা যায়, $a - (b - c) = a - b + c$

লক্ষ করি : $a - (b - c) + (b - c) = a$

আবার, $a - b + c + (b - c) = a$

সুতরাং, $a - (b - c) = a - b + c$



$[-(b - c)$ এর যোগাত্মক বিপরীত $(b - c)$]

বন্ধনীর আগে '-' চিহ্ন থাকলে, বন্ধনী অপসারণে বন্ধনীর ভিতরের পদগুলোর চিহ্নের পরিবর্তন হয়ে বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয়।

কাজ : নিচের রাশিগুলোর বন্ধনী অপসারণ করো।	
বন্ধনীয়ুক্ত রাশি	বন্ধনীয়ুক্ত রাশি
$8 + (6 - 2)$	
$8 - (6 - 2)$	$8 - 6 + 2$
$p + q + (r - s)$	
$p + q - (r - s)$	

কাজ : নিচের রাশিগুলোর মান অপরিবর্তিত রেখে বন্ধনী স্থাপন করো।			
রাশি	বন্ধনীর আগের চিহ্ন	বন্ধনীর অবস্থান	বন্ধনীয়ুক্ত রাশি
$7 + 5 - 2$	+	২য় ও ৩য় পদ ১ম বন্ধনীভুক্ত অর্থাৎ, $(5 - 2)$	$7 + (5 - 2)$
$7 - 5 + 2$	-	২য় ও ৩য় পদ ১ম বন্ধনীভুক্ত অর্থাৎ $(-5 + 2)$	$7 - (5 - 2)$
$a - b + c - d$	+	৩য় ও ৪র্থ পদ ১ম বন্ধনীভুক্ত	
$a - b - c - d$	-	" "	

উদাহরণ ২১। সরল কর : $6 - 2\{5 - (8 - 3) + (5 + 2)\}$

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & 6 - 2\{5 - (8 - 3) + (5 + 2)\} \\ & = 6 - 2\{5 - 5 + 7\} \\ & = 6 - 2\{+7\} \\ & = 6 - 14 \\ & = -8 \end{aligned}$$

উদাহরণ ২২। সরল কর : $a + \{b - (c - d)\}$

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & a + \{b - (c - d)\} \\ & = a + \{b - c + d\} \\ & = a + b - c + d \end{aligned}$$

উদাহরণ ২৩। সরল কর : $a - [b - \{c - (d - e)\} - f]$

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & a - [b - \{c - (d - e)\} - f] \\ & = a - [b - \{c - d + e\} - f] \\ & = a - [b - c + d - e - f] \\ & = a - b + c - d + e + f \end{aligned}$$

ফর্মা নং-৯, গণিত-৭ম শ্রেণি, দাখিল

উদাহরণ ২৪। সরল করো: $3x - [5y - \{10z - (5x - 10y + 3z)\}]$

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & 3x - [5y - \{10z - (5x - 10y + 3z)\}] \\ & = 3x - [5y - \{10z - 5x + 10y - 3z\}] = 3x - [5y - \{7z - 5x + 10y\}] \\ & = 3x - [5y - 7z + 5x - 10y] = 3x - [5x - 5y - 7z] = 3x - 5x + 5y + 7z \\ & = -2x + 5y + 7z = 5y - 2x + 7z \end{aligned}$$

উদাহরণ ২৫। $3x - 4y - 8z + 5$ এর তৃতীয় ও চতুর্থ পদ বন্ধনীর আগে $(-)$ চিহ্ন দিয়ে প্রথম বন্ধনীভুক্ত কর। পরবর্তীতে দ্বিতীয় পদ ও প্রথম বন্ধনীভুক্ত রাশিকে দ্বিতীয় বন্ধনীভুক্ত কর যেন বন্ধনীর আগে $(-)$ চিহ্ন থাকে।

সমাধান : $3x - 4y - 8z + 5$ রাশিটির তৃতীয় ও চতুর্থ পদ যথাক্রমে $8z$ ও 5 প্রশ্নানুসারে, $3x - 4y - (8z - 5)$
আবার, $3x - \{4y + (8z - 5)\}$

কাজ : সরল কর :

$$\begin{aligned} ১। & x - \{2x - (3y - 4x + 2y)\} \\ ২। & 8x + y - [7x - \{5x - (4x - 3x - y) + 2y\}] \end{aligned}$$

অনুশীলনী ৪.৩

- ১। $3a^2b$ এবং $-4ab^2$ এর গুণফল নিচের কোনটি?
(ক) $-12a^2b^2$ (খ) $-12a^3b^2$ (গ) $-12a^2b^3$ (ঘ) $-12a^3b^3$
- ২। $20a^6b^3$ কে $4a^3b$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল নিচের কোনটি?
(ক) $5a^3b$ (খ) $5a^6b^2$ (গ) $5a^3b^2$ (ঘ) $5a^3b^3$
- ৩। $\frac{-25x^3y}{5xy^3} =$ কত?
(ক) $-5x^2y^2$ (খ) $-5x^3y^2$ (গ) $\frac{-5x^2}{y^3}$ (ঘ) $\frac{-5x^2}{y^2}$
- ৪। $a = 3$, $b = 2$ হলে, $(8a - 2b) + (-7a + 4b)$ এর মান কত?
(ক) 3 (খ) 4 (গ) 7 (ঘ) 15
- ৫। $10x^6y^5z^4$ কে $-5x^2y^2z^2$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল কত হবে?
(ক) $-2x^4y^2z^3$ (খ) $-2x^4y^3z^2$ (গ) $-2x^3y^3z^3$ (ঘ) $-2x^4y^3z^3$
- ৬। $x = 3$, $y = 2$ হলে $(m^x)^y$ এর মান কত?
(ক) m^2 (খ) m^3 (গ) m^5 (ঘ) m^6

- ৭। $a \neq 0$ হলে, a^0 এর মান কত?
 (ক) 0 (খ) a (গ) 1 (ঘ) $\frac{1}{a}$
- ৮। $x^7 \div x^{-2} =$ কত?
 (ক) x^9 (খ) x^5 (গ) x^{-5} (ঘ) x^{-9}
- ৯। $a^5 \times (-a^3) \times a^{-5} =$ কত?
 (ক) a^{13} (খ) a^8 (গ) a^3 (ঘ) $-a^3$
- ১০। $[2 - \{(1+1) - 2\}]$ এর সরলফল কত?
 (ক) -4 (খ) 2 (গ) 4 (ঘ) 0

সরল করো (১১ থেকে ২৪) :

- ১১। $7 + 2[-8 - \{-3 - (-2 - 3)\} - 4]$
- ১২। $-5 - [-8 - \{-4 - (-2 - 3)\} + 13]$
- ১৩। $7 - 2[-6 + 3\{-5 + 2(4 - 3)\}]$
- ১৪। $x - \{a + (y - b)\}$
- ১৫। $3x + (4y - z) - \{a - b - (2c - 4a) - 5a\}$
- ১৬। $-a + [-5b - \{-9c + (-3a - 7b + 11c)\}]$
- ১৭। $-a - [-3b - \{-2a - (-a - 4b)\}]$
- ১৮। $\{2a - (3b - 5c)\} - [a - \{2b - (c - 4a)\} - 7c]$
- ১৯। $-a + [-6b - \{-15c + (-3a - 9b - 13c)\}]$
- ২০। $-2x - [-4y - \{-6z - (8x - 10y + 12z)\}]$ ২১। $4x + [-5y - \{9z + (3x - 7y + x)\}]$
- ২২। $20 - [\{(6a + 3b) - (5a - 2b)\} + 6]$ ২৩। $15a + 2[3b + 3\{2a - 2(2a + b)\}]$
- ২৪। $[8b - 3\{2a - 3(2b + 5) - 5(b - 3)\}] - 3b$
- ২৫। বন্ধনীর পূর্বে (-) চিহ্ন দিয়ে $a - b + c - d$ এর ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পদ প্রথম বন্ধনীর ভিতর স্থাপন করো।
- ২৬। $7x - 5y + 8z - 9$ এর তৃতীয় ও চতুর্থ পদ বন্ধনীর আগে (-) চিহ্ন দিয়ে প্রথম বন্ধনীভুক্ত করো।
 পরে দ্বিতীয় পদ ও প্রথম বন্ধনীভুক্ত রাশিকে দ্বিতীয় বন্ধনীভুক্ত কর যেন বন্ধনীর আগে (+) চিহ্ন থাকে।
- ২৭। $15x^2 + 7x - 2$ এবং $5x - 1$ দুটি বীজগণিতীয় রাশি।
 ক. প্রথম রাশি থেকে দ্বিতীয় রাশি বিয়োগ করো।
 খ. রাশিদ্বয়ের গুণফল নির্ণয় করো।
 গ. প্রথম রাশিকে দ্বিতীয় রাশি দ্বারা ভাগ করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। $x = -1$ হলে, $x^3 + 2x^2 - 1$ এর মান নিচের কোনটি?

- (ক) -4 (খ) -2 (গ) 0 (ঘ) 2

২। $4x^4 - 6x^3 + 3x + 14$ রাশির –

- i. চলক x ii. পদ সংখ্যা 4 iii. x^3 –এর সহগ 6

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দুটি বীজগণিতীয় রাশি $x + y$ এবং $x - \{x - (x - y)\}$

৩। দ্বিতীয় রাশির মান নিচের কোনটি?

- (ক) $x + y$ (খ) $-x - y$ (গ) $x - y$ (ঘ) $x^2 - y^2$

৪। রাশি দুটির গুণফল নিচের কোনটি?

- (ক) $x^2 + y^2$ (খ) $(x + y)^2$ (গ) $x - y$ (ঘ) $x^2 - y^2$

সৃজনশীল প্রশ্ন

৫। $A = x^2 - xy + y^2$, $B = x^2 + xy + y^2$ এবং $C = x^4 + x^2y^2 + y^4$

ক) $x^4 - 1$ কে $x^2 - 1$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল কত হবে তা নির্ণয় করো।

খ) A ও B এর গুণফল নির্ণয় করো।

গ) $BC \div B^2 - A$ নির্ণয় করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৬। (ক) $\{-7x - (-3x - 6) + 4\}$ -এর সরলমান নির্ণয় করো।

(খ) $(x^2y - xy^2)$ -কে xy দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল কত হবে তা নির্ণয় করো।

(গ) $\frac{4x^3y \times (-5x^2y^7)}{x^4y^6}$ –এর সরলমান নির্ণয় করো।

(ঘ) $5x - 2y - z - 1$ রাশির তৃতীয় ও চতুর্থ পদকে বন্ধনীর আগে $(-)$ চিহ্ন দিয়ে প্রথম বন্ধনীভুক্ত করে দ্বিতীয় পদ ও প্রথম বন্ধনীভুক্ত রাশিকে বন্ধনীর আগে $(+)$ দিয়ে দ্বিতীয় বন্ধনীভুক্ত করো।

বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ

বীজগণিতীয় প্রতীক দ্বারা প্রকাশিত যেকোনো সাধারণ নিয়ম বা সিদ্ধান্তকে বীজগণিতীয় সূত্র বা সংক্ষেপে সূত্র বলা হয়। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সূত্র ব্যবহার করে থাকি। এ অধ্যায়ে প্রথম চারটি সূত্র এবং এ চারটি সূত্রের সাহায্যে অনুসিদ্ধান্ত নির্ণয়ের পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া বীজগণিতীয় সূত্র ও অনুসিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে বীজগণিতীয় রাশির মান নির্ণয় ও উৎপাদকে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার বীজগণিতীয় রাশির সাহায্যে ভাজ্য, ভাজক, গুণনীয়ক, গুণিতক সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে এবং কীভাবে অনূর্ধ্ব তিনটি বীজগণিতীয় রাশির গ.সা.গু. ও ল.সা.গু. নির্ণয় করা যায় তা আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা –

- বর্গ নির্ণয়ে বীজগণিতীয় সূত্রের বর্ণনা ও প্রয়োগ করতে পারবে;
- বীজগণিতীয় সূত্র ও অনুসিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে রাশির মান নির্ণয় করতে পারবে;
- বীজগণিতীয় সূত্র প্রয়োগ করে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- গুণনীয়ক ও গুণিতক কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- অনূর্ধ্ব তিনটি বীজগণিতীয় রাশির সাংখ্যিক সহগসহ গ.সা.গু. ও ল.সা.গু. নির্ণয় করতে পারবে।

৫.১ বীজগণিতীয় সূত্রাবলি

সূত্র ১। $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

প্রমাণ : $(a + b)^2$ এর অর্থ $(a + b)$ কে $(a + b)$ দ্বারা গুণ।

$$\begin{aligned}\therefore (a + b)^2 &= (a + b)(a + b) \\ &= a(a + b) + b(a + b) \quad [\text{বহুপদী রাশিকে বহুপদী রাশি দ্বারা গুণ}] \\ &= a^2 + ab + ba + b^2 \\ &= a^2 + ab + ab + b^2 \\ \therefore (a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2\end{aligned}$$

দুটি রাশির যোগফলের বর্গ = ১ম রাশির বর্গ + ২ × ১ম রাশি × ২য় রাশি + ২য় রাশির বর্গ


সূত্রটির জ্যামিতিক ব্যাখ্যা

$ABCD$ একটি বর্গক্ষেত্র যার

AB বাহু = $a + b$

BC বাহু = $a + b$

$$\begin{aligned} \therefore ABCD \text{ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} &= (\text{বাহুর দৈর্ঘ্য})^2 \\ &= (a + b)^2 \end{aligned}$$



বর্গক্ষেত্রটিকে P, Q, R, S চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

এখানে P ও S বর্গক্ষেত্র এবং Q ও R আয়তক্ষেত্র।

আমরা জানি, বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (দৈর্ঘ্য)^২ এবং আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য \times প্রস্থ

অতএব, P এর ক্ষেত্রফল = $a \times a = a^2$

Q এর ক্ষেত্রফল = $a \times b = ab$

R এর ক্ষেত্রফল = $a \times b = ab$

S এর ক্ষেত্রফল = $b \times b = b^2$

এখন, $ABCD$ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $(P + Q + R + S)$ এর ক্ষেত্রফল

$$\therefore (a + b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2$$

$$= a^2 + 2ab + b^2$$

$$\therefore (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

অনুসিদ্ধান্ত ১। $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$

আমরা জানি, $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$$\text{বা, } (a + b)^2 - 2ab = a^2 + 2ab + b^2 - 2ab$$

[উভয়পক্ষ থেকে $2ab$ বিয়োগ করে]

$$\text{বা, } (a + b)^2 - 2ab = a^2 + b^2$$

$$\therefore a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$$

উদাহরণ ১। $(m + n)$ এর বর্গ নির্ণয় কর।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } (m+n) \text{ এর বর্গ} &= (m + n)^2 \\ &= (m)^2 + 2 \times m \times n + (n)^2 \\ &= m^2 + 2mn + n^2 \end{aligned}$$

উদাহরণ ২। $(3x + 4)$ এর বর্গ নির্ণয় কর।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } (3x+4) \text{ এর বর্গ} &= (3x + 4)^2 \\ &= (3x)^2 + 2 \times 3x \times 4 + (4)^2 \\ &= 9x^2 + 24x + 16 \end{aligned}$$

উদাহরণ ৩। $(2x + 3y)$ এর বর্গ নির্ণয় করো।

সমাধান : $(2x + 3y)$ এর বর্গ $= (2x + 3y)^2$
 $= (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3y + (3y)^2$
 $= 4x^2 + 12xy + 9y^2$

উদাহরণ ৪। বর্গের সূত্র প্রয়োগ করে 105 এর বর্গ নির্ণয় করো।

সমাধান : $(105)^2 = (100 + 5)^2$
 $= (100)^2 + 2 \times 100 \times 5 + (5)^2$
 $= 10000 + 1000 + 25$
 $= 11025$

কাজ : সূত্রের সাহায্যে রাশিগুলোর বর্গ নির্ণয় করো।

১। $x + 2y$ ২। $3a + 5b$ ৩। $5 + 2a$ ৪। 15 ৫। 103

সূত্র ২। $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

প্রমাণ : $(a - b)^2$ এর অর্থ $(a - b)$ কে $(a - b)$ দ্বারা গুণ।

$$\begin{aligned} \therefore (a - b)^2 &= (a - b)(a - b) \\ &= a(a - b) - b(a - b) \\ &= a^2 - ab - ba + b^2 \\ &= a^2 - ab - ab + b^2 \end{aligned}$$

$$\therefore (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

দুটি রাশির বিয়োগফলের বর্গ = ১ম রাশির বর্গ - ২ × ১ম রাশি × ২য় রাশি + ২য় রাশির বর্গ

লক্ষ করি : দ্বিতীয় সূত্রটি প্রথম সূত্রের সাহায্যেও নির্ণয় করা যায়।

আমরা জানি, $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

এখন $(a - b)^2 = \{(a + (-b))\}^2 = a^2 + 2 \times a \times (-b) + (-b)^2$ [b এর পরিবর্তে $-b$ বসিয়ে]
 $= a^2 - 2ab + b^2$

অনুসিদ্ধান্ত ২। $a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$

আমরা জানি, $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

বা, $(a - b)^2 + 2ab = a^2 - 2ab + b^2 + 2ab$

[উভয়পক্ষে $2ab$ যোগ করে]

বা, $(a - b)^2 + 2ab = a^2 + b^2$

$\therefore a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$

উদাহরণ ৫। $(p - q)$ এর বর্গ নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } (p+q) \text{ এর বর্গ} &= (p - q)^2 \\ &= (p)^2 - 2 \times p \times q + (q)^2 \\ &= p^2 - 2pq + q^2\end{aligned}$$

উদাহরণ ৬। $(5x - 3y)$ এর বর্গ নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } (5x+3y) \text{ এর বর্গ} &= (5x - 3y)^2 \\ &= (5x)^2 - 2 \times 5x \times 3y + (3y)^2 \\ &= 25x^2 - 30xy + 9y^2\end{aligned}$$

উদাহরণ ৭। বর্গের সূত্র প্রয়োগ করে 98 এর বর্গ নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } (98)^2 &= (100 - 2)^2 \\ &= (100)^2 - 2 \times 100 \times 2 + (2)^2 \\ &= 10000 - 400 + 4 \\ &= 9604\end{aligned}$$

কাজ : সূত্রের সাহায্যে রাশিগুলোর বর্গ নির্ণয় করো।

১। $5x - 3$	২। $ax - by$	৩। $5x - 6$	৪। 95
-------------	--------------	-------------	---------

প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের আরও কয়েকটি অনুসিদ্ধান্ত :

$$\begin{aligned}\text{অনুসিদ্ধান্ত ৩। } (a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &= a^2 + b^2 - 2ab + 4ab && [\because +2ab = -2ab + 4ab] \\ &= a^2 - 2ab + b^2 + 4ab \\ &= (a - b)^2 + 4ab\end{aligned}$$

$$\therefore (a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$$

$$\begin{aligned}\text{অনুসিদ্ধান্ত ৪। } (a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ &= a^2 + b^2 + 2ab - 4ab && [\because -2ab = +2ab - 4ab] \\ &= a^2 + 2ab + b^2 - 4ab \\ &= (a + b)^2 - 4ab\end{aligned}$$

$$\therefore (a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$$

$$\begin{aligned}\text{অনুসিদ্ধান্ত ৫। } (a + b)^2 + (a - b)^2 &= (a^2 + 2ab + b^2) + (a^2 - 2ab + b^2) \\ &= a^2 + 2ab + b^2 + a^2 - 2ab + b^2 \\ &= 2a^2 + 2b^2 \\ &= 2(a^2 + b^2)\end{aligned}$$

$$\therefore (a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$$

$$\begin{aligned}\text{অনুসিদ্ধান্ত ৬। } (a + b)^2 - (a - b)^2 &= (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) \\ &= a^2 + 2ab + b^2 - a^2 + 2ab - b^2 \\ &= 4ab\end{aligned}$$

$$\therefore (a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$$

উদাহরণ ৮। $a + b = 7$ এবং $ab = 9$

হলে, $a^2 + b^2$ এর মান নির্ণয় করো।

সমাধান :

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, } a^2 + b^2 &= (a + b)^2 - 2ab \\ &= (7)^2 - 2 \times 9 \\ &= 49 - 18 \\ &= 31 \end{aligned}$$

উদাহরণ ৯। $a + b = 5$ এবং $ab = 6$

হলে, $(a - b)^2$ এর মান নির্ণয় করো।

সমাধান :

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, } (a - b)^2 &= (a + b)^2 - 4ab \\ &= (5)^2 - 4 \times 6 \\ &= 25 - 24 \\ &= 1 \end{aligned}$$

উদাহরণ ১০। $p - \frac{1}{p} = 8$ হলে, প্রমাণ করো যে, $p^2 + \frac{1}{p^2} = 66$

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } p^2 + \frac{1}{p^2} &= \left(p - \frac{1}{p}\right)^2 + 2 \times p \times \frac{1}{p} \quad [\because a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab] \\ &= (8)^2 + 2 \\ &= 64 + 2 \\ &= 66 \quad (\text{প্রমাণিত}) \end{aligned}$$

বিকল্প পদ্ধতি :

দেওয়া আছে, $p - \frac{1}{p} = 8$

$$\therefore \left(p - \frac{1}{p}\right)^2 = (8)^2 \quad [\text{উভয়পক্ষকে বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } p^2 - 2 \times p \times \frac{1}{p} + \left(\frac{1}{p}\right)^2 = 64$$

$$\text{বা, } p^2 - 2 + \frac{1}{p^2} = 64$$

$$\text{বা, } p^2 + \frac{1}{p^2} = 64 + 2$$

$$\therefore p^2 + \frac{1}{p^2} = 66 \quad (\text{প্রমাণিত})$$

কাজ : ১। $a + b = 4$ এবং $ab = 2$ হলে, $(a - b)^2$ এর মান নির্ণয় কর।

২। $a - \frac{1}{a} = 5$ হলে, দেখাও যে, $a^2 + \frac{1}{a^2} = 27$

উদাহরণ ১১। $(a + b + c)$ এর বর্গ নির্ণয় করো।

সমাধান : ধরি, $a + b = p$

$$\begin{aligned} \therefore (a + b + c)^2 &= \{(a + b) + c\}^2 \\ &= (p + c)^2 \\ &= p^2 + 2pc + c^2 \\ &= (a + b)^2 + 2 \times (a + b) \times c + c^2 \text{ [p- এর মান বসিয়ে পাই]} \\ &= a^2 + 2ab + b^2 + 2ac + 2bc + c^2 \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \end{aligned}$$

বিকল্প সমাধান :

$$\begin{aligned} (a + b + c)^2 &= \{(a + b) + c\}^2 \\ &= (a + b)^2 + 2 \times (a + b) \times c + c^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 + 2ac + 2bc + c^2 \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \end{aligned}$$

কাজ : ১। $a + b + c$ এর বর্গ নির্ণয় করো, যেখানে $(b + c) = m$
২। $a + b + c$ এর বর্গ নির্ণয় করো, যেখানে $(a + c) = n$

উদাহরণ ১২। $(x + y - z)$ এর বর্গ নির্ণয় করো।

সমাধান : ধরি, $x + y = m$

$$\begin{aligned} \therefore (x + y - z)^2 &= \{(x + y) - z\}^2 \\ &= (m - z)^2 \\ &= m^2 - 2mz + z^2 \\ &= (x + y)^2 - 2 \times (x + y) \times z + z^2 \quad \text{[m-এর মান বসিয়ে]} \\ &= x^2 + 2xy + y^2 - 2xz - 2yz + z^2 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2xz - 2yz \end{aligned}$$

উদাহরণ ১৩। $(3x - 2y + 5z)$ এর বর্গ নির্ণয় করো।

সমাধান : $(3x - 2y + 5z)$ এর বর্গ

$$\begin{aligned} &= \{(3x - 2y) + 5z\}^2 \\ &= (3x - 2y)^2 + 2 \times (3x - 2y) \times 5z + (5z)^2 \text{ [}\therefore \text{১ম রাশি } 3x - 2y, \text{ ২য় রাশি } = 5z \text{]} \\ &= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2y + (2y)^2 + 2 \times 5z(3x - 2y) + 25z^2 \\ &= 9x^2 - 12xy + 4y^2 + 30xz - 20yz + 25z^2 \\ &= 9x^2 + 4y^2 + 25z^2 - 12xy + 30xz - 20yz \end{aligned}$$

উদাহরণ ১৪। সরল করো $(2x + 3y)^2 - 2(2x + 3y)(2x - 5y) + (2x - 5y)^2$

সমাধান : ধরি, $2x + 3y = a$ এবং $2x - 5y = b$

$$\begin{aligned} \text{প্রদত্ত রাশি} &= a^2 - 2ab + b^2 \\ &= (a - b)^2 \\ &= \{(2x + 3y) - (2x - 5y)\}^2 \quad [a \text{ ও } b \text{ এর মান বসিয়ে}] \\ &= \{2x + 3y - 2x + 5y\}^2 \\ &= (8y)^2 \\ &= 64y^2 \end{aligned}$$

উদাহরণ ১৫। $x = 7$ এবং $y = 6$ হলে, $16x^2 - 40xy + 25y^2$ এর মান নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : প্রদত্ত রাশি} &= 16x^2 - 40xy + 25y^2 \\ &= (4x)^2 - 2 \times 4x \times 5y + (5y)^2 \\ &= (4x - 5y)^2 \\ &= (4 \times 7 - 5 \times 6)^2 \quad [x \text{ ও } y \text{ এর মান বসিয়ে}] \\ &= (28 - 30)^2 \\ &= (-2)^2 \\ &= (-2) \times (-2) \\ &= 4 \end{aligned}$$

কাজ :

১। $(3x - 2y - z)$ এর বর্গ নির্ণয় করো।

২। সরল কর : $(5a - 7b)^2 + 2(5a - 7b)(9b - 4a) + (9b - 4a)^2$

৩। $x = 3$ হলে, $9x^2 - 24x + 16$ এর মান কত?

অনুশীলনী ৫.১

সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করো (১-১৬)।

১। $a + 5$

২। $5x - 7$

৩। $3a - 11xy$

৪। $5a^2 + 9m^2$

৫। 55

৬। 990

৭। $xy - 6y$

৮। $ax - by$

৯। 97

১০। $2x + y - z$

১১। $2a - b + 3c$

১২। $x^2 + y^2 - z^2$

১৩। $a - 2b - c$

১৪। $3x - 2y + z$

১৫। $bc + ca + ab$

১৬। $2a^2 + 2b - c^2$

সরল করো (১৭-২৪)।

১৭। $(2a + 1)^2 - 4a(2a + 1) + 4a^2$

$$১৮। (5a + 3b)^2 + 2(5a + 3b)(4a - 3b) + (4a - 3b)^2$$

$$১৯। (7a + b)^2 - 2(7a + b)(7a - b) + (7a - b)^2$$

$$২০। (2x + 3y)^2 + 2(2x + 3y)(2x - 3y) + (2x - 3y)^2$$

$$২১। (5x - 2)^2 + (5x + 7)^2 - 2(5x - 2)(5x + 7)$$

$$২২। (3ab - cd)^2 + 9(cd - ab)^2 + 6(3ab - cd)(cd - ab)$$

$$২৩। (2x + 5y + 3z)^2 + (5y + 3z - x)^2 - 2(5y + 3z - x)(2x + 5y + 3z)$$

$$২৪। (2a - 3b + 4c)^2 + (2a + 3b - 4c)^2 + 2(2a - 3b + 4c)(2a + 3b - 4c)$$

মান নির্ণয় কর (২৫-২৮) :

$$২৫। 25x^2 + 36y^2 - 60xy, \text{ যখন } x = -4, y = -5$$

$$২৬। 16a^2 - 24ab + 9b^2, \text{ যখন } a = 7, b = 6$$

$$২৭। 9x^2 + 30x + 25, \text{ যখন } x = -2$$

$$২৮। 81a^2 + 18ac + c^2, \text{ যখন } a = 7, c = -67$$

$$২৯। a - b = 7 \text{ এবং } ab = 3 \text{ হলে, দেখাও যে, } (a + b)^2 = 61$$

$$৩০। a + b = 5 \text{ এবং } ab = 12 \text{ হলে, দেখাও যে, } a^2 + b^2 = 1$$

$$৩১। x + \frac{1}{x} = 5 \text{ হলে, প্রমাণ কর যে, } \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)^2 = 525$$

$$৩২। a + b = 8 \text{ এবং } a - b = 4 \text{ হলে, } ab = \text{কত?}$$

$$৩৩। x + y = 7 \text{ এবং } xy = 10 \text{ হলে, } x^2 + y^2 + 5xy \text{ এর মান কত?}$$

$$৩৪। m + \frac{1}{m} = 2 \text{ হলে, দেখাও যে, } m^4 + \frac{1}{m^4} = 2$$

$$\text{সূত্র ৩। } (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$\text{প্রমাণ : } (a + b)(a - b) = a(a - b) + b(a - b)$$

$$= a^2 - ab + ab - b^2$$

$$\therefore (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

উদাহরণ ১৬। সূত্রের সাহায্যে $(3x + 2y)$ কে $(3x - 2y)$ দ্বারা গুণ করো।

$$\text{সমাধান : } (3x + 2y)(3x - 2y)$$

$$= (3x)^2 - (2y)^2$$

$$= 9x^2 - 4y^2$$

উদাহরণ ১৭। সূত্রের সাহায্যে $(ax^2 + b)$ কে $(ax^2 - b)$ দ্বারা গুণ করো।

$$\text{সমাধান : } (ax^2 + b)(ax^2 - b)$$

$$= (ax^2)^2 - (b)^2$$

$$= a^2x^4 - b^2$$

উদাহরণ ১৮। সূত্রের সাহায্যে $(3x + 2y + 1)$ কে $(3x - 2y + 1)$ দ্বারা গুণ করো।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & (3x + 2y + 1)(3x - 2y + 1) \\ & = \{(3x + 1) + 2y\} \{(3x + 1) - 2y\} \\ & = (3x + 1)^2 - (2y)^2 \\ & = 9x^2 + 6x + 1 - 4y^2 \\ & = 9x^2 - 4y^2 + 6x + 1 \end{aligned}$$

দুটি রাশির যোগফল \times এদের বিয়োগফল = রাশি দুটির বর্গের বিয়োগফল

সূত্র ৪। $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

$$\begin{aligned} \text{প্রমাণ : } & (x + a)(x + b) = (x + a)x + (x + a)b \\ & = x^2 + ax + bx + ab \\ & = x^2 + (a + b)x + ab \end{aligned}$$

অর্থাৎ, $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ (এবং b এর বীজগণিতীয় যোগফল) $x + (a + b)$ এর গুণফল)

উদাহরণ ১৯। $(a + 3)$ কে $(a + 2)$ দ্বারা গুণ করো।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & (a + 3)(a + 2) \\ & = a^2 + (3 + 2)a + 3 \times 2 \\ & = a^2 + 5a + 6 \end{aligned}$$

উদাহরণ ২০। $(px + 3)$ কে $(px - 5)$ দ্বারা গুণ করো।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & (px + 3)(px - 5) \\ & = (px)^2 + \{3 + (-5)\} px + 3 \times (-5) \\ & = p^2 x^2 + (3 - 5) px - 15 \\ & = p^2 x^2 + (-2) px - 15 \\ & = p^2 x^2 - 2 px - 15 \end{aligned}$$

উদাহরণ ২১। $(p^2 - 2r)$ কে $(p^2 - 3r)$ দ্বারা গুণ করো।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & (p^2 - 2r)(p^2 - 3r) \\ & = (p^2)^2 + (-2r - 3r)p^2 + (-2r) \times (-3r) \\ & = p^4 - 5rp^2 + 6r^2 \\ & = p^4 - 5p^2 r + 6r^2 \end{aligned}$$

উদাহরণ ২২। সূত্রের সাহায্যে গুণফল নির্ণয়

করো: $(2x + y)$, $(2x - y)$, $(4x^2 + y^2)$

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & (2x + y)(2x - y)(4x^2 + y^2) \\ & = \{(2x)^2 - y^2\} (4x^2 + y^2) \\ & = (4x^2 - y^2)(4x^2 + y^2) \\ & = (4x^2)^2 - (y^2)^2 \\ & = 16x^4 - y^4 \end{aligned}$$

কাজ : ১। $(2a + 3)$ কে $(2a - 3)$ দ্বারা গুণ করো।

২। $(4x + 5)$ কে $(4x + 3)$ দ্বারা গুণ করো।

৩। $(6a - 7)$ কে $(6a + 5)$ দ্বারা গুণ করো।

অনুশীলনী ৫.২

সূত্রের সাহায্যে গুণফল নির্ণয় করো:

$$১। (4x+3), (4x-3)$$

$$২। (13-12p), (13+12p)$$

$$৩। (ab+3), (ab-3)$$

$$৪। (10-xy), (10+xy)$$

$$৫। (4x^2+3y^2), (4x^2-3y^2)$$

$$৬। (a-b-c), (a+b+c)$$

$$৭। (x^2-x+1), (x^2+x+1)$$

$$৮। \left(x-\frac{1}{2}a\right), \left(x-\frac{5}{2}a\right)$$

$$৯। \left(\frac{1}{4}x-\frac{1}{3}y\right), \left(\frac{1}{4}x+\frac{1}{3}y\right)$$

$$১০। (a^4+3a^2x^2+9x^4), (9x^4-3a^2x^2+a^4)$$

$$১১। (x+1), (x-1), (x^2+1)$$

$$১২। (9a^2+b^2), (3a+b), (3a-b)$$

৫.২ বীজগণিতীয় রাশির উৎপাদক

আমরা জানি, $6 = 2 \times 3$

এখানে, 2 ও 3 হলো 6 এর দুইটি উৎপাদক বা গুণনীয়ক।

৩ নং সূত্র থেকে আমরা জানি, $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

তাহলে, $(a+b)$ ও $(a-b)$ বীজগণিতীয় রাশি $a^2 - b^2$ এর দুটি উৎপাদক বা গুণনীয়ক।

কোনো বীজগণিতীয় রাশি দুই বা ততোধিক রাশির গুণফল হলে, শেষোক্ত রাশিগুলোর প্রত্যেকটিকে প্রথম রাশির উৎপাদক বা গুণনীয়ক বলা হয়।

বীজগণিতীয় বিভিন্ন সূত্র এবং গুণের বিনিময়বিধি, সংযোগবিধি ও বণ্টনবিধি ব্যবহার করে বীজগণিতীয় রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা হয়।

গুণের বণ্টনবিধির সাহায্যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ

উদাহরণ ২২। $20x + 4y$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

$$\text{সমাধান : } 20x + 4y = 4 \times 5x + 4 \times y$$

$$= 4(5x + y) \text{ [গুণের বণ্টনবিধি অনুযায়ী]}$$

উদাহরণ ২৩। $ax - by + ax - by$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

$$\text{সমাধান : } ax - by + ax - by$$

$$= ax + ax - by - by$$

$$= 2ax - 2by$$

$$= 2(ax - by)$$

[গুণের বণ্টনবিধি অনুযায়ী]

উদাহরণ ২৪। উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো: $2x - 6x^2$

সমাধান : $2x - 6x^2 = 2x(1 - 3x)$

উদাহরণ ২৫। উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো: $x^2 + 4x + xy + 4y$

সমাধান : $x^2 + 4x + xy + 4y$
 $= x(x + 4) + y(x + 4)$ [গুনের বন্টনবিধি অনুযায়ী]
 $= (x + 4)(x + y)$

লক্ষ করি : দুটি রাশি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন বন্টনবিধি প্রয়োগ করে প্রাপ্ত রাশি দুটির মধ্যে একটি সাধারণ উৎপাদক পাওয়া যায়।

কাজ : উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

১। $28a + 7b$ ২। $15y - 9y^2$ ৩। $5a^2b^4 - 9a^4b^2$
 ৪। $2a^2 + 3a + 2ab + 3b$ ৫। $x^4 + 6x^2 + 4x^3 + 24x$

বীজগণিতীয় সূত্রের সাহায্যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ

উদাহরণ ২৬। উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো: $25 - 9x^2$

সমাধান : $25 - 9x^2 = (5)^2 - (3x)^2 = (5 + 3x)(5 - 3x)$

উদাহরণ ২৭। $8x^4 - 2x^2a^2$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান : $8x^4 - 2x^2a^2 = 2x^2(4x^2 - a^2)$ [বন্টনবিধি অনুযায়ী]
 $= 2x^2\{(2x)^2 - (a)^2\} = 2x^2(2x + a)(2x - a)$

উদাহরণ ২৮। উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো: $25(a + 2b)^2 - 36(2a - 5b)^2$

সমাধান : ধরি, $a + 2b = x$ এবং $2a - 5b = y$

\therefore প্রদত্ত রাশি $= 25x^2 - 36y^2$
 $= (5x)^2 - (6y)^2$
 $= (5x + 6y)(5x - 6y)$
 $= \{5(a + 2b) + 6(2a - 5b)\} \{5(a + 2b) - 6(2a - 5b)\}$ [x ও y এর মান বসিয়ে]
 $= (5a + 10b + 12a - 30b)(5a + 10b - 12a + 30b)$
 $= (17a - 20b)(40b - 7a)$

উদাহরণ ২৯। উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো: $x^2 + 5x + 6$

$$\begin{array}{l|l} \text{সমাধান : } x^2 + 5x + 6 & \because (x+a)(x+b) \\ = x^2 + (2+3)x + 2 \times 3 & = x^2 + (a+b)x + ab \\ = (x+2)(x+3) & \text{এখানে, } a=2 \text{ এবং } b=3 \end{array}$$

উদাহরণ ৩০। উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো: $4x^2 - 4xy + y^2 - z^2$

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & 4x^2 - 4xy + y^2 - z^2 \\ & = (2x)^2 - 2 \times 2x \times y + (y)^2 - z^2 \\ & = (2x - y)^2 - (z)^2 \\ & = (2x - y + z)(2x - y - z) \end{aligned}$$

উদাহরণ ৩১। উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো: $2bd - a^2 - c^2 + b^2 + d^2 + 2ac$

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } & 2bd - a^2 - c^2 + b^2 + d^2 + 2ac \\ & = b^2 + 2bd + d^2 - a^2 + 2ac - c^2 \quad [\text{সাজিয়ে}] \\ & = (b^2 + 2bd + d^2) - (a^2 - 2ac + c^2) \\ & = (b + d)^2 - (a - c)^2 \\ & = (b + d + a - c)(b + d - a + c) \\ & = (a + b - c + d)(b - a + c + d) \end{aligned}$$

কাজ : উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

১। $a^2 - 81b^2$	২। $25x^4 - 36y^4$	৩। $9x^2 - (2x + y)^2$
৪। $x^2 + 7x + 10$	৫। $m^2 + m - 30$	

অনুশীলনী ৫.৩

উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

১। $x^2 + xy + zx + yz$	২। $a^2 + bc + ca + ab$
৩। $ab(px + qy) + a^2qx + b^2py$	৪। $4x^2 - y^2$
৫। $9a^2 - 4b^2$	৬। $a^2b^2 - 49y^2$
৭। $16x^4 - 81y^4$	৮। $a^2 - (x + y)^2$
৯। $(2x - 3y + 5z)^2 - (x - 2y + 3z)^2$	১০। $4 + 8a^2 + 9a^4$

১১। $2a^2 + 6a - 80$

১২। $y^2 - 6y - 91$

১৩। $p^2 - 15p + 56$

১৪। $45a^8 - 5a^4x^4$

১৫। $a^2 + 3a - 40$

১৬। $(x^2 + 1)^2 - (y^2 + 1)^2$

১৭। $x^2 + 11x + 30$

১৮। $a^2 - b^2 + 2bc - c^2$

১৯। $144x^7 - 25x^3a^4$

২০। $4x^2 + 12xy + 9y^2 - 16a^2$

৫.৩ ভাজ্য, ভাজক, গুণনীয়ক ও গুণিতক

x, y ও z তিনটি রাশি। ধরি,

$$x \div y = z$$

ভাজ্য ভাজক ভাগফল

এখানে একটি ভাগ প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। x কে ভাগ করা হয়েছে, তাই x ভাজ্য। আবার, y দ্বারা ভাগ করা হয়েছে, ফলে y ভাজক এবং z হলো ভাগফল।

যেমন, $10 \div 2 = 5$

এখানে, $10 \longrightarrow$ ভাজ্য

$2 \longrightarrow$ ভাজক

$5 \longrightarrow$ ভাগফল

এক্ষেত্রে 10, 2 এর একটি গুণিতক। আবার 10, 5 এরও একটি গুণিতক। অপরদিকে 2 এবং 5 উভয় 10 এর উৎপাদক।

একটি রাশি (ভাজ্য) অপর একটি রাশি (ভাজক) দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হলে, ভাজ্যকে ভাজকের একটি গুণিতক (*multiple*) বলা হয় এবং ভাজককে ভাজ্যের গুণনীয়ক বা উৎপাদক (*factor*) বলে।

৫.৪ গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (গ.সা.গু.)

পাটিগণিত থেকে আমরা জেনেছি,

12 এর গুণনীয়কগুলো 1, (2), (3), 4, (6), 12

18 " " 1, (2), (3), (6), 9, 18

24 " " 1, (2), (3), 4, (6), 8, 12, 24

12, 18 ও 24 এর সাধারণ গুণনীয়কগুলো 2, 3 ও 6। এদের মধ্যে বড় গুণনীয়কটি 6।

\therefore 12, 18 ও 24 এর গ.সা.গু. 6

বীজগণিতে,

xyz এর গুণনীয়কগুলো যথাক্রমে (x) , y , z

$5x$ এর গুণনীয়কগুলো যথাক্রমে 5, (x)

$3xp$ এর গুণনীয়কগুলো যথাক্রমে 3, (x) , p

$\therefore xyz, 5x, 3xp$ রাশিগুলোর সাধারণ গুণনীয়ক x

\therefore রাশিগুলোর গ.সা.গু. x

ফর্মা নং-১১, গণিত-৭ম শ্রেণি, দাখিল

যে রাশি দুই বা ততোধিক রাশির প্রত্যেকটির গুণনীয়ক, ঐ রাশিকে প্রদত্ত রাশিগুলোর সাধারণ গুণনীয়ক বলা হয়।

দুই বা ততোধিক রাশির গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (গ.সা.গু.) হলো এমন একটি রাশি যা সাধারণ গুণনীয়কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় মানের একটি রাশি এবং যা দ্বারা প্রদত্ত রাশিগুলো নিঃশেষে বিভাজ্য হয়।

গ.সা.গু. নির্ণয়ের নিয়ম

- পাটিগণিতের নিয়মে প্রদত্ত রাশিগুলোর সাংখ্যিক সহগের গ.সা.গু. নির্ণয় করতে হয়।
- বীজগণিতীয় রাশিগুলোর মৌলিক উৎপাদক বের করতে হয়।
- সাংখ্যিক সহগের গ.সা.গু. এবং প্রদত্ত রাশিগুলোর বীজগণিতীয় সাধারণ মৌলিক উৎপাদকগুলোর ধারাবাহিক গুণফল হচ্ছে নির্ণেয় গ.সা.গু.।

উদাহরণ ৩২। $8x^2yz^2$ এবং $10x^3y^2z^3$ এর গ.সা.গু. নির্ণয় করো।

সমাধান : $8x^2yz^2 = 2 \times 2 \times 2 \times x \times x \times y \times z \times z$

$$10x^3y^2z^3 = 2 \times 5 \times x \times x \times x \times y \times y \times z \times z \times z$$

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে সাধারণ গুণনীয়কগুলো $2, x, x, y, z, z$.

নির্ণেয় গ.সা.গু. $2 \times x \times x \times y \times z \times z = 2x^2yz^2$

উদাহরণ ৩৩। $2(a^2 - b^2)$ এবং $(a^2 - 2ab + b^2)$ এর গ.সা.গু. নির্ণয় করো।

সমাধান : ১ম রাশি = $2(a^2 - b^2) = 2(a + b)(a - b)$

$$২য় রাশি = a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)(a - b)$$

এখানে সাংখ্যিক সহগ ২ ও ১ এর গ.সা.গু. = ১.

এবং সাধারণ মৌলিক উৎপাদক বা গুণনীয়ক $(a - b)$

নির্ণেয় গ.সা.গু. $1 \times (a - b)$

$$=(a - b)$$

উদাহরণ ৩৪। $x^2 - 4$, $2x + 4$ এবং $x^2 + 5x + 6$ এর গ.সা.গু. নির্ণয় করো।

সমাধান : ১ম রাশি = $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$

$$২য় রাশি = 2x + 4 = 2(x + 2)$$

$$৩য় রাশি = x^2 + 5x + 6 = x^2 + 2x + 3x + 6 \quad \text{উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে}$$

$$= x(x + 2) + 3(x + 2) = (x + 2)(x + 3)$$

এখানে প্রদত্ত রাশিগুলোর সাংখ্যিক সহগ ১, ২ এবং ১ এর গ.সা.গু. = ১

সাধারণ মৌলিক উৎপাদক = $(x + 2)$

নির্ণেয় গ.সা.গু. $1 \times (x + 2) = (x + 2)$

কাজ : গ.সা.গু. নির্ণয় করো:	
১। $3x^3y^2, 2x^2y^3$	২। $3xy, 6x^2y, 9xy^2$
৩। $(x^2 - 25), (x - 5)^2$	৪। $x^2 - 9, x^2 + 7x + 12, 3x + 9$

৫.৫ লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল.সা.গু.)

পাটিগণিতে আমরা জানি,

4 এর গুণিতকগুলো হচ্ছে 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36,

6 " " " 6, 12, 18, 24, 30, 36,

4 এবং 6 এর সাধারণ গুণিতক হচ্ছে 12, 24, 36,

4 এবং 6 এর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক হচ্ছে 12.

দুই বা ততোধিক সংখ্যার ল.সা.গু. হচ্ছে এমন একটি সংখ্যা যা প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর সাধারণ গুণিতকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট।

বীজগণিতীয় রাশির ক্ষেত্রে,

$$x^2y^2 \div x^2y = y$$

$$\text{এবং } x^2y^2 \div xy^2 = x$$

অর্থাৎ, x^2y ও xy^2 এর প্রত্যেকটি দ্বারা x^2y^2 নিঃশেষে বিভাজ্য।

সুতরাং, x^2y^2 হলো x^2y ও xy^2 এর একটি সাধারণ গুণিতক।

$$\text{আবার, } x^2y = x \times x \times y$$

$$xy^2 = x \times y \times y$$

এখানে রাশি দুটিতে x আছে সর্বোচ্চ দুইবার এবং y আছে সর্বোচ্চ দুইবার।

$$\therefore \text{ল.সা.গু.} = x \times x \times y \times y = x^2y^2$$

মন্তব্য : ল.সা.গু. = সাধারণ উৎপাদক \times সাধারণ নয় এরূপ উৎপাদক।

দুই বা ততোধিক রাশির সম্ভাব্য সকল উৎপাদকের সর্বোচ্চ ঘাতের গুণফলকে রাশিগুলোর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল.সা.গু.) বলা হয়।

ল.সা.গু. নির্ণয়ের নিয়ম

ল.সা.গু. নির্ণয় করার জন্য প্রথমে সাংখ্যিক সহগগুলোর ল.সা.গু. বের করতে হবে। এরপর উৎপাদকের সর্বোচ্চ ঘাত বের করতে হবে। অতঃপর উভয়ের গুণফলই হবে প্রদত্ত রাশিগুলোর ল.সা.গু.।

উদাহরণ ৩৫। $4x^2y^3z, 6xy^3z^2$ এবং $8x^3yz^3$ এর ল.সা.গু. নির্ণয় করো।

সমাধান : রাশিগুলোর সাংখ্যিক সহগ 4, 6 ও 8 এর ল.সা.গু. 24

প্রদত্ত রাশিগুলোর অন্তর্ভুক্ত সর্বোচ্চ ঘাতবিশিষ্ট উৎপাদকগুলো যথাক্রমে x^3, y^3 ও z^3

নির্ণেয় ল.সা.গু. $24x^3y^3z^3$

উদাহরণ ৩৬। $a^2 - b^2$ ও $a^2 + 2ab + b^2$ এর ল.সা.গু. নির্ণয় করো।

সমাধান : ১ম রাশি $= a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

২য় রাশি $= a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$

প্রদত্ত রাশিগুলোর সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ঘাতবিশিষ্ট উৎপাদকগুলো $(a - b)$ ও $(a + b)^2$

নির্ণেয় ল.সা.গু. $(a - b)(a + b)^2$

উদাহরণ ৩৭। $2x^2y + 4xy^2$, $4x^3y - 16xy^3$ এবং $5x^2y^2(x^2 + 4xy + 4y^2)$ এর ল.সা.গু. নির্ণয় কর।

সমাধান : ১ম রাশি $= 2x^2y + 4xy^2 = 2xy(x + 2y)$

২য় রাশি $= 4x^3y - 16xy^3 = 4xy(x^2 - 4y^2) = 4xy(x + 2y)(x - 2y)$

৩য় রাশি $= 5x^2y^2(x^2 + 4xy + 4y^2) = 5x^2y^2(x + 2y)^2$

সাংখ্যিক সহগ 2, 4 ও 5 এর ল.সা.গু. 20

প্রদত্ত রাশিগুলোতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ঘাতবিশিষ্ট উৎপাদকগুলো x^2 , y^2 , $(x + 2y)^2$, $(x - 2y)$

নির্ণেয় ল.সা.গু. $20x^2y^2(x - 2y)(x + 2y)^2$

কাজ : ল.সা.গু. নির্ণয় কর।

১। $3x^2y^3$, $9x^3y^2$ ও $12x^2y^2$ ২। $3a^2 + 9$, $a^4 - 9$ ও $a^4 + 6a^2 + 9$

৩। $x^2 + 10x + 21$, $x^4 - 49x^2$ ৪। $a - 2$, $a^2 - 4$, $a^2 - a - 2$

উদাহরণ ৩৮। $x^3 - 3x^2 - 10x$, $x^3 + 6x^2 + 8x$ এবং $x^4 - 5x^3 - 14x^2$ তিনটি বীজগাণিতিক রাশি।

ক) $(3a + 2b - c)$ এর বর্গ নির্ণয় করো।

খ) ১ম ও ২য় রাশির ল.সা.গু. নির্ণয় করো।

গ) রাশি তিনটির ল.সা.গু. নির্ণয় করো।

সমাধান:

ক) $(3a + 2b - c)$ এর বর্গ
 $= (3a + 2b - c)^2$
 $= \{(3a + 2b) - c\}^2$
 $= (3a + 2b)^2 - 2(3a + 2b).c + c^2$
 $= (3a)^2 + 2.3a.2b + (2b)^2 - 6ca - 4bc + c^2$
 $= 9a^2 + 12ab + 4b^2 - 6ca - 4bc + c^2$
 $= 9a^2 + 4b^2 + c^2 + 12ab - 4bc - 6ca$

খ) ১ম রাশি $= x^3 - 3x^2 - 10x$
 $= x(x^2 - 3x - 10)$
 $= x(x^2 - 5x + 2x - 10)$
 $= x\{x(x - 5) + 2(x - 5)\}$
 $= x(x + 2)(x - 5)$

$$\begin{aligned}
 \text{২য় রাশি} &= x^3 + 6x^2 + 8x \\
 &= x(x^2 + 6x + 8) \\
 &= x(x^2 + 2x + 4x + 8) \\
 &= x\{x(x+2) + 4(x+2)\} \\
 &= x(x+2)(x+4)
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় গ.সা.গু} = x(x+2)$$

গ) ১ম রাশি = $x(x+2)(x-5)$; [খ হতে প্রাপ্ত]

২য় রাশি = $x(x+2)(x+4)$; [খ হতে প্রাপ্ত]

$$\begin{aligned}
 \text{৩য় রাশি} &= x^4 - 5x^3 - 14x^2 \\
 &= x^2(x^2 - 5x - 14) \\
 &= x^2(x^2 + 2x - 7x - 14) \\
 &= x^2\{x(x+2) - 7(x+2)\} \\
 &= x^2(x+2)(x-7)
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ল.সা.গু} = x^2(x+2)(x+4)(x-5)(x-7)$$

অনুশীলনী ৫.৪

১। $(a-5)$ এর বর্গ কোনটি?

(ক) $a^2 + 10a + 25$ (খ) $a^2 - 10a + 25$ (গ) $a^2 + 5a + 25$ (ঘ) $a^2 - 5a + 25$

২। $(x+y)^2 + 2(x+y)(x-y) + (x-y)^2$ এর মান কোনটি?

(ক) $8x^2$ (খ) $8y^2$ (গ) $4x^2$ (ঘ) $4y^2$

৩। $a+b=4$ এবং $a-b=2$ হলে, ab এর মান কত?

(ক) 3 (খ) 8 (গ) 12 (ঘ) 16

৪। একটি রাশি অপর একটি রাশি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হলে, ভাজ্যকে ভাজকের কী বলা হয়?

(ক) ভাগফল (খ) ভাগশেষ (গ) গুণিতক (ঘ) গুণনীয়ক

৫। $2a$ ও $3b$ এর গ.সা.গু. কত?

(ক) 1 (খ) 6 (গ) ab (ঘ) $6ab$

৬। $9x^2 - 25y^2$ এবং $15ax - 25ay$ এর ল.সা.গু কত?

(ক) $(3x+5y)$ (খ) $(3x-5y)$
 (গ) $(9x^2 - 25y^2)$ (ঘ) $5a(9x^2 - 25y^2)$

৭। x^3y^5 ও $a^2 - b^2$ এর গ.সা.গু কত?

- (ক) x^3y^5 (খ) x^2a^2 (গ) xy^4 (ঘ) 1

৮। $x - \frac{1}{x} = 0$ হলে—

- (i) $x = 1$
(ii) $x = -1$
(iii) $x = \pm 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯। $a + \frac{1}{a} = 4$ হলে $a^2 - 4a + 1$ এর মান কত?

- (ক) 4 (খ) 3 (গ) 2 (ঘ) 0

১০। $(a + 5)$ এর বর্গ কোনটি?

- (ক) $a^2 + 10a + 25$ (খ) $a^2 - 10a + 25$
(গ) $a^2 + 5a + 25$ (ঘ) $a^2 + 5a - 25$

১১। $a + b = 8$, $a - b = 4$ হলে $ab =$ কত?

- (ক) 8 (খ) 10 (গ) 12 (ঘ) 18

গ.সা.গু. নির্ণয় করো (১২ – ২১)।

১২। $3a^3b^2c, 6ab^2c^2$

১৩। $5ab^2x^2, 10a^2by^2$

১৪। $3a^2x^2, 6axy^2, 9ay^2$

১৫। $16a^3x^4y, 40a^2y^3x, 28ax^3$

১৬। $a^2 + ab, a^2 - b^2$

১৭। $x^3y - xy^3, (x - y)^2$

১৮। $x^2 + 7x + 12, x^2 + 9x + 20$

১৯। $a^3 - ab^2, a^4 + 2a^3b + a^2b^2$

২০। $a^2 - 16, 3a + 12, a^2 + 5a + 4$

২১। $xy - y, x^3y - xy, x^2 - 2x + 1$

ল.সা.গু. নির্ণয় করো (২২ – ৩১)।

২২। $6a^3b^2c, 9a^4bd^2$

২৩। $5x^2y^2, 10xz^3, 15y^3z^4$

২৪। $2p^2xy^2, 3pq^2, 6pqx^2$

২৫। $(b^2 - c^2), (b + c)^2$

২৬। $x^2 + 2x, x^2 + 3x + 2$

২৭। $9x^2 - 25y^2, 15ax - 25ay$

২৮। $x^2 - 3x - 10, x^2 - 10x + 25$

২৯। $a^2 - 7a + 12, a^2 + a - 20, a^2 + 2a - 15$

৩০। $x^2 - 8x + 15, x^2 - 25, x^2 + 2x - 15$ ৩১। $x + 5, x^2 + 5x, x^2 + 7x + 10$

৩২। $a = 2x - 3$ এবং $b = 2x + 5$

ক) $a + b$ এর মান নির্ণয় করো।

খ) সূত্রের সাহায্যে a^2 এর মান নির্ণয় করো।

গ) সূত্রের সাহায্যে a ও b এর গুণফল নির্ণয় করো। $x = 2$ হলে, $ab =$ কত?

৩৩। $x^2 - 3x - 10, x^3 + 6x^2 + 8x$ এবং $x^4 - 5x^3 - 14x^2$ তিনটি বীজগাণিতিক রাশি।

ক) $(3x - 2y + z)$ এর বর্গ নির্ণয় করো।

খ) ১ম ও ২য় রাশির গ.সা.গু নির্ণয় করো।

গ) রাশি তিনটির ল.সা.গু নির্ণয় করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। $a, a^2, a(a + b)$ এর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক কোনটি?

(ক) a (খ) a^2 (গ) $a(a + b)$ (ঘ) $a^2(a + b)$

২। $x = a + 7$ ও $y = a - 7$ হলে—

(i) $x - y = 14$

(ii) $xy = a^2 - 49$

(iii) $y^2 = a^2 + 14a + 49$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

$(x^3y - xy^3)$ ও $(x - y)(x + 2y)$ দুইটি বীজগণিতীয় রাশি।

উপরের তথ্যের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩। প্রথম রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ নিচের কোনটি?

- (ক) $(x + y)(x - y)$ (খ) $x(x + y)(x - y)$
 (গ) $y(x + y)(x - y)$ (ঘ) $xy(x + y)(x - y)$

৪। বীজগণিতীয় রাশি দুটির ল.সা.গু. নিচের কোনটি?

- (ক) $x(x + y)(x - y)$ (খ) $y(x + y)(x - y)$
 (গ) $xy(x^2 - y^2)(x + 2y)$ (ঘ) $xy(x + y)(x + 2y)$

সৃজনশীল প্রশ্ন

৫। $x^4 - 625$ এবং $x^2 + 3x - 10$ দুটি বীজগণিতীয় রাশি।

- (ক) সূত্রের সাহায্যে $(m^2 - 3)$ ও $(m^2 + 3)$ এর গুণফল নির্ণয় করো।
 (খ) রাশি দুটির গ.সা.গু. নির্ণয় কর।
 (গ) রাশি দুটির ল.সা.গু. নির্ণয় করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৬। (ক) $9x^2 - 24x + 16$ -কে $(a - b)^2$ আকারে প্রকাশ করো।

(খ) $a - b = 5$ এবং $a^2 + b^2 = 37$ হলে, ab -এর মান নির্ণয় করো।

(গ) সূত্র প্রয়োগ করে $(ab - bc + ca)$ -এর বর্গ নির্ণয় করো।

(ঘ) $x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$ হলে, $(x - \frac{1}{x})^2$ -এর মান নির্ণয় করো।

ষষ্ঠ অধ্যায় বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ


ভগ্নাংশ অর্থ ভাঙা অংশ। আমরা দৈনন্দিন জীবনে একটি সম্পূর্ণ জিনিসের সাথে এর অংশও ব্যবহার করি। তাই ভগ্নাংশ, গণিতের একটি অপরিহার্য বিষয়। পাটিগণিতীয় ভগ্নাংশের মতো বীজগণিতীয় ভগ্নাংশেও লঘুকরণ ও সাধারণ হ্রবিশিষ্টকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাটিগণিতীয় ভগ্নাংশের অনেক জটিল সমস্যা বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের মাধ্যমে সহজে সমাধান করা যায়। কাজেই শিক্ষার্থীদের বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের লঘুকরণ, সাধারণ হ্রবিশিষ্টকরণ এবং যোগ ও বিয়োগ উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা –

- বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের লঘুকরণ ও সাধারণ হ্রবিশিষ্টকরণ করতে পারবে;
- বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ ও সরলীকরণ করতে পারবে।

৬.১ ভগ্নাংশ

আবির একটি আপেল সমান দুইভাগে ভাগ করে এক ভাগ তার ভাই কবিরকে দিল। তাহলে দুই ভাইয়ের প্রত্যেকে পেল আপেলটির অর্ধেক, অর্থাৎ $\frac{1}{2}$ অংশ। এই $\frac{1}{2}$ একটি ভগ্নাংশ।



আবার ধরা যাক, টিনা একটি বৃত্তের 4 ভাগের 3 ভাগ কালো রং করল। তাহলে, তার রং করা হলো সম্পূর্ণ

বৃত্তটির $\frac{3}{4}$ অংশ। এখানে $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ এগুলো পাটিগণিতীয় ভগ্নাংশ যাদের লব 1, 3


এবং হর 2, 4। যদি কোনো ভগ্নাংশের শুধু লব বা শুধু হর বা লব ও হর উভয়কে

বীজগণিতীয় প্রতীক বা রাশি দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তবে তা হবে বীজগণিতীয়

ভগ্নাংশ। যেমন, $\frac{a}{4}$, $\frac{5}{b}$, $\frac{a}{b}$, $\frac{2a}{a+b}$, $\frac{a}{5x}$, $\frac{x}{x+1}$, $\frac{2x+1}{x-3}$, ইত্যাদি


বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ।

ফর্মা নং-১২, গণিত-৭ম শ্রেণি, দাখিল



৬.২ সমতুল ভগ্নাংশ

লক্ষ করি, দুটি সমান বর্গাকার ক্ষেত্রের ১নং চিত্রে দুই ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ $\frac{1}{2}$ অংশ কালো রং করা হয়েছে এবং ২নং চিত্রে চার ভাগের দুই ভাগ, অর্থাৎ $\frac{2}{4}$ অংশ কালো রং করা হয়েছে। কিন্তু দেখা যায়, দুই চিত্রের মোট কালো রং করা অংশ সমান।



অতএব, আমরা লিখতে পারি, $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4}$; আবার, $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{3}{6}$
এভাবে, $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{5}{10} = \dots\dots\dots$, এগুলো পরস্পর সমতুল ভগ্নাংশ।

একইভাবে বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে, $\frac{a}{b} = \frac{a \times c}{b \times c} = \frac{ac}{bc}$ [লব ও হরকে c দ্বারা গুণ করে, $c \neq 0$]

আবার, $\frac{ac}{bc} = \frac{ac \div c}{bc \div c} = \frac{a}{b}$ [লব ও হরকে c দ্বারা ভাগ করে, $c \neq 0$]

$\therefore \frac{a}{b}$ এবং $\frac{ac}{bc}$ পরস্পর সমতুল ভগ্নাংশ।

লক্ষণীয় যে, কোনো ভগ্নাংশের লব ও হরকে শূন্য ছাড়া একই রাশি দ্বারা গুণ বা ভাগ করলে, ভগ্নাংশের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না।

কাজ : $\frac{2}{5}$ এবং $\frac{a}{x}$ এর প্রতিটির তিনটি করে সমতুল ভগ্নাংশ লেখো।

৬.৩ ভগ্নাংশের লঘুকরণ

কোনো ভগ্নাংশের লঘুকরণের অর্থ হলো ভগ্নাংশটিকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিণত করা। এ জন্য লব ও হরকে এদের সাধারণ গুণনীয়ক বা উৎপাদক দ্বারা ভাগ করা হয়। কোনো ভগ্নাংশের লব ও হরের মধ্যে কোনো সাধারণ গুণনীয়ক বা উৎপাদক না থাকলে এরূপ ভগ্নাংশকে লঘিষ্ঠ আকারের ভগ্নাংশ বলা হয়।

উদাহরণ ১। $\frac{4a^2bc}{6ab^2c}$ কে লঘুকরণ কর।

সমাধান : $\frac{4a^2bc}{6ab^2c} = \frac{2 \times 2 \times a \times a \times b \times c}{2 \times 3 \times a \times b \times b \times c} = \frac{2a}{3b}$

ভগ্নাংশের লঘুকরণের মাধ্যমে নিচের খালি ঘরগুলো পূরণ করো (দুটি করে দেখানো হলো) :

বিকল্প পদ্ধতি : $\frac{4a^2bc}{6ab^2c} = \frac{2abc \times 2a}{2abc \times 3b} = \frac{2a}{3b}$ [লব ও হরের গ.সা.গু. $2abc$]

$\frac{9}{12} = \frac{3 \times 3}{2 \times 2 \times 3} = \frac{3}{4}$	$\frac{2^3}{2^4} =$
$\frac{a^2b}{ab^2} =$	$\frac{x^3}{x^2} = \frac{x \times x \times x}{x \times x} = x$
$\frac{3x}{6xy} =$	$\frac{2mn}{4m^2} =$

উদাহরণ ২। $\frac{2a^2 + 3ab}{4a^2 - 9b^2}$ কে লঘিষ্ঠ আকারে পরিণত করো।

সমাধান : $\frac{2a^2 + 3ab}{4a^2 - 9b^2} = \frac{2a^2 + 3ab}{(2a)^2 - (3b)^2}$
 $= \frac{a(2a + 3b)}{(2a + 3b)(2a - 3b)} = \frac{a}{2a - 3b}$ [$\because x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$]

উদাহরণ ৩। লঘুকরণ করো: $\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 + 3x + 2}$

সমাধান : $\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 + 3x + 2} = \frac{x^2 + 2x + 3x + 6}{x^2 + x + 2x + 2}$
 $= \frac{x(x + 2) + 3(x + 2)}{x(x + 1) + 2(x + 1)} = \frac{(x + 2)(x + 3)}{(x + 1)(x + 2)} = \frac{x + 3}{x + 1}$

৬.৪ সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ

সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশকে সমহরবিশিষ্ট ভগ্নাংশও বলে। এক্ষেত্রে প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলোর হর সমান

করতে হয়। $\frac{a}{2b}$ ও $\frac{m}{3n}$ ভগ্নাংশ দুটি বিবেচনা করি। ভগ্নাংশ দুইটির হর $2b$ এবং $3n$ এর ল.সা.গু. $6bn$.

অতএব, দুটি ভগ্নাংশেরই হর $6bn$ করতে হবে।

এখানে, $\frac{a}{2b} = \frac{a \times 3n}{2b \times 3n}$ [$\because 6bn \div 2b = 3n$]
 $= \frac{3an}{6bn}$

$$\begin{aligned}\text{এবং } \frac{m}{3n} &= \frac{m \times 2b}{3n \times 2b} \quad [\because 6bn \div 3n = 2b] \\ &= \frac{2bm}{6bn}.\end{aligned}$$

$$\therefore \text{সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ দুটি } \frac{3an}{6bn}, \frac{2bm}{6bn}.$$

সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করার নিয়ম

- ভগ্নাংশগুলোর হরের ল.সা.গু. বের করতে হয়।
- ল.সা.গু. কে প্রত্যেক ভগ্নাংশের হর দ্বারা ভাগ করে ভাগফল বের করতে হয়।
- প্রাপ্ত ভাগফল দ্বারা সংশ্লিষ্ট ভগ্নাংশের লব ও হরকে গুণ করতে হয়।

$$\text{উদাহরণ ৪। সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো: } \frac{a}{4x}, \frac{b}{2x^2}$$

সমাধান : হর $4x$ এবং $2x^2$ এর ল.সা.গু. $4x^2$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{a}{4x} &= \frac{a \times x}{4x \times x} \quad [\because 4x^2 \div 4x = x] \\ &= \frac{ax}{4x^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এবং } \frac{b}{2x^2} &= \frac{b \times 2}{2x^2 \times 2} \quad [\because 4x^2 \div 2x^2 = 2] \\ &= \frac{2b}{4x^2}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ দুইটি } \frac{ax}{4x^2}, \frac{2b}{4x^2}$$

$$\text{উদাহরণ ৫। সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তর করো: } \frac{2}{a^2 - 4}, \frac{5}{a^2 + 3a - 10}$$

$$\text{সমাধান : } 1\text{ম ভগ্নাংশের হর} = a^2 - 4 = (a + 2)(a - 2)$$

$$\begin{aligned}2\text{য় ভগ্নাংশের হর} &= a^2 + 3a - 10 = a^2 - 2a + 5a - 10 \\ &= a(a - 2) + 5(a - 2) = (a - 2)(a + 5)\end{aligned}$$

$$\text{হর দুইটির ল.সা.গু. } (a + 2)(a - 2)(a + 5)$$

এবার ভগ্নাংশগুলোকে সমহরবিশিষ্ট করি।

$$\begin{aligned} \therefore \frac{2}{a^2 - 4} &= \frac{2}{(a+2)(a-2)} = \frac{2 \times (a+5)}{(a+2)(a-2) \times (a+5)} \quad [\text{লব ও হরকে } (a+5) \text{ দ্বারা গুণ করে}] \\ &= \frac{2(a+5)}{(a^2 - 4)(a+5)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এবং } \frac{5}{a^2 + 3a - 10} &= \frac{5}{(a-2)(a+5)} = \frac{5 \times (a+2)}{(a-2)(a+5) \times (a+2)} \quad [\text{লব ও হরকে } (a+2) \text{ দ্বারা গুণ করে}] \\ &= \frac{5(a+2)}{(a^2 - 4)(a+5)} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ভগ্নাংশ দুটি } \frac{2(a+5)}{(a^2 - 4)(a+5)}, \frac{5(a+2)}{(a^2 - 4)(a+5)}$$

উদাহরণ ৬। সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে পরিণত করো।

$$\frac{1}{x^2 + 3x}, \frac{2}{x^2 + 5x + 6}, \frac{3}{x^2 - x - 12}$$

সমাধান : ১ম ভগ্নাংশের হর = $x^2 + 3x = x(x+3)$

$$\begin{aligned} ২য় \text{ ভগ্নাংশের হর} &= x^2 + 5x + 6 = x^2 + 2x + 3x + 6 \\ &= x(x+2) + 3(x+2) = (x+2)(x+3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ৩য় \text{ ভগ্নাংশের হর} &= x^2 - x - 12 = x^2 + 3x - 4x - 12 \\ &= x(x+3) - 4(x+3) = (x+3)(x-4) \end{aligned}$$

হর তিনটির ল.সা.গু. $x(x+2)(x+3)(x-4)$

এবার ভগ্নাংশগুলোকে সমহরবিশিষ্ট করি-

$$\therefore \text{১ম ভগ্নাংশ} = \frac{1}{x^2 + 3x} = \frac{1 \times (x+2)(x-4)}{x(x+3) \times (x+2)(x-4)} = \frac{(x+2)(x-4)}{x(x+2)(x+3)(x-4)}$$

$$\begin{aligned} \text{২য় ভগ্নাংশ} &= \frac{2}{x^2 + 5x + 6} = \frac{2}{(x+2)(x+3)} = \frac{2 \times x(x-4)}{(x+2)(x+3) \times x(x-4)} \\ &= \frac{2x(x-4)}{x(x+2)(x+3)(x-4)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{৩য় ভগ্নাংশ} &= \frac{3}{x^2 - x - 12} = \frac{3}{(x+3)(x-4)} = \frac{3 \times x(x+2)}{(x+3)(x-4) \times x(x+2)} \\ &= \frac{3x(x+2)}{x(x+2)(x+3)(x-4)} \end{aligned}$$

∴ নির্ণেয় ভগ্নাংশ তিনটি যথাক্রমে

$$\frac{(x+2)(x-4)}{x(x+2)(x+3)(x-4)}, \frac{2x(x-4)}{x(x+2)(x+3)(x-4)}, \frac{3x(x+2)}{x(x+2)(x+3)(x-4)}$$

কাজ :

১। রাশি তিনটির ল.সা.গু. নির্ণয় করো: $a^2 + 3a$, $a^2 + 5a + 6$, $a^2 - a - 12$

২। সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো: $\frac{a}{2x}$, $\frac{b}{4y}$

অনুশীলনী ৬.১

লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো (১-১০)।

$$১। \frac{a^2b}{a^3c} \quad ২। \frac{a^2bc}{ab^2c} \quad ৩। \frac{x^3y^3z^3}{x^2y^2z^2} \quad ৪। \frac{x^2+x}{xy+y} \quad ৫। \frac{4a^2b}{6a^3b} \quad ৬। \frac{2a-4ab}{1-4b^2}$$

$$৭। \frac{2a+3b}{4a^2-9b^2} \quad ৮। \frac{a^2+4a+4}{a^2-4} \quad ৯। \frac{x^2-y^2}{(x+y)^2} \quad ১০। \frac{x^2+2x-15}{x^2+9x+20}$$

সাধারণ হ্রবিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো (১১-২০)।

১১। $\frac{a}{bc}, \frac{a}{ac}$ ১২। $\frac{x}{pq}, \frac{y}{pr}$ ১৩। $\frac{2x}{3m}, \frac{3y}{2n}$ ১৪। $\frac{a}{a-b}, \frac{b}{a+b}$

১৫। $\frac{x^2}{a^2-2ab}, \frac{y^2}{a+2b}$ ১৬। $\frac{3}{a^2-4}, \frac{2}{a(a+2)}$ ১৭। $\frac{a}{a^2-9}, \frac{b}{a+3}$

১৮। $\frac{a}{a+b}, \frac{b}{a-b}, \frac{c}{a-c}$ ১৯। $\frac{a}{a-b}, \frac{b}{a+b}, \frac{c}{a(a+b)}$

২০। $\frac{2}{x^2-x-2}, \frac{3}{x^2+x-6}$

৬.৫ বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ ও সরলীকরণ

লক্ষ করি :

পাটিগণিত	বীজগণিত
সম্পূর্ণ বর্গাকার ক্ষেত্রটিকে ১ ধরা হলে, এর	সম্পূর্ণ বর্গাকার ক্ষেত্রটিকে x ধরা হলে, এর
কালো অংশ = ১ এর $\frac{2}{4} = \frac{2}{4}$ 	কালো অংশ = x এর $\frac{2}{4} = \frac{2x}{4}$ 
দাগটানা অংশ = ১ এর $\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ 	দাগটানা অংশ = x এর $\frac{1}{4} = \frac{x}{4}$ 
∴ মোট রং করা অংশ = $\frac{2}{4} + \frac{1}{4}$	∴ মোট রং করা অংশ = $\frac{2x}{4} + \frac{x}{4}$
(কালো ও দাগ কাটা) = $\frac{2+1}{4} = \frac{3}{4}$	(কালো ও দাগ কাটা) = $\frac{2x+x}{4} = \frac{3x}{4}$
∴ সাদা অংশ = $\left(1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{4}{4} - \frac{3}{4}$	∴ সাদা অংশ = $x - \frac{3x}{4} = \frac{4x}{4} - \frac{3x}{4}$
$= \frac{4-3}{4} = \frac{1}{4}$	$= \frac{4x-3x}{4} = \frac{x}{4}$

লক্ষ করি, উপরের ঘরের মধ্যে লেখা ভগ্নাংশগুলোকে যোগ ও বিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ হ্রবিশিষ্ট করা হয়েছে।

বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগের নিয়ম

- ভগ্নাংশগুলোকে লঘিষ্ঠ সাধারণ হরবিশিষ্ট করতে হয়।
- যোগফলের হর লঘিষ্ঠ সাধারণ হর এবং লব রূপান্তরিত ভগ্নাংশগুলোর লবের যোগফল।
- বিয়োগফলের হর লঘিষ্ঠ সাধারণ হর এবং লব রূপান্তরিত ভগ্নাংশগুলোর লবের বিয়োগফল।

বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের যোগ

উদাহরণ ৭। যোগ করো: $\frac{x}{a}$ এবং $\frac{y}{a}$

$$\text{সমাধান: } \frac{x}{a} + \frac{y}{a} = \frac{x+y}{a}$$

উদাহরণ ৮। যোগফল নির্ণয় করো: $\frac{3a}{2x} + \frac{b}{2y}$

$$\text{সমাধান: } \frac{3a}{2x} + \frac{b}{2y} = \frac{3a \times y}{2x \times y} + \frac{b \times x}{2y \times x} = \frac{3ay + bx}{2xy} \quad [2x, 2y \text{ এর ল.সা.গু. } 2xy \text{ নিয়ে}]$$

বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের বিয়োগ

উদাহরণ ৯। বিয়োগ করো: $\frac{a}{x}$ থেকে $\frac{b}{x}$

$$\text{সমাধান: } \frac{a}{x} - \frac{b}{x} = \frac{a-b}{x}$$

উদাহরণ ১০। $\frac{2a}{3x}$ থেকে $\frac{b}{3y}$ বিয়োগ করো।

$$\text{সমাধান: } \frac{2a}{3x} - \frac{b}{3y} = \frac{2a \times y}{3xy} - \frac{b \times x}{3xy} = \frac{2ay - bx}{3xy} \quad (3x \text{ ও } 3y \text{ এর ল.সা.গু. } 3xy)$$

উদাহরণ ১১। বিয়োগফল নির্ণয় করো: $\frac{1}{a+2} - \frac{1}{a^2-4}$

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: } \frac{1}{a+2} - \frac{1}{a^2-4} &= \frac{1}{a+2} - \frac{1}{(a+2)(a-2)} = \frac{1 \times (a-2)}{(a+2) \times (a-2)} - \frac{1}{(a+2)(a-2)} \\ &= \frac{(a-2) - 1}{(a+2)(a-2)} = \frac{a-2-1}{(a+2)(a-2)} = \frac{a-3}{a^2-4} \end{aligned}$$

কাজ : নিচের ছকটি পূরণ করো।	
$\frac{1}{5} + \frac{3}{5} =$	$\frac{4}{5} - \frac{2}{5} =$
$\frac{3}{m} + \frac{2}{n} =$	$\frac{5}{ab} - \frac{1}{a} =$
$\frac{2}{x} + \frac{5}{2x} =$	$\frac{7}{xyz} - \frac{2z}{xy} =$
$\frac{3}{m} + \frac{2}{m^2} =$	$\frac{5}{p^2} - \frac{2}{3p} =$

বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের সরলীকরণ

প্রক্রিয়া চিহ্ন দ্বারা সংযুক্ত দুই বা ততোধিক বীজগণিতীয় ভগ্নাংশকে একটি ভগ্নাংশে বা রাশিতে পরিণত করাই হলো ভগ্নাংশের সরলীকরণ। এতে প্রাপ্ত ভগ্নাংশটিকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণ ১২। সরল করো: $\frac{a}{a+b} + \frac{b}{a-b}$

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } \frac{a}{a+b} + \frac{b}{a-b} &= \frac{a \times (a-b) + b \times (a+b)}{(a+b)(a-b)} = \frac{a^2 - ab + ab + b^2}{(a+b)(a-b)} \\ &= \frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2} \end{aligned}$$

উদাহরণ ১৩। সরল করো: $\frac{x+y}{xy} - \frac{y+z}{yz}$

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } \frac{x+y}{xy} - \frac{y+z}{yz} &= \frac{z \times (x+y) - x \times (y+z)}{xyz} = \frac{zx + zy - xy - xz}{xyz} \\ &= \frac{yz - xy}{xyz} = \frac{y(z-x)}{xyz} = \frac{z-x}{xz} \end{aligned}$$

উদাহরণ ১৪। সরল করো: $\frac{x-y}{xy} + \frac{y-z}{yz} - \frac{z-x}{zx}$

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } \frac{x-y}{xy} + \frac{y-z}{yz} - \frac{z-x}{zx} &= \frac{(x-y) \times z + (y-z) \times x - (z-x) \times y}{xyz} \\ &= \frac{zx - yz + xy - zx - yz + xy}{xyz} = \frac{2xy - 2yz}{xyz} = \frac{2y(x-z)}{xyz} = \frac{2(x-z)}{xz} \end{aligned}$$

অনুশীলনী ৬.২

- ১। $\frac{2}{3a}$ ও $\frac{3}{5ab}$ এর সমহরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ নিচের কোনটি?
 (ক) $\frac{10b}{15ab}$, $\frac{9}{15ab}$ (খ) $\frac{6}{15ab}$, $\frac{b}{15ab}$ (গ) $\frac{2}{15a^2b}$, $\frac{3}{15a^2b}$ (ঘ) $\frac{10a}{15a^2b}$, $\frac{9a}{15a^2b}$
- ২। $\frac{x}{yz}$ ও $\frac{y}{zx}$ এর সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ নিচের কোনটি?
 (ক) $\frac{zx^2}{xyz^2}$, $\frac{y^2z}{xyz^2}$ (খ) $\frac{x^2}{xyz^2}$, $\frac{y^2}{xyz^2}$ (গ) $\frac{x}{xyz}$, $\frac{y}{xyz}$ (ঘ) $\frac{x^2}{xyz}$, $\frac{y^2}{xyz}$
- ৩। $\frac{x}{2} + 1 = 3$ হলে, $x =$ কত?
 (ক) 1 (খ) 4 (গ) 6 (ঘ) 8
- ৪। $\frac{a}{b}$ এর সমতুল ভগ্নাংশ নিচের কোনটি?
 (ক) $\frac{a^2}{bc}$ (খ) $\frac{ac}{b}$ (গ) $\frac{a^3}{b^2}$ (ঘ) $\frac{ac}{bc}$
- ৫। $\frac{4a^2b - 9b^3}{4a^2b + 6ab^2}$ এর লঘিষ্ঠ রূপ নিচের কোনটি?
 (ক) $\frac{2a+3b}{2ab}$ (খ) $\frac{2a-3b}{2ab}$ (গ) $\frac{2a-3b}{2a}$ (ঘ) $\frac{2a+3b}{2a}$

৬। $\frac{a}{x} + \frac{b}{x} - \frac{c}{x}$ এর মান কত?

(ক) $\frac{a+b+c}{x}$

(খ) $\frac{a+b-c}{x}$

(গ) $\frac{a-b-c}{x}$

(ঘ) $\frac{a-b+c}{x}$

যোগফল নির্ণয় করো (৭ - ১২)

৭। $\frac{3a}{5} + \frac{2b}{5}$

৮। $\frac{1}{5x} + \frac{2}{5x}$

৯। $\frac{x}{2a} + \frac{y}{3b}$

১০। $\frac{2a}{x+1} + \frac{2a}{x-2}$

১১। $\frac{a}{a+2} + \frac{2}{a-2}$

১২। $\frac{3}{x^2-4x-5} + \frac{4}{x+1}$

বিয়োগফল নির্ণয় করো (১৩ - ১৮)

১৩। $\frac{2a}{7} - \frac{4b}{7}$

১৪। $\frac{2x}{5a} - \frac{4y}{5a}$

১৫। $\frac{a}{8x} - \frac{b}{4y}$

১৬। $\frac{3}{x+3} - \frac{2}{x+2}$

১৭। $\frac{p+q}{pq} - \frac{q+r}{qr}$

১৮। $\frac{2x}{x^2-4y^2} - \frac{x}{xy+2y^2}$

সরল করো: (১৯ - ২৪)

১৯। $\frac{5}{a^2-6a+5} + \frac{1}{a-1}$

২০। $\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x^2-4}$

২১। $\frac{a}{3} + \frac{a}{6} - \frac{3a}{8}$

২২। $\frac{a}{b} - \frac{3a}{2b} + \frac{2a}{3b}$

২৩। $\frac{x}{yz} - \frac{y}{zx} + \frac{z}{xy}$

২৪। $\frac{x-y}{xy} + \frac{y-z}{yz} + \frac{z-x}{zx}$

২৫। তিনটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ : $\frac{x}{x+y}$, $\frac{x}{x-4y}$, $\frac{y}{x^2-3xy-4y^2}$

(ক) উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো: $a^2 - 3a + 2$

(খ) ১ম ও ২য় ভগ্নাংশকে সমহরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো।

(গ) ভগ্নাংশ তিনটির যোগফল নির্ণয় করো।

২৬। তিনটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ:

$$\frac{1}{a^2+3a}, \frac{1}{a^2+5a+6}, \frac{1}{a^2-a-12}$$

(ক) ৩য় ভগ্নাংশের হরকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

(খ) ১ম ও ২য় ভগ্নাংশকে সমহরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তর করো।

(গ) ১ম, ২য় ও ৩য় ভগ্নাংশের যোগফল নির্ণয় করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a-b}$ এর মান কত?

(ক) $\frac{2}{a^2-b^2}$

(খ) $\frac{1}{a^2-b^2}$

(গ) $\frac{2a}{a^2-b^2}$

(ঘ) $\frac{ab}{a^2-b^2}$

২। $\frac{x^2}{xy}$ ভগ্নাংশটির—

i. লঘিষ্ঠ আকার $\frac{x}{y}$

ii. সমতুল ভগ্নাংশ $\frac{x^2+1}{xy+1}$

iii. সমহরবিশিষ্ট একটি ভগ্নাংশ $\frac{x^2+3}{xy}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

$\frac{2}{20}$

নিচের তথ্যের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

$\frac{x^2+2x}{(x+2)(x-2)}$ এবং $\frac{x^2+4x-4}{x^2-4}$ দুটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ।

৩। প্রথম ভগ্নাংশটির লঘিষ্ঠ আকার কোনটি?

(ক) $\frac{x}{x-2}$

(খ) $\frac{x}{x+2}$

(গ) $\frac{x+2}{x-2}$

(ঘ) $\frac{x-2}{x+2}$

৪। দ্বিতীয় ভগ্নাংশ থেকে প্রথম ভগ্নাংশ বিয়োগ করলে বিয়োগফল কত হবে?

(ক) $\frac{2}{x-2}$

(খ) $\frac{2}{x+2}$

(গ) $\frac{-2}{x-2}$

(ঘ) $\frac{-2}{x+2}$

সৃজনশীল প্রশ্ন

৫। $\frac{3}{x^2-x-12}$, $\frac{4}{x^2-9}$, $\frac{x-1}{x^2+3x}$ ও $\frac{3x+6}{x(x^2+5x+6)}$ চারটি ভগ্নাংশ।

(ক) $\frac{a^2-2a}{3(a-2)}$ -কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।

(খ) প্রথম ও দ্বিতীয় ভগ্নাংশকে সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো।

(গ) তৃতীয় ও চতুর্থ ভগ্নাংশের সমষ্টি নির্ণয় করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৬। (ক) $\frac{1}{x-4}$ ও $\frac{x}{x+2}$ ভগ্নাংশদ্বয়কে সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো।

(খ) $\frac{-ax}{a-b}$ থেকে $\frac{bx}{b-a}$ বিয়োগ করলে বিয়োগফল কত হবে তা নির্ণয় করো।

(গ) $\frac{a+b}{a-b}$ এর সাথে কোন ভগ্নাংশ যোগ করলে যোগফল 1 হবে তা নির্ণয় করো।

সপ্তম অধ্যায়

সরল সমীকরণ

আমরা দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণিতে সমীকরণ ও সরল সমীকরণ কী তা জেনেছি এবং বাস্তবভিত্তিক সমস্যা থেকে সমীকরণ গঠন করে তা সমাধান করতে শিখেছি। দাখিল সপ্তম শ্রেণির এ অধ্যায়ে আমরা সমীকরণ সমাধানের কিছু বিধি ও এদের প্রয়োগ সম্পর্কে জানব এবং বাস্তব সমস্যার ভিত্তিতে সমীকরণ গঠন করে তা সমাধান করা শিখব। এ ছাড়াও এ অধ্যায়ে লেখচিত্রে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে এবং সমীকরণের সমাধান লেখচিত্রে দেখানো হয়েছে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা –

- সমীকরণের পক্ষান্তরবিধি, বর্জনবিধি, আড়গুণনবিধি, প্রতিসাম্যবিধি ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- সমীকরণের বিধিসমূহ প্রয়োগ করে সমীকরণ সমাধান করতে পারবে;
- সরল সমীকরণ গঠন ও সমাধান করতে পারবে;
- লেখচিত্রে কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- লেখচিত্রের অক্ষ ও সুবিধাজনক একক নিয়ে বিন্দুপাতন করতে পারবে;
- লেখচিত্রের সাহায্যে সমীকরণের সমাধান করতে পারবে।

৭.১ পূর্ব পাঠের পুনরালোচনা

(১) যোগের ও গুণের বিনিময়বিধি

a, b এর যেকোনো মানের জন্য, $a + b = b + a$ এবং $ab = ba$

(২) গুণের বন্টনবিধি

a, b, c এর যেকোনো মানের জন্য, $a(b + c) = ab + ac$, $(b + c)a = ba + ca$

আমরা সমীকরণটি লক্ষ করি : $x + 3 = 7$.

- (ক) সমীকরণটির অজ্ঞাত রাশি বা চলক কোনটি?
- (খ) সমীকরণটির প্রক্রিয়া চিহ্ন কোনটি?
- (গ) সমীকরণটি সরল সমীকরণ কি না?
- (ঘ) সমীকরণটির মূল কত?

আমরা জানি চলক, প্রক্রিয়া চিহ্ন ও সমান চিহ্ন সংবলিত গাণিতিক বাক্যকে সমীকরণ বলে। আর চলকের এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণকে সরল সমীকরণ বলে। সরল সমীকরণ এক বা একাধিক চলকবিশিষ্ট হতে পারে।

যেমন, $x + 3 = 7$, $2y - 1 = y + 3$, $3z - 5 = 0$, $4x + 3 = x - 1$,

$x + 4y - 1 = 0$, $2x - y + 1 = x + y$ ইত্যাদি, এগুলো সরল সমীকরণ।

আমরা এ অধ্যায়ে শুধু এক চলকবিশিষ্ট সরল সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করব। সমীকরণ সমাধান করে চলকের যে মান পাওয়া যায়, একে সমীকরণটির মূল বলে। মূলটি দ্বারা সমীকরণটি সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ, চলকটির ঐ মান সমীকরণে বসালে সমীকরণটির দুইপক্ষ সমান হয়।

সমীকরণ সমাধানের জন্য চারটি স্বতঃসিদ্ধ আছে, তা আমরা জানি। এগুলো হলো :

- পরস্পর সমান রাশির প্রত্যেকটির সাথে একই রাশি যোগ করলে যোগফলগুলো পরস্পর সমান হয়।
- পরস্পর সমান রাশির প্রত্যেকটি থেকে একই রাশি বিয়োগ করলে বিয়োগফলগুলো পরস্পর সমান হয়।
- পরস্পর সমান রাশির প্রত্যেকটিকে একই রাশি দ্বারা গুণ করলে গুণফলগুলো পরস্পর সমান হয়।
- পরস্পর সমান রাশির প্রত্যেকটিকে অশূন্য একই রাশি দ্বারা ভাগ করলে ভাগফলগুলো পরস্পর সমান হয়।

কাজ :

$2x - 1 = 0$ সমীকরণটির ঘাত কত? এর প্রক্রিয়া চিহ্ন কোনটি লিখ। সমীকরণটির মূল কত?

৭.২ সমীকরণের বিধিসমূহ

(১) পক্ষান্তরবিধি

সমীকরণ-১ $x - 5 = 3$

পরবর্তী ধাপ

(ক) $x - 5 + 5 = 3 + 5$ [স্বতঃসিদ্ধ (১)]

(খ) $x = 3 + 5$

সমীকরণ-২ $4x = 3x + 7$

পরবর্তী ধাপ

(ক) $4x - 3x = 3x + 7 - 3x$ [স্বতঃসিদ্ধ (২)]

(খ) $4x - 3x = 7$

সমীকরণ-১ এ (খ) এর ক্ষেত্রে 5 এর চিহ্ন পরিবর্তিত হয়ে বামপক্ষ থেকে ডানপক্ষে গেছে। সমীকরণ-২ এ (খ) এর ক্ষেত্রে $3x$ এর চিহ্ন পরিবর্তিত হয়ে ডানপক্ষ থেকে বামপক্ষে গেছে।

কোনো সমীকরণের যেকোনো পদকে এক পক্ষ থেকে চিহ্ন পরিবর্তন করে অপরপক্ষে সরাসরি স্থানান্তর করা যায়। এই স্থানান্তরকে বলে পক্ষান্তরবিধি।

উদাহরণ ১। সমাধান করো: $x + 3 = 9$

সমাধান : $x + 3 = 9$

বা, $x = 9 - 3$ [পক্ষান্তর করে]

বা, $x = 6$

∴ সমাধান : $x = 6$

(২) বর্জনবিধি

(a) যোগের বর্জনবিধি :

$$\begin{array}{l}
 \text{সমীকরণ-১ } 2x + 3 = a + 3 \quad \begin{array}{l} \text{পরবর্তী ধাপ} \\ \text{(ক) } 2x + 3 - 3 = a + 3 - 3 \quad [\text{স্বতঃসিদ্ধ (২)}] \\ \text{(খ) } 2x = a \end{array} \\
 \text{সমীকরণ-২ } 7x - 5 = 2a - 5 \quad \begin{array}{l} \text{পরবর্তী ধাপ} \\ \text{(ক) } 7x - 5 + 5 = 2a - 5 + 5 \quad [\text{স্বতঃসিদ্ধ (১)}] \\ \text{(খ) } 7x = 2a \end{array}
 \end{array}$$

সমীকরণ-১ এ (খ) এর ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ থেকে 3 বর্জন করা হয়েছে।

সমীকরণ-২ এ (খ) এর ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ থেকে -5 বর্জন করা হয়েছে।

কোনো সমীকরণের উভয়পক্ষ থেকে একই চিহ্নযুক্ত সদৃশ পদ সরাসরি বর্জন করা যায়। একে বলা হয় যোগের (বা বিয়োগের) বর্জনবিধি।

বিকল্প নিয়ম : $x + 3 = 9$ বা, $x + 3 - 3 = 9 - 3$ [উভয়পক্ষ থেকে 3 বিয়োগ করে]বা, $x = 6$ ∴ সমাধান : $x = 6$

(b) গুণের বর্জনবিধি

$$\begin{array}{l}
 \text{সমীকরণ } 4(2x + 1) = 4(x - 2) \quad \begin{array}{l} \text{পরবর্তী ধাপ} \\ \text{(ক) } \frac{4(2x + 1)}{4} = \frac{4(x - 2)}{4} \quad [\text{স্বতঃসিদ্ধ (৪)}] \\ \text{(খ) } 2x + 1 = x - 2 \end{array}
 \end{array}$$

(খ) এর ক্ষেত্রে প্রদত্ত সমীকরণটির উভয়পক্ষ থেকে সাধারণ উৎপাদক সরাসরি বর্জন করা যায়।

কোনো সমীকরণের উভয়পক্ষ থেকে সাধারণ উৎপাদক সরাসরি বর্জন করা যায়। একে বলা হয় গুণের বর্জনবিধি।

উদাহরণ ২। সমাধান কর ও শুদ্ধি পরীক্ষা করো: $4y - 5 = 2y - 1$ সমাধান : $4y - 5 = 2y - 1$

বা, $4y - 2y = -1 + 5$ [পক্ষান্তর করে]

বা, $2y = 4$

বা, $2y = 2 \times 2$

বা, $y = 2$ [উভয়পক্ষ থেকে সাধারণ উৎপাদক 2 বর্জন করে]

\therefore সমাধান : $y = 2$

শুদ্ধি পরীক্ষা : প্রদত্ত সমীকরণে y এর মান 2 বসিয়ে পাই,

বামপক্ষ = $4y - 5 = 4 \times 2 - 5 = 8 - 5 = 3$

ডানপক্ষ = $2y - 1 = 2 \times 2 - 1 = 4 - 1 = 3$

\therefore বামপক্ষ = ডানপক্ষ

\therefore সমীকরণটির সমাধান শুদ্ধ হয়েছে।

(৩) আড়গুণনবিধি

পরবর্তী ধাপ

সমীকরণ $\frac{x}{2} = \frac{5}{3}$

(ক) $\frac{x}{2} \times 6 = \frac{5}{3} \times 6$

(খ) $3 \times x = 2 \times 5$

[উভয়পক্ষকে হর 2 ও 3 এর ল.সা.গু. 6 দ্বারা গুণ করা হয়েছে]

সমীকরণটির (খ) এর ক্ষেত্রে লিখতে পারি,

বামপক্ষের লব \times ডানপক্ষের হর = বামপক্ষের হর \times ডানপক্ষের লব
একে বলা হয় আড়গুণনবিধি।

উদাহরণ ৩। সমাধান করো: $\frac{2z}{3} - \frac{z}{6} = -\frac{3}{4}$

সমাধান : $\frac{2z}{3} - \frac{z}{6} = -\frac{3}{4}$

বা, $\frac{4z - z}{6} = -\frac{3}{4}$ [বামপক্ষে হর 3, 6 এর ল.সা.গু. 6]

বা, $\frac{3z}{6} = -\frac{3}{4}$

ফর্মা নং-১৪, গণিত-৭ম শ্রেণি, দাখিল

$$\text{বা, } \frac{z}{2} = -\frac{3}{4}$$

$$\text{বা, } 4 \times z = 2 \times (-3) \text{ [আড়গুণন করে]}$$

$$\text{বা, } 2 \times 2z = 2 \times (-3)$$

$$\text{বা, } 2z = -3 \text{ [উভয়পক্ষ থেকে সাধারণ উৎপাদক 2 বর্জন করে]}$$

$$\text{বা, } \frac{2z}{2} = -\frac{3}{2} \text{ [উভয়পক্ষকে 2 দ্বারা ভাগ করে]}$$

$$\text{বা, } z = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore \text{ সমাধান : } z = -\frac{3}{2}$$

(৪) প্রতিসাম্যবিধি

$$\text{সমীকরণ : } 2x + 1 = 5x - 8$$

$$\text{বা, } 5x - 8 = 2x + 1$$

একই সাথে বামপক্ষের সবগুলো পদ ডানপক্ষে ও ডানপক্ষের সবগুলো পদ বামপক্ষে কোনো চিহ্ন পরিবর্তন না করে স্থানান্তর করা যায়। একে বলা হয় প্রতিসাম্যবিধি।

উল্লিখিত স্বতঃসিদ্ধসমূহ ও বিধিসমূহ প্রয়োগ করে একটি সমীকরণকে অপর একটি সহজ সমীকরণে রূপান্তর করে সবশেষে তা $x = a$ আকারে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, চলক x এর মান a নির্ণয় করা হয়।

উদাহরণ ৪। সমাধান করো: $2(5 + x) = 16$

$$\text{সমাধান : } 2(5 + x) = 16$$

$$\text{বা, } 2 \times 5 + 2 \times x = 16 \quad \text{[বন্টনবিধি অনুসারে]}$$

$$\text{বা, } 10 + 2x = 16$$

$$\text{বা, } 2x = 16 - 10 \quad \text{[পক্ষান্তরবিধি]}$$

$$\text{বা, } 2x = 6$$

$$\text{বা, } \frac{2x}{2} = \frac{6}{2} \quad \text{[গুণের বন্টনবিধি]}$$

$$\text{বা, } x = 3$$

$$\therefore \text{ সমাধান } x = 3$$

উদাহরণ ৫। সমাধান করো: $\frac{3x+7}{4} + \frac{5x-4}{7} = x + 3\frac{1}{2}$

সমাধান: $\frac{3x+7}{4} + \frac{5x-4}{7} = x + 3\frac{1}{2}$

বা, $\frac{3x+7}{4} + \frac{5x-4}{7} - x = \frac{7}{2}$ [পক্ষান্তর করে]

বা, $\frac{7(3x+7) + 4(5x-4) - 28x}{28} = \frac{7}{2}$ [বামপক্ষে হর 4, 7 এর ল.সা.গু. 28]

বা, $\frac{21x+49+20x-16-28x}{28} = \frac{7}{2}$ [বর্টনবিধি অনুসারে]

বা, $\frac{13x+33}{28} = \frac{7}{2}$

বা, $28 \times \frac{13x+33}{28} = 28 \times \frac{7}{2}$ [উভয়পক্ষকে 28 দ্বারা গুণ করে]

বা, $13x+33=98$

বা, $13x=98-33$

বা, $13x=65$

বা, $\frac{13x}{13} = \frac{65}{13}$ [উভয়পক্ষকে 13 দ্বারা ভাগ করে]

বা, $x=5$

∴ সমাধান: $x=5$

কাজ: সমাধান করো।

১। $2x-1=0$ ২। $\frac{x}{2}+1=3$ ৩। $4(y-3)=8$

অনুশীলনী ৭.১

সমাধান করো:

১। $4x+1=2x+7$

২। $5x-3=2x+3$

৩। $3y+1=7y-1$

৪। $7y-5=y-1$

৫। $17-2z=3z+2$

৬। $13z-5=3-2z$

৭। $\frac{x}{4} = \frac{1}{3}$

৮। $\frac{x}{2} + 1 = 3$

$$৯। \frac{x}{3} + 5 = \frac{x}{2} + 7$$

$$১০। \frac{y}{2} - \frac{y}{3} = \frac{y}{5} - \frac{1}{6}$$

$$১১। \frac{y}{5} - \frac{2}{7} = \frac{5y}{7} - \frac{4}{5}$$

$$১২। \frac{2z-1}{3} = 5$$

$$১৩। \frac{5x}{7} + \frac{4}{5} = \frac{x}{5} + \frac{2}{7}$$

$$১৪। \frac{y-2}{4} + \frac{2y-1}{3} = y - \frac{1}{3}$$

$$১৫। \frac{3y+1}{5} = \frac{3y-7}{3}$$

$$১৬। \frac{x+1}{2} - \frac{x-2}{3} - \frac{x-3}{5} = 2$$

$$১৭। 2(x+3) = 10$$

$$১৮। 5(x-2) = 3(x-4)$$

$$১৯। 7(3-2y) + 5(y-1) = 34$$

$$২০। (z-1)(z+2) = (z+4)(z-2)$$

৭.৩ সরল সমীকরণ গঠন ও সমাধান

একজন ক্রেতা 3 কেজি পাটালি গুড় কিনতে চান। দোকানদার x কেজি ওজনের একটি বড়ো পাটালির অর্ধেক মাপলেন। কিন্তু এতে 3 কেজির কম হলো। আরও 1 কেজি দেওয়ায় 3 কেজি হলো। আমরা এখন বের করতে চাই, বড়ো পাটালি অর্থাৎ সম্পূর্ণ পাটালিটির ওজন কত ছিল, অর্থাৎ x এর মান কত? এ

জন্য সমস্যাটি থেকে একটি সমীকরণ গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে সমীকরণটি হবে $\frac{x}{2} + 1 = 3$ ।

সমীকরণটি সমাধান করলে x এর মান পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, গুড়ের সম্পূর্ণ পাটালির ওজন জানা যাবে।

কাজ : প্রদত্ত তথ্য থেকে সমীকরণ গঠন কর (একটি করে দেওয়া হলো) :	
প্রদত্ত তথ্য	সমীকরণ
১। একটি সংখ্যা x এর পাঁচগুণ থেকে 25 বিয়োগ করলে বিয়োগফল হবে 190	
২। পুত্রের বর্তমান বয়স y বছর, পিতার বয়স পুত্রের বয়সের চারগুণ এবং তাদের বর্তমান বয়সের সমষ্টি 45 বছর।	$y + 4y = 45$
৩। একটি আয়তাকার পুকুরের দৈর্ঘ্য x মিটার, দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থ 3 মিটার কম এবং পুকুরটির পরিসীমা 26 মিটার।	

উদাহরণ ৭। অহনা একটি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ও গণিতে মোট 176 নম্বর পেয়েছে এবং ইংরেজি অপেক্ষা গণিতে 10 নম্বর বেশি পেয়েছে। সে কোন বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছে?

সমাধান : ধরি, অহনা ইংরেজিতে x নম্বর পেয়েছে।

সুতরাং, সে গণিতে পেয়েছে $(x + 10)$ নম্বর।

প্রশ্নমতে,

$$x + x + 10 = 176$$

$$\text{বা, } 2x + 10 = 176$$

$$\text{বা, } 2x = 176 - 10 \quad [\text{পক্ষান্তর করে}]$$

$$\text{বা, } 2x = 166$$

$$\text{বা, } \frac{2x}{2} = \frac{166}{2} \quad [\text{উভয়পক্ষকে 2 দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\text{বা, } x = 83$$

$$\therefore x + 10 = 83 + 10 = 93$$

\therefore অহনা ইংরেজিতে পেয়েছে 83 নম্বর এবং গণিতে পেয়েছে 93 নম্বর।

উদাহরণ ৮। জামিল দোকান থেকে কিছু কলম কিনল। সেগুলোর $\frac{1}{2}$ অংশ তার বোনকে ও $\frac{1}{3}$ অংশ তার ভাইকে দিল। তার কাছে আর 5 টি কলম রইল। শ্যামল কয়টি কলম কিনেছিল?

সমাধান : ধরি, জামিল x টি কলম কিনেছিল।

\therefore জামিল তার বোনকে দেয় x এর $\frac{1}{2}$ টি বা $\frac{x}{2}$ টি কলম এবং তার ভাইকে দেয় x এর $\frac{1}{3}$ টি বা $\frac{x}{3}$ টি কলম।

$$\text{শর্তানুসারে, } x - \left(\frac{x}{2} + \frac{x}{3} \right) = 5$$

$$\text{বা, } x - \frac{x}{2} - \frac{x}{3} = 5$$

$$\text{বা, } \frac{6x - 3x - 2x}{6} = 5 \quad [\text{বামপক্ষে হর 2, 3 এর ল.সা.গু. 6}]$$

$$\text{বা, } \frac{x}{6} = 5$$

$$\text{বা, } x = 5 \times 6 \quad [\text{আড়গুণন করে}]$$

$$\text{বা, } x = 30$$

\therefore জামিল 30 টি কলম কিনেছিল।

উদাহরণ ৯। একটি বাস ঘণ্টায় 25 কি.মি. গতিবেগে ঢাকার গাবতলী থেকে আরিচা পৌঁছাল। আবার বাসটি ঘণ্টায় 30 কি.মি. গতিবেগে আরিচা থেকে গাবতলী ফিরে এলো। যাতায়াতে বাসটির মোট $5\frac{1}{2}$ ঘণ্টা সময় লাগল। গাবতলী থেকে আরিচার দূরত্ব কত?

সমাধান : মনে করি, গাবতলী থেকে আরিচার দূরত্ব d কি.মি.।

∴ গাবতলী থেকে আরিচা যেতে সময় লাগে $\frac{d}{25}$ ঘণ্টা।

আবার আরিচা থেকে গাবতলী ফিরে আসতে সময় লাগে $\frac{d}{30}$ ঘণ্টা।

∴ যাতায়াতে বাসটির মোট সময় লাগল $\left(\frac{d}{25} + \frac{d}{30}\right)$ ঘণ্টা।

প্রশ্নমতে, $\frac{d}{25} + \frac{d}{30} = 5\frac{1}{2}$

$$\text{বা, } \frac{6d + 5d}{150} = \frac{11}{2}$$

$$\text{বা, } 11d = \cancel{150}^{75} \times \frac{11}{\cancel{2}_1}$$

$$\text{বা, } d = 75$$

∴ গাবতলী থেকে আরিচার দূরত্ব 75 কি.মি.।

উদাহরণ ১০। দুটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার অন্তর 40 এবং তাদের অনুপাত 1:3.

ক) সংখ্যা দুটিকে x ও y ধরে সমীকরণ গঠন করো।

খ) সংখ্যা দুটি নির্ণয় করো।

গ) সংখ্যা দুটিকে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এবং একক মিটারে ধরে আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

সমাধান:

(ক) মনে করি, সংখ্যা দুটি x ও y ; যেখানে $x > y$

$$\text{প্রশ্নমতে } x - y = 40 \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{এবং } y : x = 1 : 3$$

$$\text{বা, } \frac{y}{x} = \frac{1}{3}$$

$$\text{বা, } x = 3y \dots\dots\dots (ii)$$

(খ) ক থেকে প্রাপ্ত

$$x - y = 40 \dots\dots\dots (i)$$

$$x = 3y \dots\dots\dots (ii)$$

(i) ও (ii) নং থেকে পাই,

$$3y - y = 40$$

$$\text{বা, } 2y = 40$$

$$\text{বা, } y = \frac{40}{2}$$

$$\therefore y = 20$$

(ii) নং $y = 20$ বসিয়ে পাই,

$$x = 3 \times 20 = 60$$

$$\therefore x = 60.$$

\therefore সংখ্যা দুটি 60 ও 20

গ) 'খ' থেকে প্রাপ্ত

সংখ্যা দুটি 60 ও 20।

ধরি, আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 60 মিটার

,, প্রস্থ 20 মিটার

$$\begin{aligned} \therefore \text{আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা} &= 2(\text{দৈর্ঘ্য} + \text{প্রস্থ}) \\ &= 2(60 + 20) \text{ মিটার} \\ &= 2 \times 80 \text{ মিটার} \\ &= 160 \text{ মিটার} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} &= \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} \\ &= 60 \text{ মি.} \times 20 \text{ মি.} \\ &= 1200 \text{ ব.মি.} \end{aligned}$$

অনুশীলনী ৭.২

নিচের সমস্যাগুলো থেকে সমীকরণ গঠন করে সমাধান করো।

- ১। কোন সংখ্যার দ্বিগুণের সাথে 5 যোগ করলে যোগফল 25 হবে?
- ২। কোন সংখ্যা থেকে 27 বিয়োগ করলে বিয়োগফল -21 হবে?
- ৩। কোন সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ 4 এর সমান হবে?
- ৪। কোন সংখ্যা থেকে 5 বিয়োগ করলে বিয়োগফলের 5 গুণ সমান 20 হবে?
- ৫। কোন সংখ্যার অর্ধেক থেকে তার এক-তৃতীয়াংশ বিয়োগ করলে বিয়োগফল 6 হবে?
- ৬। তিনটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি 63 হলে, সংখ্যা তিনটি বের করো।
- ৭। দুটি সংখ্যার যোগফল 55 এবং বড় সংখ্যাটির 5 গুণ ছোট সংখ্যাটির 6 গুণের সমান। সংখ্যা দুটি নির্ণয় করো।
- ৮। দীনা, মিনা ও রিনার একত্রে 180 টাকা আছে। মিনার চেয়ে দীনার 6 টাকা কম ও রিনার 12 টাকা বেশি আছে। কার কত টাকা আছে?
- ৯। একটি খাতা ও একটি কলমের মোট দাম 75 টাকা। খাতার দাম 5 টাকা কম ও কলমের দাম 2 টাকা বেশি হলে, খাতার দাম কলমের দামের দ্বিগুণ হতো। খাতা ও কলমের কোনটির দাম কত?
- ১০। একজন ফলবিক্রেতার মোট ফলের $\frac{1}{2}$ অংশ আপেল, $\frac{1}{3}$ অংশ কমলালেবু ও 40 টি আম আছে। তাঁর নিকট মোট কতগুলো ফল আছে?
- ১১। পিতার বর্তমান বয়স পুত্রের বর্তমান বয়সের 6 গুণ। 5 বছর পর তাদের বয়সের সমষ্টি হবে 45 বছর। পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স কত?
- ১২। সারা ও সাবার বয়সের অনুপাত 2:3। তাদের দুজনের বয়সের সমষ্টি 30 বছর হলে, কার বয়স কত?
- ১৩। একটি ক্রিকেট খেলায় ইমন ও সুমনের মোট রানসংখ্যা 58। ইমনের রানসংখ্যা সুমনের রানসংখ্যার দ্বিগুণের চেয়ে 5 রান কম। ঐ খেলায় ইমনের রানসংখ্যা কত?
- ১৪। একটি ট্রেন ঘণ্টায় 30 কি.মি. বেগে চলে কমলাপুর স্টেশন থেকে নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছাল। ট্রেনটির বেগ ঘণ্টায় 25 কি.মি. হলে 10 মিনিট সময় বেশি লাগত। দুই স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব কত?
- ১৫। একটি আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিনগুণ এবং জমিটির পরিসীমা 40 মিটার। জমিটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো।



লেখচিত্র

৭.৪ স্থানাঙ্কের ধারণা

ফ্রান্সের বিখ্যাত গণিতবিদ রেনে দেকার্তে (Rene Descartes 1596–1650) সর্বপ্রথম স্থানাঙ্কের ধারণা দেন। তিনি দুটি পরস্পরছেদী লম্বরেখার সাপেক্ষে বিন্দুর অবস্থান ব্যাখ্যা করেন।

একটি শ্রেণিকক্ষে একক আসনবিন্যাসে একজন শিক্ষার্থীর অবস্থান কোথায় জানতে হলে অনুভূমিক রেখা বা শয়ান রেখা বরাবর কোথায় আছে এবং উল্লম্ব রেখা বা খাড়া রেখা বরাবর কোথায় আছে তা জানা দরকার।


ধরি, শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষার্থী লিজা (L)-এর অবস্থান জানতে চাই। লিজার অবস্থানকে একটি বিন্দু (•) হিসেবে বিবেচনা করা যায়। চিত্রে লক্ষ করি, লিজা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু O থেকে আনুভূমিক রেখা OX বরাবর 3 একক দূরে M বিন্দুতে এবং সেখান থেকে উল্লম্ব রেখা OY এর সমান্তরাল রেখা বরাবর উপরদিকে 2 একক দূরে L বিন্দুতে অবস্থান করছে। তার এ অবস্থানকে (3, 2) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



৭.৫ বিন্দু পাতন


ছক কাগজে সমান দূরে পরস্পরছেদী সমান্তরাল সরলরেখা দ্বারা ছোটো ছোটো বর্গে বিভক্ত করা থাকে। ছক কাগজে কোনো বিন্দুর অবস্থান দেখানোকে বা কোনো বিন্দু স্থাপন করাকে বিন্দু পাতন বলে। বিন্দু পাতনের জন্য সুবিধামতো দুটি পরস্পর লম্ব সরলরেখা নেওয়া হয়। চিত্রে XOX' ও YOY' রেখাদ্বয় পরস্পর লম্বভাবে O বিন্দুতে ছেদ করেছে। O বিন্দুকে বলা হয় মূলবিন্দু। অনুভূমিক রেখা XOX' কে x-অক্ষ এবং উল্লম্ব রেখা YOY' কে y-অক্ষ বলা হয়।

প্রধানত ছক কাগজের ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্যকে একক হিসেবে ধরা হয়। সাধারণভাবে যেকোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ককে (x, y) লেখা হয়। x-কে বলা হয় বিন্দুটির x-স্থানাঙ্ক বা ভুজ এবং y-কে বলা হয় বিন্দুটির y-স্থানাঙ্ক বা কোটি। স্পষ্টতই মূলবিন্দু O এর স্থানাঙ্ক হবে (0, 0)।



চিত্র : ছক কাগজে x অক্ষ ও y অক্ষ

মূলবিন্দু থেকে x -অক্ষের ডানদিক ধনাত্মক দিক ও বামদিক ঋণাত্মক দিক। আবার, মূলবিন্দু থেকে y -অক্ষের উপরের দিক ধনাত্মক দিক ও নিচের দিক ঋণাত্মক দিক। ফলে ছকটি অক্ষদ্বয় দ্বারা চারটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এইভাগ চারটি ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণনের বিপরীত দিক অনুযায়ী ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ চতুর্ভাগ হিসেবে পরিচিত। প্রথম চতুর্ভাগে যেকোনো বিন্দুর x স্থানাঙ্ক ও y স্থানাঙ্ক উভয়ই ধনাত্মক, দ্বিতীয় চতুর্ভাগে যেকোনো বিন্দুর x স্থানাঙ্ক ঋণাত্মক ও y স্থানাঙ্ক ধনাত্মক, তৃতীয় চতুর্ভাগে যেকোনো বিন্দুর x স্থানাঙ্ক ঋণাত্মক ও y স্থানাঙ্ক ঋণাত্মক এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে যেকোনো বিন্দুর x স্থানাঙ্ক ধনাত্মক ও y স্থানাঙ্ক ঋণাত্মক।



চিত্র : x ও y স্থানাঙ্কে চিহ্ন নির্ধারণ


পূর্বের অনুচ্ছেদে আলোচিত লিজার অবস্থান $(3, 2)$ নির্ণয় করার জন্য প্রথমে x -অক্ষ বরাবর ডানদিকে ৩ একক দূরত্বে যেতে হবে। তারপর সেখান থেকে খাড়া উপর দিকে ২ একক দূরত্বে যেতে হবে। তা হলে লিজার অবস্থান L বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে $(3, 2)$ । অনুরূপভাবে চিত্রে P বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(-4, 2)$ ।

উদাহরণ ১। ছক কাগজে নিচের প্রথম চারটি বিন্দু স্থাপন করে তীর চিহ্ন অনুযায়ী যোগ কর : $(3, 2) \rightarrow (6, 2) \rightarrow (6, 4) \rightarrow (3, 4)$ । চিত্রটির জ্যামিতিক আকৃতি কী হবে?

সমাধান : ধরি, বিন্দু চারটি যথাক্রমে A, B, C, D । অর্থাৎ,


$A(3, 2), B(6, 2), C(6, 4)$ এবং $D(3, 4)$ । ছক কাগজে উভয় অক্ষে ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্যকে একক ধরি। A বিন্দুটি স্থাপন করতে

মূলবিন্দু O থেকে x -অক্ষের ডানদিক বরাবর ৩টি ছোট বর্গের বাহুর সমান দূরে গিয়ে উপরের দিকে ২টি ছোট বর্গের বাহুর সমান উঠে গেলে যে বিন্দুটি পাওয়া যাবে, তা A বিন্দু। অনুরূপভাবে প্রদত্ত অবশিষ্ট বিন্দুসমূহ স্থাপন করি। তারপর $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ এভাবে বিন্দুগুলো যোগ করি। এতে $ABCD$ চিত্রটি পাওয়া গেল। দেখা যায় যে, $ABCD$ চিত্রটি একটি আয়ত।



কাজ :

চিত্র থেকে তোমরা Q, R, S, T বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।



৭.৬ লেখচিত্রে সমীকরণের সমাধান

লেখচিত্রের সাহায্যে সহজেই সমীকরণের সমাধান বের করা যায়। মনে করি, $2x - 5 = 0$ সমীকরণটি সমাধান করতে হবে। সমীকরণের বামপক্ষ $2x - 5$ রাশিতে x -এর বিভিন্ন মান বসালে রাশিটির বিভিন্ন মান পাওয়া যায়। লেখচিত্রে প্রতিটি x কে ভুজ এবং রাশিটির মানকে কোটি ধরে একটি করে বিন্দু পাওয়া যাবে। বিন্দুগুলো যোগ করে একটি সরলরেখা অঙ্কিত হবে। সরলরেখাটি যে বিন্দুতে x -অক্ষকে ছেদ করে, সেই বিন্দুর ভুজই নির্ণেয় সমাধান। কেননা, x -এর এই মানের জন্য রাশিটির মান 0 হয়, যা সমীকরণের ডানপক্ষের মানের সমান হয়। এ ক্ষেত্রে সমীকরণটির সমাধান $x = \frac{5}{2}$ ।

উদাহরণ ২। $3x - 6 = 0$ সমীকরণটি সমাধান করো এবং লেখচিত্রে সমাধান প্রদর্শন করো।

সমাধান : $3x - 6 = 0$

বা, $3x = 6$ [পক্ষান্তর করে]

বা, $\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$ [উভয়পক্ষকে 3 দ্বারা ভাগ করে]

বা, $x = 2$


∴ সমাধান : $x = 2$

লেখচিত্র অঙ্কন : প্রদত্ত সমীকরণ $3x - 6 = 0$

x এর কয়েকটি মান নিয়ে $3x - 6$ এর অনুরূপ

মান বের করি এবং নিচের ছকটি তৈরি করি :

x	$3x - 6$	$(x, 3x - 6)$
2	0	(2,0)
5	9	(5,9)
6	12	(6,12)



লেখচিত্র অঙ্কনের জন্য তিনটি বিন্দু (2, 0), (5, 9) ও (6, 12) নেওয়া হলো।

মনে করি, পরস্পর লম্ব রেখা XOX' ও YOY' যথাক্রমে x -অক্ষ ও y -অক্ষ এবং O মূলবিন্দু।

ছক কাগজে উভয় অক্ষে ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্যকে একক ধরে (2, 0), (5, 9), (6, 12) বিন্দুগুলো স্থাপন করি। তারপর বিন্দুগুলো পরপর সংযোগ করি। লেখচিত্রে একটি সরলরেখা পাই। সরলরেখাটি x -অক্ষকে (2, 0) বিন্দুতে ছেদ করে। বিন্দুটির ভুজ হলো 2। সুতরাং প্রদত্ত সমীকরণের সমাধান $x = 2$ ।

উদাহরণ ৩। লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো: $3x - 4 = -x + 4$

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ $3x - 4 = -x + 4$

x এর কয়েকটি মান নিয়ে $3x - 4$ এর অনুরূপ মান বের করি এবং পাশের ছক-১ তৈরি করি :

$\therefore 3x - 4$ এর লেখের উপর তিনটি বিন্দু $(0, -4)$,

$(2, 2)$, $(4, 8)$ নিই।

আবার, x এর কয়েকটি মান নিয়ে $-x + 4$ এর অনুরূপ মান বের করি এবং নিচের ছক-২ তৈরি করি :

$\therefore -x + 4$ এর লেখের উপর তিনটি বিন্দু $(0, 4)$, $(2, 2)$, $(4, 0)$ নিই।


মনে করি, পরস্পর লম্ব রেখা XOX' ও YOY' যথাক্রমে x -

অক্ষ ও y -অক্ষ এবং O মূলবিন্দু। এখন, ছক-১ এ প্রাপ্ত $(0, -4)$,

$(2, 2)$, $(4, 8)$ বিন্দু তিনটি স্থাপন করি এবং এদের পরপর সংযোগ করি।

লেখচিত্রে একটি সরলরেখা পাই। আবার, ছক-২ এ প্রাপ্ত

$(0, 4)$, $(2, 2)$, $(4, 0)$ বিন্দু তিনটি স্থাপন করি ও এদের পরপর সংযোগ করি। এক্ষেত্রেও লেখচিত্রে একটি সরলরেখা পাই।



লক্ষ করি, সরলরেখা দুটি পরস্পর $(2, 2)$ বিন্দুতে ছেদ করেছে। ছেদবিন্দুতে $3x - 4$ ও $-x + 4$ এর মান পরস্পর সমান। সুতরাং, প্রদত্ত সমীকরণের সমাধান হলো $(2, 2)$ বিন্দুতে ভুজের মান, অর্থাৎ $x = 2$ ।

কাজ : নিচের সমীকরণগুলোর সমাধানের লেখচিত্র আঁকো।

১। $2x - 1 = 0$ ২। $3x + 5 = 2$

অনুশীলনী ৭.৩

১। $\frac{x}{3} - 3 = 0$ সমীকরণের মূল নিচের কোনটি?

(ক) -9

(খ) -3

(গ) 3

(ঘ) 9

- ২। কোন সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ 4 এর সমান হবে?
 (ক) 16 (খ) 4 (গ) $\frac{1}{4}$ (ঘ) $\frac{1}{16}$
- ৩। (2, -2) বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?
 (ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয় (গ) তৃতীয় (ঘ) চতুর্থ
- ৪। y অক্ষ বরাবর কোন বিন্দুর ভূজ কত?
 (ক) 0 (খ) 1 (গ) x (ঘ) y
- ৫। দুটি সংখ্যার বিয়োগফল y, বড়ো সংখ্যাটি z হলে, ছোটো সংখ্যাটি কত?
 (ক) z - y (খ) z + y (গ) -y - z (ঘ) -z + y
- ৬। $\frac{ab}{xy}$ এর সমতুল ভগ্নাংশ নিচের কোনটি?
 (ক) $\frac{abc}{xyz}$ (খ) $\frac{a^2b}{x^2y}$ (গ) $\frac{2ab}{2xy}$ (ঘ) $\frac{ab^2}{xy^2}$
- ৭। $3x + 1 = 0$ সমীকরণের ঘাত কত?
 (ক) $-\frac{1}{3}$ (খ) $\frac{1}{3}$ (গ) 1 (ঘ) 3
- ৮। কোন সংখ্যার সাথে -5 যোগ করলে 15 হবে?
 (ক) -20 (খ) 10 (গ) -10 (ঘ) 20
- ৯। x এর কোন মান $4x + 1 = 2x + 7$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে?
 (ক) 0 (খ) 2 (গ) 3 (ঘ) 4
- ১০। নিচের বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করে তীরচিহ্ন অনুযায়ী যোগ কর ও চিত্রটির জ্যামিতিক নামকরণ কর।
 (ক) (2, 2) → (6, 2), → (6, 6) → (2, 6) → (2, 2)
 (খ) (0, 0) → (-6, -6), → (8, 6) → (0, 0)
- ১১। সমাধান করো এবং সমাধান লেখচিত্রে দেখাও।
 (ক) $x - 4 = 0$ (খ) $2x + 4 = 0$ (গ) $x + 3 = 8$
 (ঘ) $2x + 1 = x - 3$ (ঙ) $3x + 4 = 5x$
- ১২। হিমু ও সুমন 475 টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে 75 টাকা দিয়ে একটি খাতা ও একটি কলম ক্রয় করে। একটি কলমের মূল্য একটি খাতার মূল্যের $\frac{1}{4}$ অংশ। অবশিষ্ট টাকা তারা 2 : 3 অনুপাতে ভাগ করে নেয়।
 (ক) কোন সংখ্যার দ্বিগুণ থেকে 3 বিয়োগ করলে বিয়োগফল 5 হবে তা নির্ণয় করো।
 (খ) কলমটির মূল্য নির্ণয় করো।
 (গ) হিমু, সুমন অপেক্ষা কত টাকা বেশি পাবে তা নির্ণয় করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। একটি ত্রিভুজের বাহু তিনটির দৈর্ঘ্য $(x+1)$ সে.মি., $(x+2)$ সে.মি. ও $(x+3)$ সে.মি. $(x > 0)$ । ত্রিভুজটির পরিসীমা 15 সে.মি. হলে, x এর মান কত?
 (ক) 3 সে.মি. (খ) 6 সে.মি. (গ) 8 সে.মি. (ঘ) 9 সে.মি.

নিচের তথ্যের আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

$$2x - 5 = -x + 4 \text{ একটি সমীকরণ এবং } (2, -1) \text{ একটি বিন্দু।}$$

- ২। সমীকরণটির সমাধান কোনটি?
 (ক) 1 (খ) 2 (গ) 3 (ঘ) 4
- ৩। $(2, -1) -$
 i. বিন্দুটির ভুজ 2
 ii. বিন্দুটি চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থিত
 iii. বিন্দুটি $2x - 5$ এর লেখের উপর অবস্থিত
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ৪। $\frac{3y-2}{5} + \frac{y+7}{4} = \frac{y+1}{10}$ ও $3x - 1 = x + 1$ দুটি সমীকরণ।
 (ক) কোনো ধনাত্মক সংখ্যার সাথে 2 যোগ করলে যোগফল 9 হলে, সংখ্যাটি নির্ণয় করো।
 (খ) প্রথম সমীকরণটি সমাধান করে y -এর মান নির্ণয় করো।
 (গ) লেখচিত্রের সাহায্যে দ্বিতীয় সমীকরণটি সমাধান করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ৫। (ক) দুটি ক্রমিক ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার সমষ্টি 21 হলে, বড়ো সংখ্যাটি নির্ণয় করো।
 (খ) $\frac{x+2}{5} - \frac{3-x}{5} = 1$ হলে, x -এর মান নির্ণয় করো।
 (গ) কন্যার বয়স মাতার বয়সের এক তৃতীয়াংশ এবং দু'জনের মোট বয়স 48 বছর হলে, মাতার বয়স নির্ণয় করো।
 (ঘ) একটি পুকুরের পরিসীমা 34 মিটার। এর প্রস্থ, দৈর্ঘ্য অপেক্ষা 7 মিটার কম হলে, প্রস্থ নির্ণয় করো।

অষ্টম অধ্যায়

সমান্তরাল সরলরেখা

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি ও ব্যবহার করি এর কিছু চারকোনা, কিছু গোলাকার। আমাদের ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, দরজা-জানালা, খাট-আলমারি, টেবিল-চেয়ার, বই-খাতা ইত্যাদি সবই চারকোনা। এদের ধারণা সরলরেখা হিসেবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এরা সমদূরবর্তী বা সমান্তরাল।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা –

- সমান্তরাল সরলরেখা ও ছেদক দ্বারা উৎপন্ন কোণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- দুটি সরলরেখা সমান্তরাল হওয়ার শর্ত বর্ণনা করতে পারবে;
- দুটি সরলরেখা সমান্তরাল হওয়ার শর্ত প্রমাণ করতে পারবে;

৮.১ জ্যামিতিক যুক্তি পদ্ধতি

প্রতিজ্ঞা : জ্যামিতিতে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হয়, সাধারণভাবে তাদের প্রতিজ্ঞা বলা হয়।

সম্পাদ্য : যে প্রতিজ্ঞায় কোনো জ্যামিতিক বিষয় অঙ্কন করে দেখানো হয় এবং যুক্তি দ্বারা অঙ্কনের নির্ভুলতা প্রমাণ করা যায়, একে সম্পাদ্য বলা হয়।

সম্পাদ্যের বিভিন্ন অংশ:

- (ক) **উপাত্ত :** সম্পাদ্যে যা দেওয়া থাকে, তাই উপাত্ত।
- (খ) **অঙ্কন :** সম্পাদ্যে যা করণীয়, তাই অঙ্কন।
- (গ) **প্রমাণ :** যুক্তি দ্বারা অঙ্কনের নির্ভুলতা যাচাই হলো প্রমাণ।

উপপাদ্য : যে প্রতিজ্ঞায় কোনো জ্যামিতিক বিষয়কে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়, একে উপপাদ্য বলে।

উপপাদ্যের বিভিন্ন অংশ:

- (ক) **সাধারণ নির্বচন:** এ অংশে প্রতিজ্ঞার বিষয়টি সরলভাবে বর্ণনা করা হয়।
- (খ) **বিশেষ নির্বচন:** এ অংশে প্রতিজ্ঞার বিষয়টি চিত্র দ্বারা বিশেষভাবে দেখানো হয়।
- (গ) **অঙ্কন:** এ অংশে প্রতিজ্ঞা সমাধানের বা প্রমাণের জন্য অতিরিক্ত অঙ্কন করতে হয়।
- (ঘ) **প্রমাণ:** এ অংশে স্বতঃসিদ্ধগুলো এবং পূর্বে গঠিত জ্যামিতিক সত্য ব্যবহার করে উপযুক্ত যুক্তি দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

অনুসিদ্ধান্ত : কোনো জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করে এর সিদ্ধান্ত থেকে এক বা একাধিক যে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়, এদেরকে অনুসিদ্ধান্ত বলা হয়।

আধুনিক যুক্তিমূলক জ্যামিতির আলোচনার জন্য কিছু মৌলিক স্বীকার্য, সংজ্ঞা ও চিহ্নের প্রয়োজন হয়।


জ্যামিতিতে ব্যবহৃত চিহ্নসমূহ

চিহ্ন	অর্থ	চিহ্ন	অর্থ
+	যোগ	\angle	কোণ
=	সমান	\perp	লম্ব
>	বৃহত্তর	Δ	ত্রিভুজ
<	ক্ষুদ্রতর	\odot	বৃত্ত
\cong	সর্বসম	\therefore	যেহেতু
\parallel	সমান্তরাল	\therefore	সুতরাং, অতএব

৮.২ ছেদক

কোনো সরলরেখা দুই বা ততোধিক সরলরেখাকে বিভিন্ন বিন্দুতে ছেদ করলে একে ছেদক বলে।

চিত্রে, AB ও CD দুটি সরলরেখা এবং LM সরলরেখাগুলোকে যথাক্রমে দুটি ভিন্ন বিন্দু P, Q তে ছেদ করেছে। LM সরলরেখা AB ও CD সরলরেখাদ্বয়ের ছেদক। ছেদকটি AB ও CD সরলরেখা দুইটির সাথে মোট আটটি কোণ তৈরি করেছে। কোণগুলোকে $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4, \angle 5, \angle 6, \angle 7, \angle 8$ দ্বারা নির্দেশ করি। কোণগুলোকে অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ, অনুরূপ ও একান্তর এই চার শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।



অন্তঃস্থ কোণ	$\angle 3, \angle 4, \angle 5, \angle 6$
বহিঃস্থ কোণ	$\angle 1, \angle 2, \angle 7, \angle 8$
অনুরূপ কোণ জোড়া	$\angle 1$ এবং $\angle 5, \angle 2$ এবং $\angle 6$ $\angle 3$ এবং $\angle 7, \angle 4$ এবং $\angle 8$
অন্তঃস্থ একান্তর কোণ জোড়া	$\angle 3$ এবং $\angle 6, \angle 4$ এবং $\angle 5$
বহিঃস্থ একান্তর কোণ জোড়া	$\angle 1$ এবং $\angle 8, \angle 2$ এবং $\angle 7$
ছেদকের একই পাশের অন্তঃস্থ কোণ জোড়া	$\angle 3$ এবং $\angle 5, \angle 4$ এবং $\angle 6$


- অনুরূপ কোণগুলোর বৈশিষ্ট্য: (ক) কোণের কৌণিক বিন্দু আলাদা (খ) ছেদকের একই পাশে অবস্থিত।
 একান্তর কোণগুলোর বৈশিষ্ট্য: (ক) কোণের কৌণিক বিন্দু আলাদা (খ) ছেদকের বিপরীত পাশে অবস্থিত
 (গ) সরলরেখা দুটির মধ্যে অবস্থিত।

কাজ

১। (ক) চিত্রের কোণগুলো জোড়ায় জোড়ায় শনাক্ত কর।
 (খ) $\angle 3$ ও $\angle 6$ এর অনুরূপ কোণ দেখাও।
 (গ) $\angle 4$ এর বিপ্রতীপ কোণ এবং $\angle 1$ এর সম্পূরক কোণ নির্দেশ কর।


৮.৩ জোড়া সমান্তরাল সরলরেখা

আমরা জেনেছি যে, একই সমতলে অবস্থিত দুটি সরলরেখা একে অপরকে ছেদ না করলে সেগুলো সমান্তরাল সরলরেখা। দুটি সমান্তরাল সরলরেখা থেকে যেকোনো দুটি রেখাংশ নিলে, রেখাংশ দুটিও পরস্পর সমান্তরাল হয়। দুটি সমান্তরাল সরলরেখার একটির যেকোনো বিন্দু থেকে অপরটির লম্বদূরত্ব সর্বদা সমান। আবার দুটি সরলরেখার একটির যেকোনো দুটি বিন্দু থেকে অপরটির লম্ব দূরত্ব পরস্পর সমান হলেও রেখাংশ সমান্তরাল। এই লম্বদূরত্বকে দুটি সমান্তরাল রেখাঘরের দূরত্ব বলা হয়। l ও m দুটি সমান্তরাল সরলরেখা।



লক্ষ করি, কোনো নির্দিষ্ট সরলরেখার উপর অবস্থিত নয় এরূপ বিন্দুর মধ্য দিয়ে ঐ সরলরেখার সমান্তরাল করে একটি মাত্র সরলরেখা আঁকা যায়।

৮.৪ সমান্তরাল সরলরেখার ছেদক দ্বারা উৎপন্ন কোণসমূহ



উপরের চিত্রে, AB ও CD দুটি সমান্তরাল সরলরেখা এবং EF সরলরেখাগুলোকে যথাক্রমে দুটি বিন্দু P ও Q তে ছেদ করেছে। EF সরলরেখা AB ও CD সরলরেখাঘরের ছেদক। ছেদকটি AB ও CD সরলরেখা দুটির সাথে $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4, \angle 5, \angle 6, \angle 7, \angle 8$ মোট আটটি কোণ তৈরি

ফর্মা নং-১৬, গণিত-৭ম শ্রেণি, দাখিল

করেছে। এ কোণগুলোর মধ্যে

(ক) $\angle 1$ এবং $\angle 5$, $\angle 2$ এবং $\angle 6$, $\angle 3$ এবং $\angle 7$, $\angle 4$ এবং $\angle 8$ পরস্পর অনুরূপ কোণ।

(খ) $\angle 3$ এবং $\angle 6$, $\angle 4$ এবং $\angle 5$ হলো পরস্পর একান্তর কোণ।

(গ) $\angle 3$, $\angle 4$, $\angle 5$, $\angle 6$ অন্তঃস্থ কোণ।


এই একান্তর ও অনুরূপ কোণগুলোর মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক বের করার জন্য দলগতভাবে নিচের কাজটি কর।

কাজ :

১। রুলটানা একপৃষ্ঠা কাগজে চিত্রের ন্যায় দুটি সমান্তরাল সরলরেখা ও এদের একটি ছেদক আঁক। দুই জোড়া অনুরূপ কোণ চিহ্নিত কর। প্রতিজোড়া অনুরূপ কোণ সমান কিনা যাচাই কর। সমান হয়েছে কি?

২। দুই জোড়া একান্তর কোণ চিহ্নিত কর। প্রতি জোড়া একান্তর কোণ সমান কিনা যাচাই কর। সমান হয়েছে কি?

৩। সমান্তরাল সরলরেখাদ্বয়ের ছেদকের একই পাশের অন্তঃস্থ কোণ দুটি পরিমাপ কর। কোণ দুটির পরিমাপের যোগফল বের কর। যোগফল তোমার সহপাঠীদের বের করা যোগফলের সাথে তুলনা কর। তোমাদের যোগফল 180° বা 180° সামান্য কম-বেশি হয়েছে কি?



কাজের ফলাফল পর্যালোচনা করে আমরা নিচের সিদ্ধান্তে উপনীত হই:

- দুটি সমান্তরাল সরলরেখার একটি ছেদক দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যেক অনুরূপ কোণ জোড়া সমান হবে।
- দুটি সমান্তরাল সরলরেখার একটি ছেদক দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যেক একান্তর কোণ জোড়া সমান হবে।
- দুটি সমান্তরাল সরলরেখার একটি ছেদক দ্বারা উৎপন্ন ছেদকের একই পাশের অন্তঃস্থ কোণ দুটি পরস্পর সম্পূরক।

সমান্তরাল সরলরেখার এই তিনটি ধর্ম (property) আলাদাভাবে প্রমাণ করা যায় না। এরা প্রত্যেকেই ইউক্লিডের ৫ম স্বীকার্যের বিভিন্ন রূপ। এদের যেকোনো একটিকে সমান্তরাল সরলরেখার সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করলে বাকি দুটি ধর্ম ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ, যদি এই তিনটি ধর্মের যেকোনো একটিকে সত্য ধরে অপর দুটি ধর্মকে ব্যাখ্যা করা যায়, তবে প্রথমে বিবেচিত সংজ্ঞাটিকে আমরা সঠিক বলে ধরে নিতে পারি।

সমান্তরাল সরলরেখার একটি ধর্ম: দুটি সমান্তরাল সরলরেখার একটি ছেদক দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যেক অনুরূপ কোণ জোড়া সমান-কে সত্য ধরে নিয়ে সমান্তরাল সরলরেখার আরেকটি ধর্মকে নিচে ব্যাখ্যা করা হলো।

দুটি সমান্তরাল সরলরেখার একটি ছেদক দ্বারা উৎপন্ন একান্তর কোণের সম্পর্ক:

উপপাদ্য ১

দুটি সমান্তরাল সরলরেখাকে একটি সরলরেখা ছেদ করলে একান্তর কোণ জোড়া সমান।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, $AB \parallel CD$ এবং PQ

ছেদক তাদের যথাক্রমে E ও F বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle AEF =$ একান্তর $\angle EFD$ ।

প্রমাণ :


ধাপ :

(১) $\angle PEB =$ অনুরূপ $\angle EFD$

(২) $\angle PEB =$ বিপ্রতীপ $\angle AEF$

$\therefore \angle AEF = \angle EFD$

[প্রমাণিত]



যথার্থতা

[সমান্তরাল রেখার সংজ্ঞানুসারে অনুরূপ কোণ সমান]

[বিপ্রতীপ কোণদ্বয় পরস্পর সমান]

[(১) ও (২) থেকে]

কাজ

১। প্রমাণ কর যে, দুটি সমান্তরাল সরলরেখার একটি ছেদক দ্বারা উৎপন্ন ছেদকের একই পাশের অন্তঃস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।


চিত্রে, $AB \parallel CD$ এবং PQ ছেদক তাদের যথাক্রমে E ও

F বিন্দুতে ছেদ করেছে।

সুতরাং, (ক) $\angle PEB =$ অনুরূপ $\angle EFD$

(খ) $\angle AEF =$ একান্তর $\angle EFD$


(গ) $\angle BEF + \angle EFD =$ দুই সমকোণ।



কাজ

১। একটি সরলরেখার উপর দুটি বিন্দু নাও। রেখাটির বিন্দু দুটিতে একই দিকে 60° এর সমান দুটি কোণ আঁকো। কোণদ্বয়ের অঙ্কিত বাহু দুটি সমান্তরাল কিনা যাচাই কর।

২।



চিত্রে ছেদক দ্বারা উৎপন্ন কোণগুলোর মান বের কর।

কাজের ফলাফল পর্যালোচনা করে আমরা নিচের সিদ্ধান্তে উপনীত হই:

- দুটি সরলরেখা অপর একটি সরলরেখাকে ছেদ করলে যদি অনুরূপ কোণগুলো পরস্পর সমান হয়, তবে ঐ সরলরেখা দুটি পরস্পর সমান্তরাল।
- দুটি সরলরেখা অপর একটি সরলরেখাকে ছেদ করলে যদি একান্তর কোণগুলো পরস্পর সমান হয়, তবে ঐ সরলরেখা দুটি পরস্পর সমান্তরাল।
- দুটি সরলরেখা অপর একটি সরলরেখাকে ছেদ করলে যদি ছেদকের একই পাশের অন্তঃস্থ কোণ দুটির সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হয়, তবে ঐ সরলরেখা দুটি পরস্পর সমান্তরাল।


চিত্রে, AB ও CD রেখাদ্বয়কে PQ রেখা যথাক্রমে E ও F বিন্দুতে ছেদ করেছে এবং

(ক) $\angle AEF =$ একান্তর $\angle EFD$

অথবা, (খ) $\angle PEB =$ অনুরূপ $\angle EFD$


অথবা, (গ) $\angle BEF + \angle EFD =$ দুই সমকোণ।

সুতরাং, AB ও CD রেখা দুটি পরস্পর সমান্তরাল।



অনুশীলনী ৮

- ১। চিত্রে, $\angle PQR = 55^\circ$, $\angle LRN = 90^\circ$ এবং $PQ \parallel MR$ হলে, $\angle MRN$ এর মান নিচের কোনটি?




ক. 35°

খ. 45°

গ. 55°

ঘ. 90°

- ২। চিত্রে, $PQ \parallel SR$, $PQ = PR$ এবং $\angle PRQ = 50^\circ$ হলে, $\angle LRS$ এর মান নিচের কোনটি?




ক. 80°

খ. 75°

গ. 55°

ঘ. 50°

- ৩। পাশের চিত্রে $AB \parallel CD \parallel EF$. প্রদত্ত তথ্যের আলোকে (i), (ii) ও (iii) নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



- (i) $\angle x$ এর মান নিচের কোনটি?

ক. 28°

খ. 32°

গ. 45°

ঘ. 58°

- (ii) $\angle z$ এর মান নিচের কোনটি?

ক. 58°

খ. 103°

গ. 122°

ঘ. 148°

(iii) নিচের কোনটি $y - z$ এর মান?

ক. 58°

খ. 77°

গ. 103°

ঘ. 122°

৪। \cong চিহ্ন দ্বারা কী বুঝায়?


(ক) সমান

(খ) সর্বসম

(গ) সমান্তরাল

(ঘ) লম্ব

নিচের চিত্রের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৫। $x =$ কত?

(ক) 75°

(খ) 55°

(গ) 50°

(ঘ) 45°

৬। $x + y =$ কত?

(ক) 160°

(খ) 125°

(গ) 100°


(ঘ) 85°

৭। চিত্রে, $AB \parallel CD$, $\angle BPE = 60^\circ$ এবং $PQ = PR$.

ক. দেখাও যে, $\frac{1}{2} \angle APE = 60^\circ$

খ. $\angle CQF$ এর মান বের করো।

গ. প্রমাণ করো যে, PQR একটি সমবাহু ত্রিভুজ।



নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ABC ত্রিভুজে $\angle B + \angle C = 90^\circ$ হলে, $\angle A =$ কত ডিগ্রি?

(ক) 90°

(খ) 110°

(গ) 120°

(ঘ) 160°

- ২। পাশের চিত্রে, $AB \parallel CD$ এবং PQ রেখাংশ AB ও CD কে যথাক্রমে R ও S বিন্দুতে ছেদ করেছে। চিত্রানুসারে—

i. $\angle PRB$ এর অনুরূপ $\angle RSD$

ii. $\angle ARS$ এর একান্তর $\angle RSD$

iii. $\angle CSQ + \angle CSR = 180^\circ$


নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii



পাশের চিত্রে $AB \parallel CD$ । এই তথ্যের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।


- ৩। $\angle PEA =$ কত ডিগ্রি?

(ক) 40°

(খ) 50°

(গ) 90°

(ঘ) 130°



- ৪। $\angle EFD$ এর মান কত?

(ক) 30°

(খ) 40°

(গ) 50°

(ঘ) 90°


সৃজনশীল প্রশ্ন

- ৫। চিত্রে, $PQ \parallel RS$ এবং AB তাদের ছেদক।

(ক) $\angle x$ -এর পূরক কোণ 25° হলে, $\angle x$ নির্ণয় করো।

(খ) প্রমাণ করো যে, $\angle PEF = \angle EFS$ ।

(গ) দেখাও যে, $\angle PEF + \angle EFR = 180^\circ$



সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ৬। (ক) BC ও DE দুটি সমান্তরাল সরলরেখাকে PQ রেখাংশ যথাক্রমে L ও M বিন্দুতে ছেদ করে। চিত্র অঙ্কন করে L ও M বিন্দুতে উৎপন্ন একজোড়া একান্তর কোণ প্রকাশ করো।
 (খ) PQ সরলরেখাকে AB রেখাংশ B বিন্দুতে ছেদ করলে, চিত্র অঙ্কন করে ছেদবিন্দুতে উৎপন্ন সন্নিহিত কোণদ্বয় প্রকাশ করো।
 (গ) AC ও BD দুটি সমান্তরাল সরলরেখাকে LM রেখাংশ যথাক্রমে P ও Q বিন্দুতে ছেদ করলে চিত্র অঙ্কন করে LM ছেদকের ডানপাশে অবস্থিত অন্তঃস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি নির্ণয় করো।

নবম অধ্যায়

ত্রিভুজ


আমরা জেনেছি, তিনটি রেখাংশ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের সীমারেখাকে ত্রিভুজ বলা হয় এবং রেখাংশগুলোকে ত্রিভুজের বাহু বলে। যেকোনো দুটি বাহুর সাধারণ বিন্দুকে শীর্ষবিন্দু বলা হয়। দুটি বাহু শীর্ষবিন্দুতে যে কোণ উৎপন্ন করে তা ত্রিভুজের একটি কোণ। ত্রিভুজের তিনটি বাহু ও তিনটি কোণ আছে। বাহুভেদে ত্রিভুজ তিন প্রকার: সমবাহু, সমদ্বিবাহু ও বিষমবাহু। আবার কোণভেদেও ত্রিভুজ তিন প্রকার: সূক্ষ্মকোণী, স্থূলকোণী ও সমকোণী। ত্রিভুজের বাহু তিনটির দৈর্ঘ্যের সমষ্টিকে ত্রিভুজের পরিসীমা বলা হয়। এর আলোকে ত্রিভুজের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং ত্রিভুজ সংক্রান্ত মৌলিক উপপাদ্য ও অঙ্কন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা –

- ত্রিভুজের অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ কোণ বর্ণনা করতে পারবে;
- ত্রিভুজের মৌলিক উপপাদ্যগুলো প্রমাণ করতে পারবে;
- বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে ত্রিভুজ আঁকতে পারবে;
- ত্রিভুজের বাহু ও কোণের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যবহার করে জীবনভিত্তিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে;
- ত্রিভুজক্ষেত্রের ভূমি ও উচ্চতা মেপে ক্ষেত্রফল পরিমাপ করতে পারবে।

৯.১ ত্রিভুজের মধ্যমা


পাশের চিত্রে, ABC একটি ত্রিভুজ। A, B, C ত্রিভুজটির তিনটি শীর্ষবিন্দু। AB, BC, CA ত্রিভুজটির তিনটি বাহু এবং $\angle A, \angle B, \angle C$ তিনটি কোণ। ত্রিভুজটির যেকোনো একটি বাহু BC এর মধ্যবিন্দু D নির্ণয় করি এবং D হতে বিপরীত শীর্ষবিন্দু A পর্যন্ত রেখাংশ আঁকি। AD , ABC ত্রিভুজের একটি মধ্যমা।



ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দু পর্যন্ত অঙ্কিত রেখাংশ মধ্যমা।


৯.২ ত্রিভুজের উচ্চতা

পাশের চিত্রে, ABC একটি ত্রিভুজ। A শীর্ষবিন্দু হতে বিপরীত বাহু BC এর লম্ব দূরত্বই ত্রিভুজের উচ্চতা। A হতে BC এর উপর লম্ব AM অঙ্কন করি। AM , ABC ত্রিভুজের উচ্চতা। এভাবে প্রত্যেক শীর্ষবিন্দু হতে ত্রিভুজের উচ্চতা নির্ণয় করা যায়।



৯.৩ ত্রিভুজের বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ কোণ

কোনো ত্রিভুজের একটি বাহু বর্ধিত করলে যে কোণ উৎপন্ন হয় তা ত্রিভুজটির একটি বহিঃস্থ কোণ। এই কোণের সন্নিহিত কোণটি ছাড়া ত্রিভুজের অপর দুটি কোণকে এই বহিঃস্থ কোণের বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ বলা হয়। পাশের চিত্রে, $\triangle ABC$ এর BC বাহুকে D পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। $\angle ACD$ ত্রিভুজটির একটি বহিঃস্থ কোণ। $\angle ABC$, $\angle BAC$ ও $\angle ACB$ ত্রিভুজটির তিনটি অন্তঃস্থ কোণ। $\angle ACB$ কে $\angle ACD$ এর পরিপ্রেক্ষিতে সন্নিহিত অন্তঃস্থ কোণ বলা হয়। $\angle ABC$ ও $\angle BAC$ এর প্রত্যেককে $\angle ACD$ এর বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ বলা হয়।



কাজ


- ১। ত্রিভুজের কয়টি মধ্যমা? কয়টি উচ্চতা?
- ২। মধ্যমা ও উচ্চতা কি সর্বদাই ত্রিভুজের অভ্যন্তরে থাকবে?
- ৩। একটি ত্রিভুজ আঁকো, যার উচ্চতা ও মধ্যমা একই রেখাংশ।

৯.৪ ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল


কোণগুলোকে নিয়ে ত্রিভুজের একটি অসাধারণ ধর্ম রয়েছে। নিচের তিনটি কাজ করি এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ করি।

কাজ :

- ১। একটি ত্রিভুজ আঁকো। এর কোণ তিনটি কেটে চিত্র (ii) এর ন্যায় সাজাও। তিনটি কোণ মিলে এখন একটি কোণ হলো। কোণটি সরল কোণ এবং এর পরিমাপ 180° । ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি 180° ।




(i)




(ii)

২। একটি ত্রিভুজ আঁকো এবং এর অনুরূপ আরও দুটি ত্রিভুজ আঁক। ত্রিভুজ তিনটি চিত্রের মত করে সাজাও। কোণ তিনটি একত্রে সরল কোণ তৈরি করে কি?




৩। খাতায় তোমার পছন্দ মতো তিনটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো। চাঁদার সাহায্যে প্রতিটি ত্রিভুজের কোণগুলো পরিমাপ করো। এবং নিচের সারণিটি পূরণ করো। (একটি করে দেখানো হলো)

ত্রিভুজ	কোণের পরিমাপ	কোণগুলোর যোগফল
$\triangle ABC$ এ 	$\angle A = 60^\circ,$ $\angle B = 65^\circ,$ $\angle C = 55^\circ,$	$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

প্রতিটি ক্ষেত্রে কোণ তিনটির যোগফল মোটামুটি 180° হয়েছে কি?

উপপাদ্য ১। ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ABC একটি ত্রিভুজ।

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle BAC + \angle ABC + \angle ACB =$ দুই সমকোণ।

অঙ্কন : BC বাহুকে D পর্যন্ত বর্ধিত করি এবং BA রেখার সমান্তরাল করে CE রেখা আঁকি।

ফর্মা নং-১৭, গণিত-৭ম শ্রেণি, দাখিল

প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
(১) $\angle BAC = \angle ACE$	[$BA \parallel CE$ এবং AC রেখা তাদের ছেদক] [\therefore একান্তর কোণ দুটি সমান]]
(২) $\angle ABC = \angle ECD$	[$BA \parallel CE$ এবং BD রেখা তাদের ছেদক] [\therefore অনুবৃত্ত কোণ দুটি সমান]]
(৩) $\angle BAC + \angle ABC = \angle ACE + \angle ECD = \angle ACD$	
(৪) $\angle BAC + \angle ABC + \angle ACB = \angle ACD + \angle ACB$	[উভয়পক্ষে $\angle ACB$ যোগ করে]
(৫) $\angle ACD + \angle ACB =$ দুই সমকোণ	[সরল কোণ উপপাদ্য]
$\therefore \angle BAC + \angle ABC + \angle ACB =$ দুই সমকোণ ।	[প্রমাণিত]

অনুসিদ্ধান্ত ১। ত্রিভুজের একটি বাহুকে বর্ধিত করলে যে বহিঃস্থ কোণ উৎপন্ন হয়, তা এর বিপরীত অন্তঃস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টির সমান।


অনুসিদ্ধান্ত ২। ত্রিভুজের একটি বাহুকে বর্ধিত করলে যে বহিঃস্থ কোণ উৎপন্ন হয়, তা এর অন্তঃস্থ বিপরীত কোণ দুটির প্রত্যেকটি অপেক্ষা বৃহত্তর।

অনুসিদ্ধান্ত ৩। সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয় পরস্পর পূরক।

অনুসিদ্ধান্ত ৪। সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটি কোণের পরিমাপ 60° ।

অনুশীলনী ৯.১

১। $\angle ABD$, $\angle CBD$ এবং $\angle BCD$ এর মান নির্ণয় করো।



২। একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুতে অবস্থিত কোণটির মান 50° । অবশিষ্ট কোণ দুটির মান নির্ণয় করো।


৩। প্রমাণ কর যে, চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি চার সমকোণের সমান।

৪। $\triangle ABC$ -এর $AC \perp BC$; E , AC এর বর্ধিতাংশের উপর যেকোনো বিন্দু এবং $ED \perp AB$
 ED এবং BC পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ করো যে, $\angle CEO = \angle DBO$

৯.৫ ত্রিভুজের বাহু ও কোণের সম্পর্ক

পাশের চিত্রে ABC একটি ত্রিভুজ। ত্রিভুজটির তিনটি বাহু AB, BC, CA এবং তিনটি কোণ হলো $\angle ABC$ (সংক্ষেপে $\angle B$), $\angle BCA$ (সংক্ষেপে $\angle C$) এবং $\angle BAC$ (সংক্ষেপে $\angle A$)। সাধারণত $\angle A$, $\angle B$ ও $\angle C$ এর বিপরীত বাহুগুলোকে যথাক্রমে a, b ও c দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore BC = a, CA = b \text{ এবং } AB = c$$




ত্রিভুজের বাহু ও কোণের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। বিষয়টি বোঝার জন্য নিচের কাজটি কর।

কাজ

১। যেকোনো একটি কোণ আঁকো। কোণটির শীর্ষবিন্দু থেকে উভয় বাহুতে সমান দূরত্বে দুটি বিন্দু চিহ্নিত কর। বিন্দু দুটি যুক্ত করো। একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত হলো। চাঁদার সাহায্যে ভূমি সংলগ্ন কোণ দুটি পরিমাপ কর। কোণ দুটি কি সমান?

যদি কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহু পরস্পর সমান হয়, তবে এদের বিপরীত কোণ দুটিও পরস্পর সমান। পরবর্তী অধ্যায়ে এই প্রতিজ্ঞাটির যুক্তিমূলক প্রমাণ করা হবে। অর্থাৎ, ABC ত্রিভুজে $AB = AC$ হলে, $\angle ABC = \angle ACB$ হবে। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের এ বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন যুক্তিমূলক প্রমাণে প্রয়োগ করা হয়।



কাজ

১। যেকোনো তিনটি ত্রিভুজ আঁক। রুলারের সাহায্যে প্রতিটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য ও চাঁদার সাহায্যে তিনটি কোণ পরিমাপ কর এবং নিচের সারণিটি পূরণ কর।

ত্রিভুজ	বাহুর পরিমাপ	কোণের পরিমাপ	বাহুর তুলনা	কোণের তুলনা
<p>$\triangle ABC$ এ</p>	AB = 3cm BC = 4cm CA = 6cm	A = 60° B = 75° C = 45°	AC > BC > AB বা AB < BC < AC	$\angle B > \angle A > \angle C$ বা $\angle C < \angle A < \angle B$

প্রতিটি ক্ষেত্রে যেকোনো দুটি বাহু ও এদের বিপরীত কোণগুলো তুলনা কর। এ থেকে কী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়?

উপপাদ্য ২


কোনো ত্রিভুজের একটি বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হলে, বৃহত্তর বাহুর বিপরীত কোণ ক্ষুদ্রতর বাহুর বিপরীত কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হবে।

বিশেষ নির্বচন: মনে করি, $\triangle ABC$ - এ $AC > AB$

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle ABC > \angle ACB$

অঙ্কন : AC থেকে AB এর সমান করে

AD অংশ কাটি এবং B, D যোগ করি।




প্রমাণ:

ধাপ	যথার্থতা
(১) $\triangle ABD$ - এ $AB = AD$ $\therefore \angle ADB = \angle ABD$	[সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোণদ্বয় সমান।]
(২) $\triangle BDC$ - এ বহিঃস্থ $\angle ADB > \angle BCD$ $\therefore \angle ABD > \angle BCD$ বা $\angle ABD > \angle ACB$	[ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণ বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ দুটির প্রত্যেকটি অপেক্ষা বৃহত্তর]
(৩) $\angle ABC > \angle ABD$ সুতরাং, $\angle ABC > \angle ACB$ (প্রমাণিত)।	[$\angle ABD$ কোণটি $\angle ABC$ এর একটি অংশ]

উপপাদ্য ৩

কোনো ত্রিভুজের একটি কোণ অপর একটি কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হলে, বৃহত্তর কোণের বিপরীত বাহু ক্ষুদ্রতর কোণের বিপরীত বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর।

বিশেষ নির্বচন: মনে করি, $\triangle ABC$ এর $\angle ABC > \angle ACB$ প্রমাণ করতে হবে যে, $AC > AB$ প্রমাণ:	
ধাপ	যথার্থতা
(১) যদি AC বাহু AB বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর না হয়, তবে (i) $AC = AB$ অথবা (ii) $AC < AB$ হবে।	
(i) যদি $AC = AB$ হয়, তবে $\angle ABC = \angle ACB$ কিন্তু শর্তানুযায়ী $\angle ABC > \angle ACB$ তা প্রদত্ত শর্তবিরোধী।	[সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোণদ্বয় সমান]
(ii) আবার, যদি $AC < AB$ হয়, তবে $\angle ABC < \angle ACB$ হবে। কিন্তু তা-ও প্রদত্ত শর্তবিরোধী। $\therefore AB \neq AC$ এবং $AC \neq AB$ $\therefore AC > AB$ (প্রমাণিত)।	[ক্ষুদ্রতর বাহুর বিপরীত কোণ ক্ষুদ্রতর]

৯.৬ ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের যোগফল


ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টির সাথে তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক রয়েছে। সম্পর্কটি অনুধাবনের জন্য দলগতভাবে নিচের কাজটি করো।

কাজ

১। ১৫টি বিভিন্ন মাপের কাঠি জোগাড় কর। এদের যেকোনো তিনটি দিয়ে একটি ত্রিভুজ তৈরি করার চেষ্টা কর।

তোমরা কি প্রতিবারই ত্রিভুজ তৈরি করতে পারছো? কখন পারছো না তার ব্যাখ্যা দাও।

২। যেকোনো তিনটি ত্রিভুজ ΔABC , ΔPQR ও ΔXYZ আঁক।



ত্রিভুজ	তিন বাহুর দৈর্ঘ্য	সত্য কিনা	সত্য/মিথ্যা
ΔABC	$AB =$ $BC =$ $CA =$	$AB + BC < CA$ $BC + CA < AB$ $CA + AB < BC$ $— + — > —$	
ΔPQR	$PQ =$ $QR =$ $RP =$	$PQ + QR < RP$ $QR + RP < PQ$ $RP + PQ < QR$ $— + — > —$	
ΔXYZ	$XY =$ $YZ =$ $ZX =$	$XY + YZ < ZX$ $YZ + ZX < XY$ $ZX + XY < YZ$ $— + — > —$	

ঝুলারের সাহায্যে ত্রিভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য মাপ এবং উপরের সারণিটি পূরণ কর।

লক্ষ করি, যেকোনো ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের যোগফল এর তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বেশি। আমরা আরও লক্ষ করি, যেকোনো ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের বিয়োগফল এর তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম।

কাজ : নিচের কোন ক্ষেত্রে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব- ব্যাখ্যা দাও।

- ১। ১ সেমি, ২ সেমি ও ৩ সেমি
- ২। ১ সেমি, ২ সেমি ও ৪ সেমি
- ৩। ৪ সেমি, ৩ সেমি ও ৫ সেমি

উপপাদ্য ৪

ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি এর তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বৃহত্তর।


বিশেষ নির্বচন: ধরি, ΔABC -এ BC বৃহত্তম বাহু। প্রমাণ

করতে হবে যে $(AB+AC) > BC$

অঙ্কন : BA কে D পর্যন্ত বর্ধিত করি, যেন

$AD = AC$ হয়। C, D যোগ করি।


প্রমাণ :



ধাপ	যথার্থতা
(১) ΔADC -এ $AD = AC$ $\therefore \angle ACD = \angle ADC \therefore \angle ACD = \angle BDC$	[সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোণদ্বয় সমান]
(২) $\angle BCD > \angle ACD$ $\therefore \angle BCD > \angle BDC$	[কারণ $\angle ACD, \angle BCD$ এর একটি অংশ]
(৩) ΔBCD এ $\angle BCD > \angle BDC$ $\therefore BD > BC$	[বৃহত্তর কোণের বিপরীত বাহু বৃহত্তর]
(৪) কিন্তু $BD = AB + AD = AB + AC$ $\therefore (AB + AC) > BC$ (প্রমাণিত)	[যেহেতু $AC = AD$]

অনুশীলনী ৯.২

নিচের তথ্যের ভিত্তিতে ১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্রে, $CE, \angle ACD$ এর সমদ্বিখণ্ডক। $AB \parallel CE$ এবং $\angle ECD = 60^\circ$

- ১। $\angle BAC$ এর মান নিচের কোনটি?
 ক. 30° খ. 45° গ. 60° ঘ. 120°
- ২। $\angle ACD$ এর মান নিচের কোনটি?
 ক. 60° খ. 90° গ. 120° ঘ. 180°
- ৩। $\triangle ABC$ কোন ধরনের ত্রিভুজ?
 ক. স্তূলকোণী খ. সমদ্বিবাহু গ. সমবাহু ঘ. সমকোণী
- ৪। একটি ত্রিভুজের দুটি বাহু যথাক্রমে ৫ সে.মি. এবং ৪ সে.মি. ত্রিভুজটির অপর বাহুটি নিচের কোনটি হতে পারে?
 ক. ১ সে.মি. খ. ৪ সে.মি. গ. ৯ সে.মি. ঘ. ১০ সে.মি.
- ৫। সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের একটি 40° হলে, অপর সূক্ষ্মকোণের মান নিচের কোনটি?
 ক. 40° খ. 50° গ. 60° ঘ. 140°
- ৬। কোনো ত্রিভুজের একটি কোণ অপর দুটি কোণের সমষ্টির সমান হলে, ত্রিভুজটি কী ধরনের হবে?
 ক. সমবাহু খ. সূক্ষ্মকোণী গ. সমকোণী ঘ. স্তূলকোণী
- ৭। $\triangle ABC$ -এ $AB > AC$ এবং $\angle B$ ও $\angle C$ এর সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় পরস্পর P বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ করো যে, $PB > PC$
- ৮। ABC একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এবং এর $AB = AC$; BC কে যেকোনো দূরত্বে D পর্যন্ত বাড়ানো হলো। প্রমাণ করো যে, $AD > AB$
- ৯। $ABCD$ চতুর্ভুজে $AB = AD$, $BC = CD$ এবং $CD > AD$
 প্রমাণ করো যে, $\angle DAB > \angle BCD$
- ১০। $\triangle ABC$ এ $\angle ABC > \angle ACB$. D , BC বাহুর মধ্যবিন্দু।
 (ক) তথ্যের আলোকে চিত্রটি অঙ্কন করো।
 (খ) দেখাও যে, $AC > AB$
 (গ) প্রমাণ করো যে, $AB + AC > 2AD$
- ১১। $\triangle ABC$ - এ $AB = AC$ এবং D , BC -এর উপর একটি বিন্দু। প্রমাণ করো যে, $AB > AD$
- ১২। $\triangle ABC$ - এ $AB \perp AC$ এবং D , AC -এর উপর একটি বিন্দু। প্রমাণ করো যে, $BC > BD$

১৩। প্রমাণ করো যে, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজই বৃহত্তম বাহু।


১৪। প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের বৃহত্তম বাহুর বিপরীত কোণ বৃহত্তম।

১৫। চিত্রে, $\angle QPM = \angle RPM$ এবং $\angle QPR = 90^\circ$ । $PQ = 6$ সে.মি.

ক. $\angle QPM$ এর মান নির্ণয় করো।

খ. $\angle PQM$ ও $\angle PRM$ এর মান কত?

গ. PR এর মান নির্ণয় করো।



৯.৭ ত্রিভুজ অঙ্কন

প্রত্যেক ত্রিভুজের ছয়টি অংশ আছে; তিনটি বাহু এবং তিনটি কোণ। ত্রিভুজের এই ছয়টি অংশের কয়েকটি অপর একটি ত্রিভুজের অনুরূপ অংশের সমান হলে দুটি ত্রিভুজ সর্বসম হতে পারে। সুতরাং কেবল ঐ অংশগুলো দেওয়া থাকলে ত্রিভুজটির আকার নির্দিষ্ট হয় এবং ত্রিভুজটি আঁকা যায়। নিচের উপাত্তগুলো জানা থাকলে একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজ সহজেই আঁকা যায়:

- (১) তিনটি বাহু
- (২) দুটি বাহু ও এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ
- (৩) একটি বাহু ও এর সংলগ্ন দুটি কোণ
- (৪) দুটি কোণ ও এর একটির বিপরীত বাহু
- (৫) দুটি বাহু ও এর একটির বিপরীত কোণ
- (৬) সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ও অপর একটি বাহু অথবা কোণ।

সম্পাদ্য ১

কোনো ত্রিভুজের তিনটি বাহু দেওয়া আছে, ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

মনে করি, একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু a, b, c দেওয়া

আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।


a _____
 b _____
 c _____

অঙ্কন :


(১) যেকোনো রশ্মি BD থেকে a এর সমান করে BC কেটে নিই।



(২) B ও C বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে c এবং b এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে BC এর একই পাশে দুটি বৃত্তচাপ আঁকি। বৃত্তচাপ দুটি পরস্পর A বিন্দুতে ছেদ করে।



(৩) A, B এবং A, C যোগ করি।
তাহলে $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।




প্রমাণ : অঙ্কনানুসারে, $\triangle ABC$ এ $BC = a$, $AC = b$
এবং $AB = c$.

$\therefore \triangle ABC$ প্রদত্ত বাহুযুক্ত ত্রিভুজ।

কাজ

১। ৪ সে.মি., ৫ সে.মি. ও ৬ সে.মি দৈর্ঘ্যের তিনটি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো।

২। ১২ সে.মি., ৫ সে.মি. ও ৬ সে.মি দৈর্ঘ্যের তিনটি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কনের চেষ্টা করো।



তোমার চেষ্টা সফল হয়েছে কি?

মন্তব্য : ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি এর তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর। তাই প্রদত্ত বাহুগুলো এমন হতে হবে যে, যেকোনো দুটির দৈর্ঘ্যের সমষ্টি তৃতীয়টির দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বৃহত্তর হয়। তাহলেই ত্রিভুজটি আঁকা সম্ভব হবে।

ফর্মা নং-১৮, গণিত-৭ম শ্রেণি, দাখিল

সম্পাদ্য ২

কোনো ত্রিভুজের দুইটি বাহু ও এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ দেওয়া আছে, ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

মনে করি, একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু a ও b এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle x$ দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

(১) যেকোনো রশ্মি BD থেকে a এর সমান করে BC নিই।



(২) BC রেখাংশর C বিন্দুতে প্রদত্ত $\angle x$ এর সমান $\angle BCE$ আঁকি।

(৩) CE রেখাংশ থেকে b এর সমান করে CA নিই।
 A, B যোগ করি। তাহলে $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

প্রমাণ : অঙ্কন অনুসারে,

$\triangle ABC$ - এ $BC = a, CA = b$ এবং $\angle ACB = \angle x$.

$\therefore \triangle ABC$ -ই নির্দিষ্ট ত্রিভুজ।



সম্পাদ্য ৩

কোনো ত্রিভুজের একটি বাহু ও এর সংলগ্ন দুটি কোণ দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

মনে করি, একটি ত্রিভুজের একটি বাহু a এবং এর সংলগ্ন দুটি কোণ $\angle x$ ও $\angle y$ দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

(১) যেকোনো রশ্মি BD থেকে a এর সমান করে BC নিই।

(২) BC রেখাংশের B ও C বিন্দুতে যথাক্রমে $\angle x$ এবং $\angle y$ এর সমান করে যথাক্রমে $\angle CBE$ এবং $\angle BCF$ আঁকি।


BE ও CF পরস্পর A বিন্দুতে ছেদ করে।

তাহলে $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

প্রমাণ : অঙ্কন অনুসারে,

$\triangle ABC$ - এ $BC = a, \angle ABC = \angle x$ এবং $\angle ACB = \angle y$.

$\therefore \triangle ABC$ -ই নির্দিষ্ট ত্রিভুজ।



মন্তব্য : ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান, তাই প্রদত্ত কোণ দুটি এমন হতে হবে যেন এদের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা ছোটো হয়। এই শর্ত পালন করা না হলে কোনো ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব হবে না।

কাজ

১। ৭ সে.মি. দৈর্ঘ্যের বাহু ও 50° ও 60° কোণবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো।

২। ৬ সে.মি. দৈর্ঘ্যের বাহু ও 140° ও 70° কোণবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কনের চেষ্টা করো। তোমার চেষ্টা সফল হয়েছে কি? কেন ব্যাখ্যা করো।


সম্পাদ্য ৪

কোনো ত্রিভুজের দুইটি কোণ এবং এদের একটির বিপরীত বাহু দেওয়া আছে, ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।


মনে করি, একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ $\angle A$ ও $\angle B$ এবং $\angle A$ এর বিপরীত বাহু a দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

(১) যেকোনো রশ্মি BD থেকে a এর সমান করে BC নিই।




(২) BC রেখাংশের B ও C বিন্দুতে $\angle B$ এর সমান করে $\angle CBF$ ও $\angle DCE$ আঁকি।



(৩) এখন CE রেখার C বিন্দুতে $\angle A$ এর সমান করে $\angle ECG$ আঁকি। CG ও BF রেখা A বিন্দুতে ছেদ করে।

\therefore ত্রিভুজ ABC ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।



প্রমাণ : অঙ্কনানুসারে, $\angle ABC = \angle ECD$. এই কোণ দুটি

অনুরূপ বলে $BF \parallel CE$ বা $BA \parallel CE$ ।

এখন $BA \parallel CE$ এবং AC এদের ছেদক।

$\therefore \angle BAC =$ একান্তর $\angle ACE = \angle A$.

এখন $\triangle ABC$ এ $\angle BAC = \angle A$, $\angle ABC = \angle B$ এবং

$BC = a$. সুতরাং, ABC ত্রিভুজটি শর্তমতে অঙ্কিত হলো।

সম্পাদ্য ৫

কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহু এবং এদের একটির বিপরীত কোণ দেওয়া আছে, ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।


মনে করি, একটি ত্রিভুজের দুটি বাহু b ও c এবং b বাহুর বিপরীত কোণ $\angle B$ দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন:

(১) যেকোনো রশ্মি BD আঁকি।

(২) B বিন্দুতে প্রদত্ত $\angle B$ এর সমান করে $\angle DBE$ আঁকি। BE রেখা থেকে c এর সমান করে BA নিই।

(৩) এখন A বিন্দুকে কেন্দ্র করে b এর দৈর্ঘ্যের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে BD রেখার উপর একটি বৃত্তচাপ আঁকি। বৃত্তচাপটি BD রেখাকে C ও C' বিন্দুতে ছেদ করে। A, C এবং A, C' যোগ করি। তাহলে $\triangle ABC$ এবং $\triangle ABC'$ -উভয় ত্রিভুজ প্রদত্ত শর্ত পূরণ করে অঙ্কিত।



প্রমাণ : অঙ্কনানুসারে, $\triangle ABC$ - এ $BA = c$, $AC = b$ এবং $\angle ABC = \angle B$

আবার, $\triangle ABC'$ - এ $BA = c$, $AC' = b$ এবং $\angle ABC' = \angle B$

দেখা যায়, $\triangle ABC$ এবং $\triangle ABC'$ উভয়ই প্রদত্ত শর্তসমূহ পূরণ করে।

তাহলে $\triangle ABC$ বা $\triangle ABC'$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

সম্পাদ্য ৬

কোনো সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ও অপর একটি বাহু দেওয়া আছে, ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

মনে করি, একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ a ও
অপর এক বাহু b দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।




অঙ্কন :

(১) যেকোনো রশ্মি BD থেকে b এর সমান করে
 BC নিই।




(২) BC রেখার B বিন্দুতে BE লম্ব আঁকি।



(৩) C কে কেন্দ্র করে a এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে BE
রেখার উপর একটি বৃত্তচাপ আঁকি, যেন এটি BE -কে
 A বিন্দুতে ছেদ করে। A ও C যোগ করি।

তাহলে $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।



প্রমাণ : অঙ্কনানুসারে, $AC = a$, $BC = b$ এবং $\angle ABC =$
এক সমকোণ।

$\therefore \triangle ABC$ -ই নির্ণেয় ত্রিভুজ।

অনুশীলনী ৯.৩

১। কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহু এবং এদের একটি বিপরীত কোণ দেওয়া থাকলে, সর্বাধিক কয়টি
ত্রিভুজ আঁকা যাবে?

ক. 1 খ. 2 গ. 3 ঘ. 4

২। কোন ক্ষেত্রে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব যখন তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য -


ক. 1 সে.মি., 2 সে.মি. 3 সে.মি. খ. 3 সে.মি., 4 সে.মি. 5 সে.মি.
গ. 2 সে.মি., 4 সে.মি. 6 সে.মি. ঘ. 3 সে.মি., 4 সে.মি. 7 সে.মি.

৩। ত্রিভুজের বাহু তিনটির দৈর্ঘ্যের সমষ্টিকে কি বলে?

(ক) ক্ষেত্রফল (খ) আয়তন
(গ) দৈর্ঘ্য (ঘ) পরিসীমা

- ৪। ত্রিভুজের অন্তঃস্থ কোণ কয়টি?
 (ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি
- ৫। একটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি কোণ 60° হলে অপর কোনটি কত ডিগ্রি?
 (ক) 30° (খ) 60° (গ) 90° (ঘ) 180°
- ৬। একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকো।
 (ক) ৩ সে.মি., ৪ সে.মি., ৬ সে.মি (খ) ৩.৫ সে.মি., ৪.৭ সে.মি., ৫.৬ সে.মি
- ৭। একটি ত্রিভুজের দুটি বাহু ও এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকো।
 (ক) ৩ সে.মি., ৪ সে.মি., 60° (খ) ৩.৮ সে.মি., ৪.৭ সে.মি., 45°
- ৮। একটি ত্রিভুজের একটি বাহু ও এর সংলগ্ন দুটি কোণ দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকো।
 (ক) ৫ সে.মি., 30° , 45° (খ) ৪.৫ সে.মি., 45° , 60°
- ৯। একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ ও প্রথম কোণের বিপরীত বাহু দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকো।
 (ক) 120° , 30° , ৫ সে.মি. (খ) 60° , 30° , ৪ সে.মি.
- ১০। একটি ত্রিভুজের দুটি বাহু ও প্রথম বাহুর বিপরীত কোণ দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকো।
 (ক) ৫ সে.মি., ৬ সে.মি., 60° (খ) ৪ সে.মি., ৫ সে.মি., 30°
- ১১। একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ও অপর একটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকো।
 (ক) ৭ সে.মি., ৪ সে.মি. (খ) ৪ সে.মি., ৩ সে.মি.
- ১২। একটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি বাহু ৫ সে.মি. এবং একটি সূক্ষ্মকোণ 45° দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁক।
- ১৩। একই সরলরেখায় অবস্থিত নয় এমন তিনটি বিন্দু A , B ও C .
 ক. বিন্দু তিনটি দিয়ে একটি ত্রিভুজ আঁকো।
 খ. অঙ্কিত ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু থেকে ভূমির ওপর লম্ব আঁকো।
 গ. অঙ্কিত ত্রিভুজের ভূমি যে সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের অতিভুজ হয়, ঐ ত্রিভুজটি আঁকো।
- ১৪। একটি ত্রিভুজের দুটি বাহু $a = 3$ সে.মি., $b = 4$ সে.মি. এবং একটি কোণ $\angle B = 30^\circ$
 ক. $\angle B$ এর সমান একটি কোণ আঁকো।
 খ. একটি ত্রিভুজ আঁকো, যার দুই বাহু a ও b এর সমান এবং অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle B$ এর সমান হয়।
 গ. এমন একটি ত্রিভুজ আঁকো, যার একটি বাহু b এবং $\angle B$ এর বিপরীত বাহু $2a$ হয়।

- ১৫। পাশের চিত্রটি লক্ষ্য করো এবং
নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।




- ক. সঠিক পরিমাপে ABC ত্রিভুজটি আঁকো।
খ. অতিভুজের পরিমাণ সেন্টিমিটারে নির্ণয় কর এবং $\angle ACB$ এর সমান করে একটি কোণ আঁকো।
গ. একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকো, যার অতিভুজ চিত্রে অঙ্কিত ত্রিভুজের অতিভুজ অপেক্ষা ২ সে.মি. বড় এবং একটি কোণ, $\angle ACB$ এর সমান হয়।
- ১৬। AB ও CD দুটি সমান্তরাল সরলরেখা। PQ রেখাটি AB ও CD রেখাকে যথাক্রমে E ও F বিন্দুতে ছেদ করেছে।
- (ক) বর্ণনা অনুযায়ী চিত্র অঙ্কন করো।
(খ) দেখাও যে, $\angle AEP = \angle CFE$
(গ) দেখাও যে, $\angle AEF + \angle CFE = 2$ সমকোণ

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটি কোণ কত ডিগ্রি?
(ক) 30° (খ) 45°
(গ) 60° (ঘ) 90°
- ২। একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করা যাবে যদি—
i. এর তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে
ii. এর তিনটি কোণ দেওয়া থাকে
iii. এর দুটি বাহু এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ দেওয়া থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii* (গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

পাশের চিত্র অনুসারে নিচের ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



- ৩। C বিন্দুতে BA রেখার সমান্তরাল রেখা আঁকতে হলে, কোন কোণের সমান কোণ আঁকতে হবে?
 (ক) $\angle ABC$ (খ) $\angle ACB$ (গ) $\angle BAC$ (ঘ) $\angle CAD$
- ৪। $\angle CAD$ এর সমান নিচের কোনটি?
 (ক) $\angle BAC + \angle ACB$ (খ) $\angle ABC + \angle ACB$
 (গ) $\angle ABC + \angle ACB + \angle BAC$ (ঘ) $\angle ABC + \angle BAC$

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ৫। একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য $a = 4$ সে.মি., $b = 5$ সে.মি., $c = 6$ সে.মি.
 (ক) b -কে বাহু ধরে একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করো।
 (খ) চিহ্ন ও বিবরণসহ a, b ও c -কে কোনো ত্রিভুজের তিনটি বাহু ধরে ত্রিভুজটি অঙ্কন করো।
 (গ) a ও b -কে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন দুটি বাহু ধরে চিহ্ন ও বিবরণসহ ত্রিভুজটি অঙ্কন করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ৬। (ক) সমবাহু $\triangle ABC$ -এর BC বাহুকে D বিন্দু পর্যন্ত বর্ধিত করা হলে, $\angle ACD$ -এর মান নির্ণয় করো।
 (খ) $\triangle ABC$ এর $AB > BC > AC$ হলে, কোণগুলোকে মানের নিম্নক্রমে সাজাও।
 (গ) রুলার কম্পাস ব্যবহার করে ৩ সে.মি., ৪ সে.মি. ও ৫ সে.মি. বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো।

দশম অধ্যায়

সর্বসমতা ও সদৃশতা


আমাদের চারদিকে বিভিন্ন আকৃতি ও আকারের বস্তু দেখতে পাই। এদের কিছু ছব্ব সমান, আবার কিছু দেখতে একই রকম, কিন্তু সমান নয়। তোমাদের শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের গণিত পাঠ্যপুস্তকটি আকৃতি, আকার ও ওজনে একই, সেগুলো সবদিক দিয়ে সমান বা সর্বসম। আবার একটি গাছের পাতাগুলোর আকৃতি একই হলেও আকারে ভিন্ন, পাতাগুলো দেখতে এক রকম বা সদৃশ। ফটোগ্রাফির দোকানে যখন আমরা মূলকপির অতিরিক্ত কপি চাই তা মূলকপির ছব্ব সমান, বড়ো বা ছোটো করে চাইতে পারি। কপিটি যদি মূলকপির সমান হয় সেক্ষেত্রে কপি দুটি সর্বসম। কপিটি যদি মূলকপির চেয়ে বড়ো বা ছোটো হয় সেক্ষেত্রে কপি দুটি সদৃশ। এই অধ্যায়ে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দুই জ্যামিতিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করব। আমরা আপাতত সমতলীয় ক্ষেত্রের সর্বসমতা ও সদৃশতা বিবেচনা করব।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা –

- বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার ও আকৃতি হতে সর্বসম এবং সদৃশ আকার ও আকৃতি চিহ্নিত করতে পারবে;
- সর্বসমতা ও সদৃশতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে;
- ত্রিভুজের সর্বসমতা প্রমাণ করতে পারবে;
- ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের সদৃশতা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- সর্বসমতা ও সদৃশতার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সহজ সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

১০.১ সর্বসমতা


নিচের সমতলীয় চিত্র দুটি দেখতে একই আকৃতি ও আকারের। চিত্র দুটি সর্বসম কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য উপরিপাতন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। এ পদ্ধতিতে প্রথম চিত্রের একটি অনুরূপ কপি করে দ্বিতীয়টির উপর রাখি। যদি চিত্রগুলো পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে, তবে এরা সর্বসম। চিত্র F_1 ও চিত্র F_2 সর্বসম হলে, আমরা $F_1 \cong F_2$ দ্বারা প্রকাশ করি।



দুটি রেখাংশ কখন সর্বসম হবে? চিত্রে দুই জোড়া রেখাংশ আঁকা হয়েছে। উপরিপাতন পদ্ধতিতে AB এর অনুরূপ কপি CD এর উপর রেখে দেখি যে, AB রেখাংশ CD রেখাংশকে ঢেকে দিয়েছে এবং A ও B বিন্দু যথাক্রমে C ও D বিন্দুর উপর পতিত হয়েছে। সুতরাং রেখাংশ দুটি সর্বসম। একই কাজ


ফর্ম নং-১৯, গণিত-৭ম শ্রেণি, দাখিল

দ্বিতীয় জোড়া সরলরেখার জন্য করে দেখি যে, রেখাংশ দুটি সর্বসম নয়। লক্ষ করি, কেবল প্রথম জোড়া রেখাংশের দৈর্ঘ্য সমান।



দুটি রেখাংশের দৈর্ঘ্য সমান হলে রেখাংশ দুটি সর্বসম। আবার বিপরীতভাবে, দুটি রেখাংশ সর্বসম হলে এদের দৈর্ঘ্য সমান।


দুইটি কোণ কখন সর্বসম হবে? চিত্রে 40° দুইটি কোণ আঁকা হয়েছে। উপরিপাতন পদ্ধতি গ্রহণ করে প্রথম চিত্রের একটি অনুরূপ কপি করে দ্বিতীয়টির উপর রাখি। B বিন্দু Q বিন্দুর উপর এবং BA রশ্মি QP রশ্মির উপর পতিত হয়েছে। লক্ষ করি, কোণ দুটির পরিমাপ সমান বলে BC রশ্মি QR রশ্মির উপর পতিত হয়েছে। অর্থাৎ $\angle ABC \cong \angle PQR$



দুটি কোণের পরিমাপ সমান হলে কোণ দুটি সর্বসম। আবার বিপরীতভাবে, দুটি কোণ সর্বসম হলে এদের পরিমাপও সমান।

১০.২ ত্রিভুজের সর্বসমতা

একটি ত্রিভুজকে অপর একটি ত্রিভুজের উপর স্থাপন করলে যদি ত্রিভুজ দুটি সর্বতোভাবে মিলে যায়, তবে ত্রিভুজ দুটি সর্বসম হয়। সর্বসম ত্রিভুজের অনুরূপ বাহু ও অনুরূপ কোণগুলো সমান। নিচের $\triangle ABC$ ও $\triangle DEF$ সর্বসম।



$\triangle ABC$ ও $\triangle DEF$ সর্বসম হলে এবং A, B, C শীর্ষ যথাক্রমে D, E, F শীর্ষের উপর পতিত হলে $AB = DE, AC = DF, BC = EF$

$\angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$ হবে।

$\triangle ABC$ ও $\triangle DEF$ সর্বসম বোঝাতে $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ লেখা হয়।

ত্রিভুজের সর্বসমতা প্রমাণের জন্য কী তথ্য প্রয়োজন? এ জন্য দলগতভাবে পরের পৃষ্ঠার কাজটি কর:

কাজ

১। $\triangle ABC$ একটি ত্রিভুজ আঁকো যেন $AB = 5$ সে.মি., $BC = 6$ সে.মি. এবং $\angle B = 60^\circ$ হয়।
 (ক) ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য এবং অন্য কোণ দুটি পরিমাপ করো।
 (খ) তোমাদের পরিমাপগুলো তুলনা করো। কী দেখতে পাচ্ছ?

উপপাদ্য ১ (বাহু-কোণ-বাহু উপপাদ্য)


যদি দুটি ত্রিভুজের একটির দুই বাহু যথাক্রমে অপরটির দুই বাহুর সমান হয় এবং বাহু দুটির অন্তর্ভুক্ত কোণ দুটি পরস্পর সমান হয়, তবে ত্রিভুজ দুটি সর্বসম হয়।

বিশেষ নির্বচন: মনে করি,

$\triangle ABC$ ও $\triangle DEF$ এ $AB = DE, AC = DF$

এবং অন্তর্ভুক্ত $\angle BAC = \text{অন্তর্ভুক্ত } \angle EDF$

প্রমাণ করতে হবে যে, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$



প্রমাণ

ধাপ	যথার্থতা
(১) $\triangle ABC$ কে $\triangle DEF$ এর উপর এমনভাবে স্থাপন করি যেন A বিন্দু D বিন্দুর উপর ও AB বাহু DE বাহু বরাবর এবং DE বাহুর যে পাশে F আছে C বিন্দু ঐ পাশে পড়ে। এখন $AB = DE$ বলে B বিন্দু অবশ্যই E বিন্দুর উপর পড়বে।	[বাহুর সর্বসমতা]
(২) যেহেতু $\angle BAC = \angle EDF$ এবং AB বাহু DE বাহুর উপর পড়ে, সুতরাং AC বাহু DF বাহু বরাবর পড়বে।	[কোণের সর্বসমতা]
(৩) $AC = DF$ বলে C বিন্দু অবশ্যই F বিন্দুর উপর পড়বে।	[বাহুর সর্বসমতা]
(৪) এখন B বিন্দু E বিন্দুর উপর এবং C বিন্দু F বিন্দুর উপর পড়ে বলে BC বাহু অবশ্যই EF বাহুর সাথে পুরোপুরি মিলে যাবে। অতএব, $\triangle ABC, \triangle DEF$ এর উপর সমাপতিত হবে। $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (প্রমাণিত)	[দুটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে একটি মাত্র সরলরেখা অঙ্কন করা যায়]

উদাহরণ ১। চিত্রে, $AO = OB, CO = OD$

প্রমাণ কর যে, $\Delta AOD \cong \Delta BOC$


প্রমাণ : ΔAOD এবং ΔBOC এ

$AO = OB, CO = OD$ দেওয়া আছে

এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত $\angle AOD =$ অন্তর্ভুক্ত $\angle BOC$

[বিপ্রতীপ কোণ পরস্পর সমান]।

$\therefore \Delta AOD \cong \Delta BOC$ [বাহু-কোণ-বাহু উপপাদ্য] (প্রমাণিত)



উপপাদ্য ২

যদি কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহু পরস্পর সমান হয়, তবে এদের বিপরীত কোণ দুটিও পরস্পর সমান হবে।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ABC ত্রিভুজে $AB = AC$ ।

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle ABC = \angle ACB$ ।

অঙ্কন : $\angle BAC$ এর সমদ্বিখণ্ডক AD আঁকি যেন তা BC কে D

বিন্দুতে ছেদ করে।

প্রমাণ : ΔABD এবং ΔACD এ


(১) $AB = AC$ (প্রদত্ত)

(২) AD সাধারণ বাহু এবং

(৩) অন্তর্ভুক্ত $\angle BAD =$ অন্তর্ভুক্ত $\angle CAD$ (অঙ্কনানুসারে)

সুতরাং, $\Delta ABD \cong \Delta ACD$ [বাহু-কোণ-বাহু উপপাদ্য]

$\therefore \angle ABD = \angle ACD$ অর্থাৎ, $\angle ABC = \angle ACB$ (প্রমাণিত)



অনুশীলনী ১০.১

১। চিত্রে, CD, AB এর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক,

প্রমাণ করো যে $\Delta ADC \cong \Delta BDC$

২। চিত্রে, $CD = CB$ এবং $\angle DCA = \angle BCA$


প্রমাণ করো যে, $AB = AD$

৩। চিত্রে, $\angle BAC = \angle ACD$ এবং $AB = DC$


প্রমাণ করো যে, $AD = BC, \angle CAD = \angle ACB$

এবং $\angle ADC = \angle ABC$


৪। প্রমাণ করো যে, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহু বাদে অপর বাহু উভয়দিকে বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিঃস্থ কোণ দুটি পরস্পর সমান।



- ৫। চিত্রে, $AD = AE, BD = CE$
এবং $\angle AEC = \angle ADB$
প্রমাণ করো যে, $AB = AC$



- ৬। চিত্রে, $\triangle ABC$ এবং $\triangle DBC$ দুটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ।
প্রমাণ করো যে, $\triangle ABD \cong \triangle ACD$




- ৭। প্রমাণ করো যে, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমির প্রান্তবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুদ্বয়ের উপর অঙ্কিত মধ্যমা দ্বয় সমান।
৮। প্রমাণ করো যে, সমবাহু ত্রিভুজের কোণগুলো পরস্পর সমান।

উপপাদ্য ৩ (বাহু-বাহু-বাহু উপপাদ্য)

যদি একটি ত্রিভুজের তিন বাহু যথাক্রমে অপর একটি ত্রিভুজের তিন বাহুর সমান হয়, তবে ত্রিভুজ দুটি সর্বসম হবে।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, $\triangle ABC$ এবং $\triangle DEF$ এ

$AB = DE, AC = DF$ এবং $BC = EF$, প্রমাণ করতে হবে যে, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$



প্রমাণ : মনে করি, BC এবং EF বাহু যথাক্রমে $\triangle ABC$ এবং $\triangle DEF$ এর বৃহত্তম বাহুদ্বয়।

এখন $\triangle ABC$ কে $\triangle DEF$ এর উপর এমনভাবে স্থাপন করি, যেন B বিন্দু E বিন্দুর উপর ও BC বাহু EF বাহু বরাবর এবং EF রেখার যে পাশে D বিন্দু আছে, A বিন্দু এর বিপরীত পাশে পড়ে। মনে করি, G বিন্দু A বিন্দুর নতুন অবস্থান।

যেহেতু $BC = EF$, C বিন্দু F বিন্দুর উপর পড়বে। সুতরাং $\triangle GEF$ হবে $\triangle ABC$ এর নতুন অবস্থান।

অর্থাৎ, $EG = BA, FG = CA$ ও $\angle EGF = \angle BAC$

D, G যোগ করি।

ধাপ	যথার্থতা
(১) ΔEGD এ $EG = ED$ [কারণ $EG = BA = ED$] অতএব, $\angle EDG = \angle EGD$	[ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সমান]
(২) ΔFGD এ $FG = FD$ অতএব, $\angle FDG = \angle FGD$	[ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সমান]
(৩) সুতরাং, $\angle EDG + \angle FDG = \angle EGD + \angle FGD$ বা, $\angle EDF = \angle EGF$ অর্থাৎ, $\angle BAC = \angle EDF$ অতএব, ΔABC ও ΔDEF -এ $AB = DE, AC = DF$ এবং অন্তর্ভুক্ত $\angle BAC =$ অন্তর্ভুক্ত $\angle EDF$ $\therefore \Delta ABC \cong \Delta DEF$ (প্রমাণিত)।	[বাহু-কোণ-বাহু উপপাদ্য]

উপপাদ্য ৪ (কোণ-বাহু-কোণ উপপাদ্য)

যদি একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ ও কোণ সংলগ্ন বাহু যথাক্রমে অপর একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ ও কোণ সংলগ্ন বাহুর সমান হয়, তবে ত্রিভুজ দুটি সর্বসম হবে।

বিশেষ নির্বচন: মনে করি,

ΔABC ও ΔDEF -এ

$\angle B = \angle E, \angle C = \angle F$ এবং


কোণ সংলগ্ন BC বাহু = অনুরূপ

EF বাহু।

প্রমাণ করতে হবে যে,

$\Delta ABC \cong \Delta DEF$

প্রমাণ



ধাপ	যথার্থতা
(১) ΔABC কে ΔDEF এর উপর এমনভাবে স্থাপন করি যেন, B বিন্দু E বিন্দুর উপর ও BC বাহু EF বাহু বরাবর এবং EF রেখার যে পাশে D আছে বিন্দু A বিন্দু যেন ঐপাশে পড়ে। যেহেতু $BC = EF$, অতএব C বিন্দু F বিন্দুর উপর অবশ্যই পড়বে। (২) আবার, $\angle B = \angle E$ বলে, BA বাহু ED বাহু বরাবর পড়বে এবং $\angle C = \angle F$ বলে, CA বাহু FD বাহু বরাবর পড়বে। (৩) $\therefore BA$ এবং CA বাহুর সাধারণ বিন্দু A, ED ও FD বাহুর সাধারণ বিন্দু D এর উপর পড়বে। অর্থাৎ, $\Delta ABC, \Delta DEF$ এর উপর সমাপতিত হবে। $\therefore \Delta ABC \cong \Delta DEF$ (প্রমাণিত)	[বাহুর সর্বসমতা] [কোণের সর্বসমতা]

অনুসিদ্ধান্ত : একটি ত্রিভুজের একটি বাহু ও দুটি কোণ যথাক্রমে অপর একটি ত্রিভুজের একটি বাহু ও দুটি কোণের সমান হলে ত্রিভুজ দুটি সর্বসম।

কাজ

ΔABC ও ΔDEF এ $BC=EF$ এবং $\angle B=\angle E$ ও $\angle C=\angle F$ হলে
 দেখাও যে, $\Delta ABC \cong \Delta DEF$
 ইঙ্গিত : $\angle A+\angle B+\angle C = \angle D+\angle E+\angle F = 2$ সমকোণ হবে।
 $\therefore \angle B=\angle E, \angle C=\angle F$, হলে $\angle A=\angle D$ হবে। অতঃপর উপপাদ্য ৪ প্রয়োগ কর।

উদাহরণ ১। প্রমাণ করো যে, কোনো ত্রিভুজের শিরঃকোণের সমদ্বিখণ্ডক যদি ভূমির উপর লম্ব হয়, তবে ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু।

বিশেষ নির্বচন : চিত্রে, ΔABC এর শিরঃকোণ A -এর সমদ্বিখণ্ডক AD যা ভূমি BC এর D বিন্দুতে লম্ব। প্রমাণ করতে হবে যে, $AB = AC$

প্রমাণ : ΔABD এবং ΔACD এ


$\angle BAD = \angle CAD$ [$\because AD, \angle BAC$ এর সমদ্বিখণ্ডক]

$\angle ADB = \angle ADC$ [$\because AD, BC$ এর উপর লম্ব]

এবং AD সাধারণ বাহু।


সুতরাং $\Delta ABD \cong \Delta ACD$ [কোণ-বাহু-কোণ উপপাদ্য]

এতএব, $AB = AC$ [প্রমাণিত]



উপপাদ্য ৫ (সমকোণী ত্রিভুজের অতিভূজ-বাহু উপপাদ্য)

দুটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভূজদ্বয় সমান হলে এবং একটির এক বাহু অপরটির অপর এক বাহুর সমান হলে, ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম হবে।



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ABC ও DEF সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ে

অতিভূজ $AC =$ অতিভূজ DF এবং $AB = DE$


প্রমাণ করতে হবে যে, $\Delta ABC \cong \Delta DEF$

প্রমাণ


ধাপ	যথার্থতা
<p>(১) $\triangle ABC$ কে $\triangle DEF$ এর উপর এমনভাবে স্থাপন করি যেন, B বিন্দু E বিন্দুর উপর, BA বাহু ED বাহু বরাবর এবং C বিন্দু DE এর যে পাশে F বিন্দু আছে এর বিপরীত পাশে পড়ে। ধরি, C বিন্দুর নতুন অবস্থান G।</p> <p>(২) যেহেতু $AB=DE$, A বিন্দু D বিন্দুর উপর পড়বে। ফলে $\triangle DEG$ হবে $\triangle ABC$ এর নতুন অবস্থান অর্থাৎ $DG=AC$, $\angle G=\angle C$ $\angle DEG=\angle B=1$ সমকোণ।</p> <p>(৩) যেহেতু $\angle DEF+\angle DEG=1$ সমকোণ $+1$ সমকোণ $=2$ সমকোণ $=1$ সরলকোণ, GEF একটি সরলরেখা। সুতরাং $\triangle DGF$ একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। যার $DG=DF$ $\therefore \angle F=\angle G=\angle C$</p> <p>(৪) এখন $\triangle ABC$ ও $\triangle DEF$ এর $\angle B=\angle E$ [প্রত্যেকে ১ সমকোণ] $\angle C=\angle F$ এবং $AB=$ অনুরূপ DE সুতরাং $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (প্রমাণিত)</p>	<p>[ত্রিভুজের দুই বাহু সমান হলে তাদের বিপরীত কোণ দুটি পরস্পর সমান]</p> <p>[কোণ-বাহু-কোণ উপপাদ্য]</p>

অনুশীলনী ১০.২

- $\triangle ABC$ এ $AB=AC$ এবং O , $\triangle ABC$ এর অভ্যন্তরে এমন একটি বিন্দু যেন $OB=OC$ হয়
প্রমাণ করো যে, $\angle AOB=\angle AOC$
- $\triangle ABC$ এর AB ও AC বাহুতে যথাক্রমে D ও E এমন দুটি বিন্দু যেন $BD=CE$
এবং $BE=CD$ । প্রমাণ করো যে, $\angle ABC=\angle ACB$
- চিত্রে, $AB=AC$, $BD=DC$ এবং $BE=CF$ । প্রমাণ করো যে, $\angle EDB=\angle FDC$




৪। চিত্রে, $AB = AC$ এবং $\angle BAD = \angle CAE$ । প্রমাণ করো যে, $AD = AE$



৫। $ABCD$ চতুর্ভুজে AC , $\angle BAD$ এবং $\angle BCD$ এর সমদ্বিখণ্ডক। প্রমাণ করো যে, $\angle B = \angle D$

৬। চিত্রে, AB এবং CD পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এবং AC ও BD কর্ণ দুটি O বিন্দুতে ছেদ করেছে।



প্রমাণ করো যে, $AD = BC$

৭। প্রমাণ করো যে, সমদ্বিবাছ ত্রিভুজের ভূমির প্রান্তবিন্দুদ্বয় থেকে বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত লম্বদ্বয় পরস্পর সমান।

৮। প্রমাণ করো যে, কোনো ত্রিভুজের ভূমির প্রান্ত বিন্দুদ্বয় থেকে বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত লম্বদ্বয় যদি সমান হয়, তবে ত্রিভুজটি সমদ্বিবাছ।

৯। $ABCD$ চতুর্ভুজের $AB = AD$ এবং $\angle B = \angle D =$ এক সমকোণ।

প্রমাণ করো যে, $\triangle ABC \cong \triangle ADC$


১০.৩ সদৃশতা

নিচের চিত্রগুলো একই চিত্রের ছোটো-বড়ো আকার। এদের বিভিন্ন অংশের আকৃতি একই, কিন্তু অনুরূপ দুই বিন্দুর দূরত্ব সমান নয়। চিত্রগুলোকে সদৃশ চিত্র বলা হয়।



কাজ

১। (ক) চিত্রের ত্রিভুজ দুটি কি সদৃশ বলে মনে হয়?



কোণ		বাহু	
$\angle A =$	$\angle L =$	$AB =$	$LM =$
$\angle B =$	$\angle M =$	$BC =$	$MN =$
$\angle C =$	$\angle N =$	$CA =$	$NL =$

(খ) ত্রিভুজ দুটির কোণগুলো মেপে সারণিটি পূরণ করো। কোণগুলোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি?

(গ) ত্রিভুজ দুটির বাহুগুলো মেপে সারণিটি পূরণ করো। বাহুগুলোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি?

পূরণকৃত ছকটি হতে দেখা যায়,

$$\angle A = \angle L$$

$$\angle B = \angle M$$

$$\angle C = \angle N$$

$\angle L$, $\angle M$ ও $\angle N$ যথাক্রমে $\angle A$, $\angle B$, ও $\angle C$ এর অনুরূপ কোণ।

আরো লক্ষ করা যায়

$$\frac{AB}{LM} = \frac{BC}{MN} = \frac{CA}{NL} = \boxed{?}$$

LM , MN ও NL বাহুগুলো যথাক্রমে AB , BC ও CA বাহুর অনুরূপ বাহু।

দুটি ত্রিভুজ বা বহুভুজ সদৃশ হলে

- অনুরূপ কোণগুলো সমান।
- অনুরূপ বাহুগুলো সমানুপাতিক।

সদৃশ চিত্রের বাহুগুলোর অনুপাত দ্বারা মূল চিত্রের তুলনায় অন্য চিত্রের বর্ধন অথবা সঙ্কোচন বোঝায়।

সদৃশ চিত্র একই আকৃতির কিন্তু আকারে সমান নাও হতে পারে। সদৃশ চিত্রের আকার সমান হলে তা

সর্বসম চিত্রে পরিণত হয়। সুতরাং সর্বসমতা সদৃশতার বিশেষ রূপ।


১০.৪ সদৃশ ত্রিভুজ

দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ কোণগুলো সমান এবং অনুরূপ বাহুগুলো সমানুপাতিক। দুটি ত্রিভুজ সদৃশ হওয়ার জন্য ন্যূনতম শর্ত বের করি।


কাজ

১। তিন-চার জনের দল গঠন করে নিচের কাজগুলো কর :


- ১। (ক) $\triangle LMN$ ত্রিভুজটি আঁকো, যার $LM = 2$ সে.মি.,
 $MN = 3$ সে.মি., $LN = 2.5$ সে.মি.।
 (খ) $\triangle XYZ$ ত্রিভুজটি আঁকো, যার $XY = 6$ সে.মি.,
 $YZ = 9$ সে.মি., $XZ = 7.5$ সে.মি.।
 (গ) $\triangle LMN$ ও $\triangle XYZ$ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুগুলোর
 অনুপাত সমান কি?
 (ঘ) $\triangle LMN$ ও $\triangle XYZ$ সদৃশ কি?




- ২। (ক) $\triangle ABC$ ত্রিভুজটি আঁকো, যার $\angle A = 48^\circ$, $\angle B = 75^\circ$.
 (খ) এবার $\triangle LMN$ ত্রিভুজটি আঁকো, যার $\angle L = 48^\circ$, $\angle M = 75^\circ$.
 (গ) $\triangle ABC$ ও $\triangle LMN$ সদৃশ কি? কেন?
 (ঘ) তোমার আঁকা ত্রিভুজগুলো অন্য শিক্ষার্থীদের আঁকা ত্রিভুজগুলোর
 সাথে তুলনা করো। সেগুলো কি সদৃশ?



- ৩। (ক) $\triangle DEF$ ত্রিভুজটি আঁকো, যার $DE = 3$ সে.মি.,
 $DF = 4$ সে.মি. ও অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle D = 50^\circ$.
 (খ) $\triangle KLM$ ত্রিভুজটি আঁকো, যার $KL = 6$ সে.মি.,
 $KM = 8$ সে.মি. ও অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle K = 50^\circ$.
 (গ) $\triangle DEF$ ও $\triangle KLM$ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুগুলো কি
 সমানুপাতিক?
 (ঘ) $\triangle DEF$ ও $\triangle KLM$ সদৃশ কি? ব্যাখ্যা করো।



- ৪। (ক) $\triangle RTY$ ত্রিভুজটি আঁকো, যার $RT = 4$ সে.মি.,
 $\angle R = 90^\circ$ ও অতিভুজ $TY = 6$ সে.মি.।
 (খ) $\triangle BFG$ ত্রিভুজটি আঁকো, যার $BF = 3$ সে.মি.,
 $\angle B = 90^\circ$ ও অতিভুজ $FG = 4.5$ সে.মি.।
 (গ) $\triangle RTY$ ও $\triangle BFG$ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুগুলোর অনুপাত
 বের করো। তারা সমান কি?
 (ঘ) $\triangle LMN$ ও $\triangle XYZ$ সদৃশ কি?




১০.৫ ত্রিভুজের সদৃশতার শর্ত

আগের পৃষ্ঠার আলোচনা থেকে আমরা ত্রিভুজের সদৃশতার কতিপয় শর্ত নির্ধারণ করতে পারি। শর্তগুলো নিম্নরূপ:


শর্ত ১। (বাহু-বাহু-বাহু)

যদি একটি ত্রিভুজের তিন বাহু অপর একটি ত্রিভুজের তিন বাহুর সমানুপাতিক হয়, তবে ত্রিভুজ দুটি সদৃশ।




শর্ত ২। (বাহু-কোণ-বাহু)

যদি দুটি ত্রিভুজের একটির দুই বাহু যথাক্রমে অপরটির দুই বাহুর সমানুপাতিক হয় এবং বাহু দুটির অন্তর্ভুক্ত কোণ দুটি পরস্পর সমান হয়, তবে ত্রিভুজ দুটি সদৃশ।




শর্ত ৩। (কোণ-কোণ)

যদি দুটি ত্রিভুজের একটির দুটি কোণ যথাক্রমে অপরটির দুটি কোণের সমান হয়, তবে ত্রিভুজ দুটি সদৃশ।



শর্ত ৪। (অতিভুজ-বাহু)

যদি দুটি সমকোণী ত্রিভুজের একটির অতিভুজ ও একটি বাহু যথাক্রমে অপরটির অতিভুজ ও অনুরূপ বাহুর সমানুপাতিক হয়, তবে ত্রিভুজ দুটি সদৃশ।



১০.৬ সদৃশ চতুর্ভুজ

দুটি সদৃশ চতুর্ভুজের অনুরূপ কোণগুলো সমান এবং অনুরূপ বাহুগুলো সমানুপাতিক। দুটি চতুর্ভুজ সদৃশ হওয়ার শর্ত নির্ণয় করি।

কাজ

১। তিন-চার জনের দল গঠন করে নিচের কাজগুলো করো:

(ক) $KLMN$ চতুর্ভুজটি আঁকো, যার $\angle K = 45^\circ$, $KL = 3$ সে.মি., $LM = 2$ সে.মি., $MN = 3$ সে.মি., $NK = 2.5$ সে.মি.।

[ইঙ্গিত: প্রথমে $\angle K$ কোণটি আঁকো এবং কোণের বাহু দুটি থেকে KL ও KN সমান দূরত্বে দুটি বিন্দু চিহ্নিত কর। অতঃপর অপর দুই বাহু আঁকো।]

(খ) $WXYZ$ চতুর্ভুজটি আঁকো, যার $WX = 6$ সে.মি., $XY = 4$ সে.মি., $YZ = 6$ সে.মি., $ZW = 5$ সে.মি., $\angle W = 45^\circ$ । এ চতুর্ভুজটি কি অনন্য?

(গ) $KLMN$ ও $WXYZ$ চতুর্ভুজের অনুরূপ বাহুগুলোর অনুপাত সমান কি?

(ঘ) $KLMN$ ও $WXYZ$ চতুর্ভুজের অনুরূপ কোণগুলো পরিমাপ কর। সেগুলো কি পরস্পর সমান?

(ঙ) $KLMN$ ও $WXYZ$ সদৃশ কি?

লক্ষণীয় যে, দুটি সদৃশ চতুর্ভুজের


(ক) অনুরূপ কোণগুলো সমান এবং

(খ) অনুরূপ বাহুগুলো সমানুপাতিক।

দুটি চতুর্ভুজের অনুরূপ বাহুগুলো সমানুপাতিক হলে চতুর্ভুজ দুটি সদৃশ।


কাজ

১। নিচের চিত্রগুলোর সদৃশ জোড় চিহ্নিত কর। তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।




উদাহরণ ১। ABC সমবাহু ত্রিভুজের AD, BE ও CF তিনটি মধ্যমা।

- (ক) একটি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন কর।
 (খ) দেখাও যে, $\angle A = \angle B = \angle C$
 (গ) প্রমাণ কর যে, $AD = BE = CF$
 (ক)



ABC সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $AB = BC$

- (খ)



দেওয়া আছে, ABC সমবাহু ত্রিভুজের $AB = AC = BC$

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle A = \angle B = \angle C$

অঙ্কন: AD, BE ও CF তিনটি মধ্যমা অঙ্কন করি।

প্রমাণ: $\triangle ABD$ ও $\triangle ACD$ এ

$$AB = AC \quad [\because ABC \text{ সমবাহু ত্রিভুজ}]$$

$$BD = CD \quad [\because AD \text{ মধ্যমা}]$$

AD সাধারণ বাহু

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACD$$

$$\angle ABD = \angle ACD$$


$$\text{অর্থাৎ } \angle B = \angle C$$

অনুরূপে দেখানো যায় যে,

$$\angle A = \angle B$$

$$\therefore \angle A = \angle B = \angle C$$

গ।



বি:নি: দেওয়া আছে, ABC সমবাহু ত্রিভুজের AD, BE ও CF তিনটি মধ্যমা। প্রমাণ করতে হবে যে, $AD = BE = CF$.

প্রমাণ : $AB = AC$. $\therefore ABC$ সমবাহু ত্রিভুজ

$$\frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} AC$$

$$BF = CE \quad [\because F \text{ ও } E \text{ যথাক্রমে } AB \text{ ও } AC \text{ এর মধ্যবিন্দু }]$$

$$\triangle BEC \text{ ও } \triangle BFC \text{ এ}$$

$$BF = CE$$

$$BC = BC \quad [\text{সাধারণ বাহু}]$$

$$\text{এবং অন্তর্ভুক্ত } \angle BCE = \text{অন্তর্ভুক্ত } \angle CBF \quad \therefore \angle B = \angle C$$

$$\therefore \triangle BEC \cong \triangle BFC$$


$$\therefore BE = CF$$

অনুরূপে দেখানো যায় যে, $AD = BE$

$$AD = BE = CF \quad (\text{প্রমাণিত})$$

অনুশীলনী ১০.৩

১।



চিত্রে ABCD সামান্তরিক। $\angle B =$ কত?

- (ক) $\angle C$ (খ) $\angle D$ (গ) $\angle A - \angle D$ (ঘ) $\angle C - \angle D$







২। ΔABC এ $\angle B > \angle C$ হলে কোনটি সঠিক?

- (ক) $BC > AC$ (খ) $AB > AC$ (গ) $AC > BC$ (ঘ) $AC > AB$



৩। চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি কত?

- (ক) ১ সমকোণ (খ) ২ সমকোণ (গ) ৩ সমকোণ (ঘ) ৪ সমকোণ


৪। নিচের প্রতিটি চিত্রে ত্রিভুজ দুটির সদৃশতার কারণ বর্ণনা কর।




৫। প্রমাণ কর যে, নিচের প্রতিটি চিত্রের ত্রিভুজ দুটি সদৃশ।




৬। দেখাও যে, ΔPTN এবং ΔRWT সদৃশ।




- ৭। DY রেখাংশ $\angle CDW$ কোণটির দ্বিখণ্ডক।
দেখাও যে, $\triangle CDY$ ও $\triangle YDW$ সদৃশ।




- ৮। নিচের প্রতিটি সদৃশ ত্রিভুজ জোড়া থেকে y এর মান বের করো।




- ৯। প্রমাণ করো যে, চিত্রের ত্রিভুজ তিনটি সদৃশ।



- ১০। চতুর্ভুজ দুটির অনুরূপ কোণ ও অনুরূপ বাহুগুলো চিহ্নিত করো। চতুর্ভুজ দুটি সদৃশ কি-না যাচাই করো।



- ১১। ১ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি লাঠি মাটিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় ০.৪ মিটার ছায়া ফেলে। একই সময়ে একটি খাড়া গাছের ছায়ার দৈর্ঘ্য ৭ মিটার হলে গাছটির উচ্চতা কত?



- ১২। ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $AB = AC$, এর অভ্যন্তরে D এমন একটি বিন্দু যেন BDC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হয়।

- (ক) $\triangle CDE$ এর $\angle C = 90^\circ$ এবং $CD = CE$ হলে, ত্রিভুজটি কী ধরনের তা কারণসহ লেখো।
(খ) প্রমাণ করো যে, $\angle ABC = \angle ACB$
(গ) দেখাও যে, $\triangle ABD \cong \triangle ACD$

১৩। $\triangle ABC$ এ $AB = AC$ এবং BE ও CF যথাক্রমে AC ও AB এর উপর লম্ব।

- (ক) $\triangle PQR$ এর $\angle P = 60^\circ$ এবং $PQ = PR$ হলে, ত্রিভুজটি কী ধরনের তা কারণসহ লেখো।
 (খ) দেখাও যে, $\angle B = \angle C$
 (গ) প্রমাণ করো যে, $BE = CF$


নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। $\triangle ABC$ -এ $\angle A = 70^\circ, \angle B = 20^\circ$ হলে ত্রিভুজটি কী ধরনের?

- (ক) সমকোণী (খ) সমদ্বিবাহু
 (গ) সূক্ষ্মকোণী (ঘ) সমবাহু

পাশের চিত্রে, ABC -এর $AB = AC$ এবং $AD \perp BC$ ।
 চিত্রের আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



২। চিত্রানুসারে—

- i. $\angle BAD = \angle CAD$ ii. $\triangle ABC$ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ iii. $BD = CD$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। $\angle BAC = 80^\circ$ হলে, $\angle ABD =$ কত?

- (ক) 40° (খ) 45° (গ) 50° (ঘ) 60°

সৃজনশীল প্রশ্ন

৪। ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $AB = AC$ এবং D, BC এর মধ্যবিন্দু। DE ও DF যথাক্রমে AC ও AB এর উপর লম্ব।

- (ক) দুটি সদৃশকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করে একজোড়া অনুরূপ বাহু দেখাও।
 (খ) দেখাও যে, $AD \perp BC$
 (গ) প্রমাণ করো যে, $DE = DF$

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ৫। (ক) $\triangle ABC$ ও $\triangle PQR$ এর $\angle A = \angle P, \angle B = \angle Q$ ও $\angle C = \angle R$ হলে ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম হতে পারে কি? কারণসহ লেখো।
 (খ) সমবাহু $\triangle ABC$ -এর $AD \perp BC$ হলে, দেখাও যে, $\triangle ABD \cong \triangle ACD$.
 (গ) $\triangle ABC$ এর $AB = AC$ এবং $\angle BAC = 70^\circ$ হলে, $\angle ABC$ -এর মান নির্ণয় করো।

একাদশ অধ্যায়

তথ্য ও উপাত্ত

আমরা আগের শ্রেণিতে জেনেছি, পরিসংখ্যান হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা সংখ্যায় উপস্থাপনযোগ্য তথ্য ও উপাত্তকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে উপাত্তগুলোর মধ্যে তুলনাকরণ ও সমজাতীয় উপাত্তের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি ঘটনাকে খুব অল্প সময়ে পূর্ণাঙ্গভাবে সংখ্যাচক ব্যাখ্যা দেয়। পরিসংখ্যানে উপাত্তসমূহের বিবরণ এক নজরে চট করে বোঝার জন্য নানা ধরনের লেখচিত্র ও সারণির ব্যবহার করা হয়।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা –

- গণসংখ্যা সারণি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- শ্রেণি ব্যবধানের মাধ্যমে অবিন্যস্ত উপাত্ত বিন্যস্ত আকারে প্রকাশ করতে পারবে;
- আয়তলেখ অঙ্কন করতে পারবে;
- অঙ্কিত আয়তলেখ হতে প্রচুরক বের করতে পারবে;
- অঙ্কিত আয়তলেখ হতে উপাত্ত সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১১.১ তথ্য ও উপাত্ত

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা তথ্য ও উপাত্ত সম্বন্ধে জেনেছি। সংখ্যাভিত্তিক কোনো তথ্য বা ঘটনা হচ্ছে একটি পরিসংখ্যান। আর তথ্য বা ঘটনা নির্দেশক সংখ্যাগুলো হচ্ছে পরিসংখ্যানের উপাত্ত। ধরা যাক, কোনো এক পরীক্ষায় দাখিল সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ৩৫জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বর হলো –

৮০, ৬০, ৬৫, ৭৫, ৮০, ৬০, ৬০, ৯০, ৯৫, ৭০, ১০০, ৯৫, ৮৫, ৬০, ৮৫, ৮৫, ৯০, ৯৮, ৮৫, ৫৫, ৫০, ৯৫, ৯০, ৯০, ৯৮, ৬৫, ৭০, ৭০, ৭৫, ৮৫, ৯৫, ৭৫, ৬৫, ৭৫, ৬৫।

এখানে নম্বরসমূহের এই তালিকা একটি পরিসংখ্যান। সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত যেকোনো তথ্যই পরিসংখ্যানের উপাত্ত।

১১.২ পরিসংখ্যান উপাত্ত

উৎস অনুযায়ী পরিসংখ্যানের উপাত্ত দুই ধরনের। যথা,

- (১) প্রাথমিক উপাত্ত বা প্রত্যক্ষ উপাত্ত ও
- (২) মাধ্যমিক উপাত্ত বা পরোক্ষ উপাত্ত।

(১) **প্রাথমিক উপাত্ত** : পূর্বে বর্ণিত কোনো এক পরীক্ষায় গণিতে প্রাপ্ত নম্বরগুলো প্রাথমিক উপাত্ত। এরূপ উপাত্ত প্রয়োজন অনুযায়ী অনুসন্ধানকারী সরাসরি উৎস থেকে সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং উৎস থেকে সরাসরি যে উপাত্ত সংগৃহীত হয় তাই হলো প্রাথমিক উপাত্ত। সরাসরি সংগৃহীত বিধায় প্রাথমিক উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেশি।

(২) **মাধ্যমিক উপাত্ত** : পৃথিবীর কয়েকটি শহরের কোনো এক মাসের তাপমাত্রা আমাদের প্রয়োজন। যেভাবে গণিতের প্রাপ্ত নম্বরগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি সেভাবে তাপমাত্রার তথ্য আমাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত উপাত্ত আমরা আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি। সুতরাং এখানে উৎস হচ্ছে পরীক্ষা। পরীক্ষা উৎস থেকে সংগৃহীত উপাত্ত হচ্ছে মাধ্যমিক উপাত্ত। অনুসন্ধানকারী যেহেতু নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারে না সেহেতু তার নিকট এভাবে সংগৃহীত উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা অনেক কম।

১১.৩ অবিন্যস্ত ও বিন্যস্ত উপাত্ত

অবিন্যস্ত উপাত্ত : পূর্বে বর্ণিত শিক্ষার্থীদের গণিতে প্রাপ্ত নম্বরগুলো হলো অবিন্যস্ত উপাত্ত। এখানে নম্বরগুলো এলোমেলোভাবে আছে। নম্বরগুলো মানের কোনো ক্রমে সাজানো নেই।

বিন্যস্ত উপাত্ত : উপরে বর্ণিত নম্বরগুলো মানের উর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজালে আমরা পাই,
৫০, ৫৫, ৬০, ৬০, ৬০, ৬৫, ৬৫, ৬৫, ৬৫, ৭০, ৭০, ৭০, ৭৫, ৭৫, ৭৫, ৭৫, ৭৫, ৮০, ৮০, ৮৫, ৮৫,
৮৫, ৮৫, ৮৫, ৯০, ৯০, ৯০, ৯০, ৯৫, ৯৫, ৯৫, ৯৫, ৯৮, ৯৮, ১০০।

এভাবে সাজানো উপাত্তসমূহকে বিন্যস্ত উপাত্ত বলে।

অবিন্যস্ত উপাত্তকে বিন্যস্ত করার সহজ নিয়ম

উপরে বর্ণিত প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর ৫০ এবং সর্বোচ্চ নম্বর ১০০। এখানে নম্বরের ব্যাপ্তি হলো (১০০-৫০)। এখন শ্রেণিবিন্যাস করার জন্য ৫০ বা ৫০ এর কম সুবিধাজনক যেকোনো একটি সংখ্যা ধরা যায়। এখানে ৪৬ থেকে শুরু করে প্রতি ৫ নম্বরের ব্যবধানে শ্রেণিবিন্যাস গঠন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শ্রেণিব্যাপ্তি ৫। উপাত্তের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সুবিধাজনক শ্রেণি ব্যবধান নিয়ে উপাত্তগুলোকে কতগুলো শ্রেণিতে সাধারণত বিভক্ত করার প্রক্রিয়াই হলো শ্রেণিবিন্যাস।

উপাত্তের সংখ্যার ভিত্তি করে শ্রেণি ব্যবধান সাধারণত সর্বনিম্ন ৫ ও সর্বোচ্চ ১৫ নির্ধারণ করা হয়। শ্রেণিবিন্যাস উপর শ্রেণির সংখ্যা নির্ধারণের জন্য নিচে সূত্র ব্যবহার করা হয়।

$$\text{পরিসর} = (\text{বৃহত্তম সংখ্যা} - \text{ক্ষুদ্রতম সংখ্যা}) + 1$$

$$\begin{aligned} \text{উপাত্তের শ্রেণিসংখ্যা} &= \frac{(\text{বৃহত্তম সংখ্যা} - \text{ক্ষুদ্রতম সংখ্যা}) + 1}{\text{শ্রেণিব্যাপ্তি}} \\ &= \frac{(100 - 50) + 1}{5} \text{ বা } \frac{51}{5} = 10.2 \approx 11 \end{aligned}$$

শ্রেণিসংখ্যা দশমিক ভগ্নাংশ হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যাটিকে শ্রেণিসংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং ৪৬ থেকে আরম্ভ করে শ্রেণিব্যাপ্তি ৫ ধরে শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করলে শ্রেণিসংখ্যা হবে ১১টি। প্রথমে বামপাশে একটি কলামে নম্বরসমূহের শ্রেণিগুলো লিখতে হবে। এরপর প্রাপ্ত নম্বরগুলো একে একে বিবেচনা করে এবং প্রথম নম্বর যে শ্রেণিতে পড়বে তার জন্য ঐ শ্রেণির ডানে আর একটি কলামে ট্যালি (Tally) চিহ্ন '।' দিই। কোনো শ্রেণিতে যদি চারের বেশি ট্যালি চিহ্ন পড়ে তবে পঞ্চম ট্যালিচিহ্নটি চারটি চিহ্ন জুড়ে আড়াআড়িভাবে দিতে হয়। এভাবে শ্রেণিবিন্যাস শেষ হলে ট্যালিচিহ্ন গণনা করে শ্রেণি অনুযায়ী গণসংখ্যা বা ঘটন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিতে যতজন ছাত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাই হলো ঐ শ্রেণির ঘটনসংখ্যা বা গণসংখ্যা। গণসংখ্যা সংবলিত সারণিই গণসংখ্যা সারণি। উপরের আলোচনায় বর্ণিত অবিন্যস্ত উপাত্তকে বিন্যস্ত করার গণসংখ্যা:

গণসংখ্যা সারণি		
নম্বরের শ্রেণি (শ্রেণি ব্যবধান/ব্যাপ্তি = ৫)	ট্যালি চিহ্ন	গণসংখ্যা বা ঘটনসংখ্যা (শিক্ষার্থীর সংখ্যা)
৪৬ – ৫০		১
৫১ – ৫৫		১
৫৬ – ৬০		৪
৬১ – ৬৫		৪
৬৬ – ৭০		৩
৭১ – ৭৫		৪
৭৬ – ৮০		২
৮১ – ৮৫		৫
৮৬ – ৯০		৪
৯১ – ৯৫		৪
৯৬ – ১০০		৩
মোট		৩৫

উদাহরণ ১। কোনো শহরের জানুয়ারি মাসের ৩১ দিনের তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেলসিয়াস) নিচে দেওয়া হলো। গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর (তাপমাত্রাগুলো পূর্ণসংখ্যায়)।

২০, ১৮, ১৪, ২১, ১১, ১৪, ১২, ১০, ১৫, ১৮, ১২, ১৪, ১৬, ১৫, ১২, ১৪, ১৮, ২০, ২২, ৯, ১১, ১০, ১৪, ১২, ১৮, ২০, ২২, ১৪, ২৫, ২০, ১০।

সমাধান : এখানে তাপমাত্রা নির্দেশক সংখ্যাগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ৯ এবং বৃহত্তম সংখ্যা ২৫।

সুতরাং প্রদত্ত উপাত্তগুলোর পরিসর = $(২৫ - ৯) + ১ = ১৭$ । সুতরাং শ্রেণি ব্যাপ্তি ৫ এর জন্য শ্রেণিসংখ্যা $\frac{১৭}{৫} = ৩.৪ \approx ৪$

∴ শ্রেণিসংখ্যা হবে ৪।

প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা সারণি হলো :

তাপমাত্রার শ্রেণি	ট্যালিচিহ্ন	গণসংখ্যা
৯ - ১৩		১০
১৪ - ১৮		১৩
১৯ - ২৩		৭
২৪ - ২৮		১
মোট		৩১

কাজ : ১। একটি শ্রেণির ৩০জন করে শিক্ষার্থী নিয়ে এক একটি দল গঠন কর। প্রত্যেক দলের সদস্যদের উচ্চতা (সেন্টিমিটারে) পরিমাপ কর। প্রাপ্ত উপাত্তের গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর।

১১.৪ গণসংখ্যা আয়তলেখ


কোনো পরিসংখ্যান যখন লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তখন তা বোঝা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যেমন সহজ হয় তেমনি চিত্রাকর্ষকও হয়। এই প্রেক্ষাপটে পরিসংখ্যানে লেখচিত্রের মাধ্যমে গণসংখ্যা সারণি উপস্থাপন বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। আয়তলেখ বা গণসংখ্যা আয়তলেখ হচ্ছে গণসংখ্যা সারণির একটি লেখচিত্র। গণসংখ্যা আয়তলেখ আঁকার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা হয় :

- সুবিধাজনক স্কেলে একটি গণসংখ্যা সারণির শ্রেণি ব্যাপ্তি x -অক্ষ বরাবর লেখা হয়।
- সুবিধাজনক স্কেলে y -অক্ষ বরাবর গণসংখ্যার মান নেওয়া হয় এবং উভয় আয়তের অক্ষের জন্য একই বা পৃথক সুবিধাজনক স্কেল নেওয়া যায়।
- শ্রেণি ব্যাপ্তিকে ভূমি ও গণসংখ্যার মানকে আয়তের উচ্চতা ধরে আয়তলেখ অঙ্কন করা হয়।

উদাহরণ ২। কোনো মাদরাসার দাখিল ১০ম শ্রেণির ৬০জন শিক্ষার্থীর ওজনের (আসন্ন কিলোগ্রাম) গণসংখ্যা সারণি নিচে দেওয়া হলো। গণসংখ্যা সারণি থেকে উপাত্তের আয়তলেখ আঁকো এবং আয়তলেখ থেকে প্রচুরক (আসন্ন মান) নির্ণয় করো।

শ্রেণি ব্যাপ্তি	৪০ – ৪৫	৪৫ – ৫০	৫০ – ৫৫	৫৫ – ৬০	৬০ – ৬৫
গণসংখ্যা	৮	১৫	২৫	১০	২

সমাধান : ছক কাগজের (Graph Paper) শ্রেণিব্যাপ্তির জন্য x অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতি ঘরকে এক একক এবং গণসংখ্যার জন্য y -অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতি ১ ঘরকে ১ একক ধরে গণসংখ্যা আয়তলেখ আঁকা হয়েছে। যেহেতু শ্রেণিব্যাপ্তি x -অক্ষ বরাবর ৪০ থেকে আরম্ভ করা হয়েছে, সেহেতু x -অক্ষের মূল বিন্দু থেকে ৪০ পর্যন্ত ভাঙা চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, বাকি ঘরগুলো বিদ্যমান আছে।



চিত্র


গণসংখ্যার প্রচুরক ৫০-৫৫ শ্রেণিতে আছে। সুতরাং প্রচুরক এই শ্রেণিতে বিদ্যমান। প্রচুরক নির্ধারণ করার জন্য ঐ আয়তটির উপরিভাগে কৌণিক বিন্দুদ্বয় থেকে দুটি আড়াআড়ি রেখাংশ আগের ও পরের আয়তের উপরিভাগের কৌণিক বিন্দুর সাথে সংযোগ করা হয়। এদের ছেদবিন্দু থেকে সংশ্লিষ্ট ভূমির উপর লম্ব টানা হয়। লম্বটি x -অক্ষের যে বিন্দুতে মিলিত হয় তার সাংখ্যিক মানই প্রচুরক।

নির্ণেয় প্রচুরক ৫২ কেজি।

উদাহরণ ৩। কোনো মাদরাসার দাখিল ১০ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ১২৫ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা বিশ্লেষণ (Frequency Distribution) সারণি নিচে দেওয়া হলো। একটি আয়তলেখ আঁকো এবং আয়তলেখ থেকে প্রচুরক (আসন্ন মান) নির্ণয় করো।

শ্রেণিব্যাপ্তি	২০-৩০	৩০-৪০	৪০-৫০	৫০-৬০	৬০-৭০	৭০-৮০	৮০-৯০	৯০-১০০
শিক্ষার্থীর সংখ্যা (গণসংখ্যা)	৫	১২	৩০	৪০	২০	১৩	৩	২

সমাধান : ছক কাগজে x অক্ষ বরাবর শ্রেণিব্যাপ্তি এবং y অক্ষ বরাবর গণসংখ্যার জন্য ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতি ঘরকে ৫ একক ধরে আয়তলেখ আঁকা হলো। x -অক্ষে ০ থেকে ২০ পর্যন্ত আছে বোঝাতে ভাঙা চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।



চিত্র

এখানে চিত্রায়িত আয়তলেখ থেকে দেখা যায়, বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ৫০ থেকে ৬০ এর মধ্যে এবং ছেদ বিন্দু থেকে x অক্ষের উপর যে লম্ব টানা হয়েছে এর ব্যাপ্তি ৫০ ও ৬০ এর মধ্য অবস্থিত। তাই শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের প্রচুরক হলো ৫৪ (প্রায়)।

কাজ : ১। তোমাদের শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের নিয়ে দুটি দল গঠন করো। দলের নাম দাও। যেমন, শাপলা ও রজনীগন্ধা। কোনো ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায়—

(ক) শাপলা শিক্ষার্থীর দলের বাংলায় প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে আয়তলেখ আঁকো।

(খ) রজনীগন্ধা দলের শিক্ষার্থীর ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে আয়তলেখ আঁকো এবং উভয় ক্ষেত্রে আয়তলেখ প্রচুরক (আসন্ন) নির্ণয় করো।

অনুশীলনী ১১

- ১। ৫১ - ৬০ এর শ্রেণিব্যাপ্তি কত?
(ক) ১১ (খ) ১০ (গ) ৯ (ঘ) ৮
- ২। ৬০ - ৭০ শ্রেণির মধ্যবিন্দু কত?
(ক) ৬০ (খ) ৬৪ (গ) ৬৫ (ঘ) ৭০
- ৩। ১ থেকে ১০ পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যার গড় কত?
(ক) ৩ (খ) ৫ (গ) ৬ (ঘ) ৮
- ৪। সংখ্যাচাক তথ্যসমূহকে কী বলে?
(ক) গণিত (খ) বিজ্ঞান (গ) তথ্য বিজ্ঞান (ঘ) পরিসংখ্যান
- ৫। উপাত্ত বলতে কী বোঝায় তা উদাহরণের মাধ্যমে লিখ।
- ৬। উপাত্ত কত প্রকারের? প্রত্যেক প্রকারের উপাত্ত কীভাবে সংগ্রহ করা হয় এবং প্রত্যেক প্রকার উপাত্ত সংগ্রহের সুবিধা ও অসুবিধা লিখ।
- ৭। অবিন্যস্ত উপাত্ত কী? উদাহরণ দাও।
- ৮। একটি অবিন্যস্ত উপাত্ত লিখ। মানের ক্রমানুসারে সাজিয়ে বিন্যস্ত উপাত্তে রূপান্তর করো।
- ৯। কোনো শ্রেণির ৬০জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর নিচে দেওয়া হলো। গণসংখ্যা সারণি তৈরি করো।
৫০, ৮৪, ৭৩, ৫৬, ৯৭, ৯০, ৮২, ৮৩, ৪১, ৯২, ৪২, ৫৫, ৬২, ৬৩, ৯৬, ৪১, ৭১, ৭৭, ৭৮, ২২, ৪৮, ৪৬, ৩৩, ৪৪, ৬১, ৬৬, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৫৩, ৬০, ৫০, ৭২, ৬৭, ৯৯, ৮৩, ৮৫, ৬৮, ৬৯, ৪৫, ২২, ২২, ২৭, ৩১, ৬৭, ৬৫, ৬৪, ৬৪, ৮৮, ৬৩, ৪৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৭২, ৭১, ৭৩, ৪৯, ৭৫, ৬৪।

১০। নিচে ৫০টি দোকানের মাসিক বিক্রয়ের পরিমাণ (হাজার টাকায়) দেওয়া হলো। ৫ শ্রেণিব্যাপ্তি ধরে গণসংখ্যা সারণি তৈরি করো।

১৩২, ১৪০, ১৩০, ১৪০, ১৫০, ১৩৩, ১৪৯, ১৪১, ১৩৮, ১৬২, ১৫৮, ১৬২, ১৪০, ১৫০, ১৪৪, ১৩৬, ১৪৭, ১৪৬, ১৫০, ১৪৩, ১৪৮, ১৫০, ১৬০, ১৪০, ১৪৬, ১৫৯, ১৪৩, ১৪৫, ১৫২, ১৫৭, ১৫৯, ১৩২, ১৬১, ১৪৮, ১৪৬, ১৪২, ১৫৭, ১৫০, ১৭৮, ১৪১, ১৪৯, ১৫১, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৪, ১৫৩, ১৩৭, ১৫৪, ১৫২, ১৪৮।

১১। তোমাদের বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ৩০জন ছাত্রের ওজন (কেজিতে) নিচে দেওয়া হলো :

৪০, ৫৫, ৪২, ৪২, ৪৫, ৫০, ৫০, ৫৬, ৫০, ৪৫, ৪২, ৪০, ৪৩, ৪৭, ৪৩, ৫০, ৪৬, ৪৫, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৫২, ৪৪, ৪৫, ৪০, ৪৫, ৪০, ৪৪, ৫০, ৪০।

(ক) মানের ক্রমানুসারে সাজাও।

(খ) উপাত্তের গণসংখ্যা সারণি তৈরি করো।

১২। কোনো এলাকার ৩৫টি পরিবারের লোকসংখ্যা নিচে দেওয়া হলো :

৬, ৩, ৪, ৭, ১০, ৮, ৫, ৬, ৪, ৩, ২, ৬, ৮, ৯, ৫, ৪, ৩, ৭, ৬, ৫, ৩, ৪, ৮, ৫, ৯, ৩, ৫, ৭, ৬, ৯, ৫, ৮, ৪, ৬, ১০।

শ্রেণিব্যাপ্তি ২ নিয়ে গণসংখ্যা সারণি তৈরি করো।

১৩। ৩০ জন শ্রমিকের ঘণ্টা প্রতি মজুরি (টাকায়) নিচে দেওয়া হলো :

২০, ২২, ৩০, ২৫, ২৮, ৩০, ৩৫, ৪০, ২৫, ২০, ২৮, ৪০, ৪৫, ৫০, ৪০, ৩৫, ৪০, ৩৫, ২৫, ৩৫, ৩৫, ৪০, ২৫, ২০, ৩০, ৩৫, ৫০, ৪০, ৪৫, ৫০।

শ্রেণি ব্যবধান ৫ নিয়ে গণসংখ্যা সারণি গঠন করো।

১৪। নিচের গণসংখ্যা সারণি হতে আয়তলেখ আঁকো এবং প্রচুরক (আসন্ন মান) নির্ণয় করো :

শ্রেণিব্যাপ্তি	১১-২০	২১-৩০	৩১-৪০	৪১-৫০	৫১-৬০	৬১-৭০	৭১-৮০	৮১-৯০	৯১-১০০
গণসংখ্যা	১০	২০	৩৫	২০	১৫	১০	৮	৫	৩

১৫। আন্তর্জাতিক মানের T-20 ক্রিকেট খেলায় কোনো দলের সংগৃহীত রান এবং উইকেট পতনের পরিসংখ্যান নিচের সারণিতে দেওয়া হলো। আয়তলেখ আঁকো।

ওভার	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
রান	৬	৮	১০	৮	১২	৮	৬	১২	৭	১৫	১০	১২	১৪	১০	৮	১২	৮	১৪	৮	৬
উইকেট পতন	০	০	০	০	০	১	০	০	০	০	১	০	০	১	১	১	২	০	০	০

ইঙ্গিত : x-অক্ষ বরাবর ওভার এবং y-অক্ষ বরাবর রান ধরে আয়তলেখ আঁকো। যে ওভারে উইকেট পতন হয় সেই ওভারে সংগৃহীত রানের উপরে '●' চিহ্ন দিয়ে উইকেট পতন বোঝান যায়।

- ১৬। কোনো এক শ্রেণির ৩০ জন শিক্ষার্থীর উচ্চতা (সে.মি.) নিচে দেওয়া হলো। উচ্চতার আয়তলেখ আঁক এবং এর থেকে প্রচুরক নির্ণয় করো।
 ১৪৫, ১৬০, ১৫০, ১৫৫, ১৪৮, ১৫২, ১৬০, ১৬৫, ১৭০, ১৬০, ১৭৫, ১৬৫, ১৮০, ১৭৫, ১৬০, ১৬৫, ১৪৫, ১৫৫, ১৭৫, ১৭০, ১৬৫, ১৭৫, ১৪৫, ১৭০, ১৬৫, ১৬০, ১৮০, ১৭০, ১৬৫, ১৫০।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৯, ২৫ সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত?
 (ক) ১২ (খ) ১৩ (গ) ১৫ (ঘ) ১৬
- ২। ৬, ৬, ৯, ১৩, ১০, ৪, ৮ সংখ্যাগুলোর—
 i. গড় ৮ ii. মধ্যক ৮ iii. পরিসর ১০
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৭ম শ্রেণির ১০জন শিক্ষার্থীর দৈনিক খরচ (টাকায়) : ২০, ২২, ৫০, ৪০, ৩২, ২৮, ৪৫, ৩০, ২৫, ৪৮

- ৩। উপাত্তগুলোর পরিসর কত?
 (ক) ২৯ (খ) ৩০ (গ) ৩১ (ঘ) ৩২
- ৪। উপাত্তগুলোর গড় কত?
 (ক) ২৯ (খ) ৩০ (গ) ৩১ (ঘ) ৩৪

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ৫। ৭ম শ্রেণির ২০জন ছাত্রের গণিতে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপঃ
 ৫০, ৬০, ৫২, ৬২, ৪২, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৮৫, ৮০, ৮১, ৮২, ৪৭, ৪৬, ৪৮, ৪৩, ৪৯, ৫০, ৫৬, ৮০
 ক) কোনো উপাত্তের পরিসর ২৯ ও সর্বোচ্চ সংখ্যা ৭১ হলে, সর্বনিম্ন সংখ্যা নির্ণয় করো।
 খ) ৫ শ্রেণিব্যাপ্তি নিয়ে সারণি তৈরি করো।
 গ) প্রাপ্ত সারণি থেকে আয়তলেখ অঙ্কন করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ৬। (ক) উপাত্তের সর্বনিম্ন মান ১৭ ও পরিসর ৫১ হলে, এর সর্বোচ্চ মান নির্ণয় করো।
 (খ) উপাত্তের সর্বনিম্ন মান ২০ ও সর্বোচ্চ মান ৭১ হলে, ৮ শ্রেণি ব্যবধানে শ্রেণি সংখ্যা কত হবে তা নির্ণয় করো।
 (গ) ১২, ১০, ৭, ৯, ৩, ১১, ১৫, ১০ ও ৯ সংখ্যাগুলোর মধ্যক নির্ণয় করো।

উত্তরমালা

অনুশীলনী: ১.১

- ১। (ক) ১৩, (খ) ২৩, (গ) ৩৯, (ঘ) ১০৫ ; ২। (ক) ১৫, (খ) ৩১, (গ) ৬৩ (ঘ) ১০২ ;
৩। (ক) ৩, (খ) ৬, (গ) ৩০, (ঘ) ৫ ; ৪। (ক) ৩, (খ) ৬, (গ) ৭ ; ৫। ১৫ ; ৬। ২০

অনুশীলনী: ১.২

- ১। (খ) ২। (গ) ৩। (খ) ৪। (খ) ৫। (ক) ৬। (ক) ৭। ১৪০ (খ) ১৯টি (গ) ১৬
৭। (ক) ০.৬ (খ) ১.৫, (গ) ০.০৭, (ঘ) ২৫.৩২, (ঙ) ০.০২৪, (চ) ১২.০৩৫ ;
৮। (ক) ২.৬৫, (খ) ৪.৮২, (গ) ০.১৯ ; ৯। (ক) $\frac{১}{৮}$, (খ) $\frac{৭}{১১}$, (গ) $৩\frac{৫}{১২}$, (ঘ) $৫\frac{১৩}{১৮}$;
১০। (ক) ০.৯২৬, (খ) ১.৬৮৩, (গ) ২.৭৭৪ ; ১১। ৮৪ জন, ৩৯৩ জন ; ১২। ৫২ জন ; ১৩। ৩২ জন ;
১৪। ৪২টি ; ১৫। ২২৫ ; ১৬। ২৫ জন ; ১৭। ৪, ৫ ; ১৮। (ক) ১, ২, ৪, ৮ (খ) ৪২
(গ) কমপক্ষে ১ জন সৈন্য যোগ দিলে বর্গাকারে সাজানো যাবে।

অনুশীলনী ২.১

- ১। (ক) ৩ : ৬ :: ৫ : ১০, (খ) ৯ : ১৮ :: ১০ : ২০, (গ) ৭ : ২৮ :: ১৫ : ৬০
(ঘ) ১২ : ১৫ :: ২০ : ২৫, (ঙ) ১২৫ : ২৫ :: ২৫০০ : ৫০০
২। (ক) ৬ : ১২ :: ১২ : ২৪, (খ) ২৫ : ৪৫ :: ৪৫ : ৮১, (গ) ১৬ : ২৮ :: ২৮ : ৪৯
(ঘ) $\frac{৫}{৭} : ১ :: ১ : \frac{৭}{৫}$, (ঙ) ১.৫ : ৪.৫ :: ৪.৫ : ১৩.৫
৩। (ক) ২২, (খ) ৫৬, (গ) ১৪, (ঘ) $\frac{৭}{৬}$, (ঙ) ২.৫
৪। (ক) ১৪, (খ) ৫৫, (গ) ৪৮, (ঘ) $\frac{১৭}{৪}$ (ঙ) ৬.৩০
৫। ১০০০ টাকা ৬। ৩৮৫০ টি ৭। ১০০০ টাকা, ১৪০০ টাকা, ১৮০০ টাকা
৮। রুমি পাবে ৩৬০ টাকা, জেসমিন পাবে ৭২০ টাকা এবং কাকলি পাবে ১০৮০ টাকা
৯। লাবিব পাবে ৪৫০ টাকা, সামি পাবে ৩৬০ টাকা
১০। সবুজ পাবে ১৮০০ টাকা, ডালিম পাবে ৩০০০ টাকা ও লিংকন পাবে ১৫০০ টাকা ১১। ১০ গ্রাম
১২। ২৬ : ১৯ ১৩। ৪০ : ৭০ : ৪৯ ১৪। সারা পাবে ৪৮০০ টাকা, মাইমুনা পাবে ৩৬০০
টাকা এবং রাইসা পাবে ১২০০ টাকা ১৫। ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র পাবে ১২০০ টাকা, ৭ম শ্রেণির ছাত্র পাবে
১৪০০ টাকা এবং ৮ম শ্রেণির ছাত্র পাবে ১৬০০ টাকা ১৬। ইউসুফের আয় ২১০ টাকা

অনুশীলনী ২.২

- ১। লাভ ১২৫ টাকা ২। ক্ষতি ১৫০ টাকা ৩। লাভ ২০০ টাকা ৪। লাভ $৫\frac{১০}{১৩}\%$
৫। ৫০ টি চকোলেট ৬। ৮০ মিটার ৭। ক্ষতি $৭\frac{১৭}{১৯}\%$ ৮। লাভ ২৫% ৯। লাভ $৩৩\frac{১}{৩}\%$
১০। ক্ষতি ২০% ১১। ৪২০ টাকা ১২। $৭৬৩\frac{৮}{৯}$ টাকা ১৩। ১৮৮ টাকা ১৪। ৫০,০০০.০০ টাকা
১৫। ১,৭০০ টাকা।

অনুশীলনী ২.৩

- ১।(ক) ২।(ক) ৩।(ঘ) ৪।(ক) ৫।(খ) ৬।(ক) ৭। ৩ দিনে, ৮। $৯\frac{৩}{৫}$ দিনে,
 ৯। ৩৫ দিনে, ১০। ৪৫ জন, ১১। $১০\frac{১০}{৪৭}$ দিনে, ১২। $৭\frac{১}{৫}$ ঘণ্টায়, ১৩। ৬ কি.মি./ঘণ্টা,
 ১৪। ২ কি.মি./ঘণ্টা ১৫। স্থির পানিতে নৌকার বেগ ৮ কি.মি./ঘণ্টা, শ্রোতের পানিতে নৌকার বেগ ৪ কি.মি./ঘণ্টা
 ১৬। $৪\frac{৪}{৯}$ ঘণ্টায়, ১৭। ৮ মিনিট পর, ১৮। ৩০০ মিটার, ১৯। ৫৪ সেকেন্ড
 ২০। (ক) ৩ : ৬ : ১০ (খ) ৩০, ৬০, ১০০ গ্রাম (গ) ৩০ গ্রাম

অনুশীলনী ৩

- ১।(গ) ২।(গ) ৩।(ঘ) ৪।(খ) ৫।(ক) ০.৪০৩৯ কি.মি (খ) ০.০৭৫২৫ কি.মি
 ৬। ৫৩.৭ মিটার, ৫৩৭ ডেসিমিটার ৭।(ক) ৩০ বর্গমিটার, (খ) ১৭৫ বর্গসেন্টিমিটার
 ৮। দৈর্ঘ্য ৩৭৫ মিটার, প্রস্থ ১২৫ মিটার ৯। ৩০০০০ টাকা ১০। ২০০০ ব.মি. ১১। ৯৬ বর্গমিটার
 ১২। ৫ মেট্রিক টন ৫০৭ কে.জি. ৭০০ গ্রাম ১৩। ১ মেট্রিক টন ৭৫০ কে.জি. ১৪। ৬৬৬ মেট্রিক টন
 ৬৬৬ কে.জি. ৬৬৬ $\frac{২}{৩}$ গ্রাম ১৫। ৬১২ কে.জি. ১৬। ১৪৫ কে.জি. ৯৫০ গ্রাম ১৭। ১৮০ মগ
 ১৮। ৫৪৯ কে.জি. চাল এবং ১৭২ কে.জি. ৫০০ গ্রাম লবণ ১৯। ১৯৫০ টাকা ২০। ৩৮৪ বর্গমিটার
 ২১। দৈর্ঘ্য ২১ মিটার ও প্রস্থ ৭ মিটার ২২।(খ) ১২০০ বর্গমিটার (গ) ১৩৮.৫৬ মিটার
 ২৩।(ক) ৫ মিটার (খ) ৬ বর্গমিটার (গ) ৩৪০০০০ বর্গসেন্টিমিটার

অনুশীলনী ৪.১

- ১। $12a^4b$ ২। $30axyz$ ৩। $15a^3x^7y$ ৪। $-16a^2b^3$ ৫। $-20ab^4x^3yz$ ৬। $18p^7q^7$
 ৭। $24m^3a^4x^5$ ৮। $-21a^5b^3x^{10}y^5$ ৯। $10x^2y+15xy^2$ ১০। $45x^4y^2-36x^3y^3$
 ১১। $2a^5b^2-3a^3b^4+a^3b^2c^2$ ১২। $x^7y-x^4y^4+3x^5y^2z$ ১৩। $6a^2-5ab-6b^2$
 ১৪। a^2-b^2 ১৫। x^4-1 ১৬। $a^3+a^2b+ab^2+b^3$ ১৭। a^3+b^3
 ১৮। $x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$ ১৯। $x^3-3x^2y+3xy^2-y^3$ ২০। x^3+5x^2+3x-9
 ২১। $a^4+a^2b^2+b^4$ ২২। $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$ ২৩। $x^4+x^2y^2+y^4$
 ২৪। y^4+y^2+1 ২৬। a^3+b^3

অনুশীলনী ৪.২

- ১। $5a^2$ ২। $-8a^3$ ৩। $-5a^2x^2$ ৪। $-7x^3yz$ ৫। $9a^2yz^2$ ৬। $11x^2y$
 ৭। $3a-2b$ ৮। $4x^3y^2+x^4y$ ৯। $-b+3a^4b^4$ ১০। $2a^3b-3ab^2$ ১১। $5xy+4x-4x^3y$
 ১২। $3x^6y^4-2x^2yz+z$ ১৩। $-8ac+5a^3b^2c^4+3ab^4c^2$ ১৪। a^2b^2 ১৫। $3x+2$
 ১৬। $x-3y$ ১৭। x^2-xy+y^2 ১৮। $a+2xyz$ ১৯। $8p^3-12p^2q+18pq^2-27q^3$
 ২০। $-a^2-4a-16$ ২১। $x-4y$ ২২। x^2+3 ২৩। x^2+x+1 ২৪। a^2-b^2
 ২৫। $2ab+3d$ ২৬। x^2y^2-1 ২৭। $1+x-x^3-x^4$ ২৮। $x-5ab$ ২৯। xy
 ৩০। abc ৩১। ax ৩২। $9x^2-2xy-y^2$ ৩৩। $4a^2+1$ ৩৪। x^2+xy+y^2
 ৩৫। a^3+2a^2+a-4

অনুশীলনী ৪.৩

- ১। (ঘ) ২। (গ) ৩। (ঘ) ৪। (গ) ৫। (খ) ৬। (ঘ) ৭। (গ) ৮। (ক) ৯। (ঘ) ১০। (খ)
 ১১। -21 ১২। -9 ১৩। 37 ১৪। $x-y-a+b$ ১৫। $3x+4y-z+b+2c$
 ১৬। $2a+2b-2c$ ১৭। $7b-2a$ ১৮। $5a-b+11c$ ১৯। $2a+3b+28c$
 ২০। $-10x+14y-18z$ ২১। $2y-9z$ ২২। $14-a-5b$ ২৩। $3a-6b$
 ২৪। $38b-6a$ ২৫। $a-(b-c+d)$ ২৬। $7x+\{-5y-(-8z+9)\}$
 ২৭। (ক) $15x^2+2x-1$ (খ) $75x^3+20x^2-17x+2$ (গ) $3x+2$

অনুশীলনী ৫.১

- ১। $a^2+10a+25$ ২। $25x^2-70x+49$ ৩। $9a^2-66axy+121x^2y^2$
 ৪। $25a^4+90a^2m^2+81m^4$ ৫। 3025 ৬। 980100 ৭। $x^2y^2-12xy^2+36y^2$
 ৮। $a^2x^2-2abxy+b^2y^2$ ৯। 9409 ১০। $4x^2+y^2+z^2+4xy-4xz-2yz$
 ১১। $4a^2+b^2+9c^2-4ab+12ac-6bc$ ১২। $x^4+y^4+z^4+2x^2y^2-2x^2z^2-2y^2z^2$
 ১৩। $a^2+4b^2+c^2-4ab-2ac+4bc$ ১৪। $9x^2+4y^2+z^2-12xy+6xz-4yz$
 ১৫। $b^2c^2+c^2a^2+a^2b^2+2abc^2+2ab^2c+2a^2bc$ ১৬। $4a^4+4b^2+c^4+8a^2b-4a^2c^2-4bc^2$
 ১৭। 1 ১৮। $81a^2$ ১৯। $4b^2$ ২০। $16x^2$ ২১। 81 ২২। $4c^2d^2$ ২৩। $9x^2$
 ২৪। $16a^2$ ২৫। 100 ২৬। 100 ২৭। 1 ২৮। 16 ৩২। 12 ৩৩। 79

অনুশীলনী ৫.২

- ১। $16x^2-9$ ২। $169-144p^2$ ৩। a^2b^2-9 ৪। $100-x^2y^2$ ৫। $16x^4-9y^4$
 ৬। $a^2-b^2-c^2-2bc$ ৭। x^4+x^2+1 ৮। $x^2-3ax+\frac{5}{4}a^2$ ৯। $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}$
 ১০। $a^8+81x^8+9a^4x^4$ ১১। x^4-1 ১২। $81a^4-b^4$

অনুশীলনী ৫.৩

- ১। $(x+y)(x+z)$ ২। $(a+b)(a+c)$ ৩। $(ax+by)(bp+aq)$ ৪। $(2x+y)(2x-y)$
 ৫। $(3a+2b)(3a-2b)$ ৬। $(ab+7y)(ab-7y)$ ৭। $(2x+3y)(2x-3y)(4x^2+9y^2)$
 ৮। $(a+x+y)(a-x-y)$ ৯। $(3x-5y+8z)(x-y+2z)$ ১০। $(3a^2+2a+2)(3a^2-2a+2)$
 ১১। $2(a+8)(a-5)$ ১২। $(y+7)(y-13)$ ১৩। $(p-8)(p-7)$
 ১৪। $5a^4(3a^2+x^2)(3a^2-x^2)$ ১৫। $(a+8)(a-5)$ ১৬। $(x+y)(x-y)(x^2+y^2+2)$
 ১৭। $(x+5)(x+6)$ ১৮। $(a+b-c)(a-b+c)$ ১৯। $x^3(12x^2+5a^2)(12x^2-5a^2)$
 ২০। $(2x+3y+4a)(2x+3y-4a)$

অনুশীলনী ৫.৪

- ১। (খ) ২। (গ) ৩। (ক) ৪। (গ) ৫। (ক) ৬। (ঘ) ৭। (ঘ) ৮। (ঘ) ৯। (ঘ)
 ১০। (ক) ১১। (গ) ১২। $3ab^2c$ ১৩। $5ab$ ১৪। $3a$ ১৫। $4ax$ ১৬। $(a+b)$ ১৭। $(x-y)$
 ১৮। $(x+4)$ ১৯। $a(a+b)$ ২০। $(a+4)$ ২১। $(x-1)$ ২২। $18a^4b^2cd^2$ ২৩। $30x^2y^3z^4$
 ২৪। $6p^2q^2x^2y^2$ ২৫। $(b-c)(b+c)^2$ ২৬। $x(x^2+3x+2)$ ২৭। $5a(9x^2-25y^2)$
 ২৮। $(x+2)(x-5)^2$ ২৯। $(a+5)(a^2-7a+12)$ ৩০। $(x-3)(x^2-25)$ ৩১। $x(x+2)(x+5)$
 ৩২। (ক) $2(2x+1)$ (খ) $4x^2-12x+9$ (গ) $4x^2+4x-15$, 9
 ৩৩। (ক) $9x^2+4y^2+z^2-12xy-4yz+6zx$ (খ) $x(x+2)$ (গ) $x^2(x-7)(x-5)(x+2)(x+4)$

অনুশীলনী ৬.১

- ১। $\frac{b}{ac}$ ২। $\frac{a}{b}$ ৩। xyz ৪। $\frac{x}{y}$ ৫। $\frac{2}{3a}$ ৬। $\frac{2a}{1+2b}$ ৭। $\frac{1}{2a-3b}$ ৮। $\frac{a+2}{a-2}$ ৯। $\frac{x-y}{x+y}$
 ১০। $\frac{x-3}{x+4}$ ১১। $\frac{a^2}{abc}, \frac{ab}{abc}$ ১২। $\frac{rx}{pqr}, \frac{qy}{pqr}$ ১৩। $\frac{4nx}{6mn}, \frac{9my}{6mn}$ ১৪। $\frac{a(a+b)}{a^2-b^2}, \frac{b(a-b)}{a^2-b^2}$
 ১৫। $\frac{(a+2b)x^2}{a(a^2-4b^2)}, \frac{a(a-2b)y^2}{a(a^2-4b^2)}$ ১৬। $\frac{3a}{a(a^2-4)}, \frac{2(a-2)}{a(a^2-4)}$ ১৭। $\frac{a}{a^2-9}, \frac{b(a-3)}{a^2-9}$
 ১৮। $\frac{a(a-b)(a-c)}{(a^2-b^2)(a-c)}, \frac{b(a+b)(a-c)}{(a^2-b^2)(a-c)}, \frac{c(a+b)(a-b)}{(a^2-b^2)(a-c)}$
 ১৯। $\frac{a^2(a+b)}{a(a^2-b^2)}, \frac{ab(a-b)}{a(a^2-b^2)}, \frac{c(a-b)}{a(a^2-b^2)}$ ২০। $\frac{2(x+3)}{(x+1)(x-2)(x+3)}, \frac{3(x+1)}{(x+1)(x-2)(x+3)}$

অনুশীলনী ৬.২

- ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। ঘ ৫। গ ৬। খ ৭। $\frac{3a+2b}{5}$ ৮। $\frac{3}{5x}$
 ৯। $\frac{3bx+2ay}{6ab}$ ১০। $\frac{2a(2x-1)}{(x+1)(x-2)}$ ১১। $\frac{a^2+4}{a^2-4}$ ১২। $\frac{4x-17}{(x+1)(x-5)}$ ১৩। $\frac{2a-4b}{7}$
 ১৪। $\frac{2x-4y}{5a}$ ১৫। $\frac{ay-2bx}{8xy}$ ১৬। $\frac{x}{(x+2)(x+3)}$ ১৭। $\frac{(r-p)}{pr}$,

$$১৮। \frac{x(4y-x)}{y(x^2-4y^2)} \quad ১৯। \frac{a}{a^2-6a+5} \quad ২০। \frac{x-3}{x^2-4} \quad ২১। \frac{a}{8} \quad ২২। \frac{a}{6b} \quad ২৩। \frac{x^2-y^2+z^2}{xyz}$$

$$২৪। ০ \quad ২৫। ক. (x+y)(x-4y) \quad খ. \frac{x(x-4y)}{(x+y)(x-4y)}, \frac{x(x+y)}{(x+y)(x-4y)} \quad গ. \frac{2x^2-3xy+y}{(x+y)(x-4y)}$$

$$২৬। ক. (a-4)(a+3) \quad খ. \frac{(a+2)}{a(a+2)(a+3)}, \frac{a}{a(a+2)(a+3)} \quad গ. \frac{3a^2-4a-8}{a(a+2)(a+3)(a-4)}$$

অনুশীলনী ৭.১

$$১। 3 \quad ২। 2 \quad ৩। \frac{1}{2} \quad ৪। \frac{2}{3} \quad ৫। 3 \quad ৬। \frac{8}{15} \quad ৭। \frac{4}{3} \quad ৮। 4 \quad ৯। -12 \quad ১০। 5 \quad ১১। 1$$

$$১২। 8 \quad ১৩। -1 \quad ১৪। -6 \quad ১৫। \frac{19}{3} \quad ১৬। -7 \quad ১৭। 2 \quad ১৮। -1 \quad ১৯। -2 \quad ২০। 6$$

অনুশীলনী ৭.২

১। 10 ২। 6 ৩। 12 ৪। 9 ৫। 36 ৬। 20,21,22 ৭। 25,30 ৮। দিনা 52 টাকা,
মিনা 58 টাকা, রিনা 70 টাকা ৯। খাতা 53 টাকা, কলম 22 টাকা ১০। 240টি ১১। পিতার
বয়স 30 বছর, পুত্রের বয়স 5 বছর ১২। সারার বয়স 12 বছর, সাবার বয়স 18 বছর ১৩। 37রান
১৪। 25 কি.মি. ১৫। দৈর্ঘ্য 15 মিটার, প্রস্থ 5 মিটার।

অনুশীলনী ৭.৩

১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। ক ৫। ক ৬। গ ৭। গ ৮। ঘ ৯। গ ১০। (ক) বর্গ (খ) ত্রিভুজ

১১। (ক) 4 (খ) -2 (গ) 5 (ঘ) -4 (ঙ) 2 ১২। (ক) 4 (খ) 15 টাকা

(গ) 160 ও 240 টাকা

অনুশীলনী ৮

১। ক ২। খ ৩। (i) খ, (ii) ঘ, (iii) ঙ ৪। খ ৫। ক ৬। খ

অনুশীলনী ৯.২

১। গ ২। গ ৩। গ ৪। খ ৫। খ ৬। গ

অনুশীলনী ৯.৩

১। খ ২। খ ৩। ঘ ৪। গ ৫। ক

অনুশীলনী ১০.৩

১। খ ২। ঘ ৩। ঘ

অনুশীলনী ১১

১। খ ২। গ ৩। খ ৪। ঘ

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল সপ্তম শ্রেণি : গণিত

আলস্য দোষের আকর ।

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন ।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ।