


গণিত

অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

গণিত

অষ্টম শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মোঃ আবদুল মতিন
ড. আব্দুস ছামাদ
সালেহ্ মতিন
ড. অমল হালদার
ড. অমূল্য চন্দ্র মণ্ডল
শেখ কুতুবউদ্দিন
হামিদা বানু বেগম
এ.কে.এম. শহীদুল্লাহ
মোঃ শাহজাহান সিরাজ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ গণিত পাঠ্যপুস্তকটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে গণিতের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গণিতের প্রয়োগ বর্তমান সময়ে অনেক বেড়েছে। এই সব বিষয় বিবেচনায় রেখে মাধ্যমিক পর্যায়ে অষ্টম শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তকটি সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বেশ কিছু নতুন বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লাস্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর, ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	প্যাটার্ন	১-১১
দ্বিতীয়	মুনাফা	১২-২৭
তৃতীয়	পরিমাপ	২৮-৪৬
চতুর্থ	বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ	৪৭-৭৪
পঞ্চম	বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ	৭৫-৯৬
ষষ্ঠ	সরল সহসমীকরণ	৯৭-১১৪
সপ্তম	সেট	১১৫-১২৪
অষ্টম	চতুর্ভুজ	১২৫-১৪০
নবম	পিথাগোরাসের উপপাদ্য	১৪১-১৪৭
দশম	বৃত্ত	১৪৮-১৫৮
একাদশ	তথ্য ও উপাত্ত	১৫৯-১৭৪
	উত্তরমালা	১৭৫-১৮৪

প্রথম অধ্যায়

প্যাটার্ন


বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি নানা রকম প্যাটার্নে ভরপুর। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য আমরা গণনা ও সংখ্যার সাহায্যে উপলব্ধি করি। প্যাটার্ন নানাভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে জুড়ে আছে। শিশুর লাল-নীল ব্লক আলাদা করা একটি প্যাটার্ন—লালগুলো এদিকে যাবে, নীলগুলো ঐদিকে যাবে। সে গণনা করতে শেখে—সংখ্যা একটি প্যাটার্ন। আবার ৫এর গুণিতকগুলোর শেষে ০ বা ৫ থাকে, এটিও একটি প্যাটার্ন। সংখ্যা প্যাটার্ন চিনতে পারা—এটি গাণিতিক সমস্যা সমাধানে দক্ষতা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আবার আমাদের পোশাকে নানা রকম বাহারি নকশা, বিভিন্ন স্থাপনার গায়ে কারুকার্যময় নকশা ইত্যাদিতে জ্যামিতিক প্যাটার্ন দেখতে পাই। এ অধ্যায়ে সাংখ্যিক ও জ্যামিতিক প্যাটার্ন বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা—


- প্যাটার্ন কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- রৈখিক প্যাটার্ন লিখতে ও বর্ণনা করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক প্যাটার্ন লিখতে ও বর্ণনা করতে পারবে।
- আরোপিত শর্তানুযায়ী সহজ রৈখিক প্যাটার্ন লিখতে ও বর্ণনা করতে পারবে।
- রৈখিক প্যাটার্নকে চলকের মাধ্যমে বীজগণিতীয় রাশিমালায় প্রকাশ করতে পারবে।
- রৈখিক প্যাটার্নের নির্দিষ্টতম সংখ্যা বের করতে পারবে।

১.১ প্যাটার্ন

নিচের প্রথম চিত্রের টাইলসগুলো লক্ষ করি। এগুলো একটি প্যাটার্নে সাজানো হয়েছে। এখানে প্রতিটি আড়াআড়ি টাইলসের পাশের টাইলসটি লম্বালম্বিভাবে সাজানো। সাজানোর এই নিয়মটি একটি প্যাটার্ন সৃষ্টি করেছে।



১ম চিত্র



২য় চিত্র

ফর্মা-০১, গণিত-অষ্টম শ্রেণি

দ্বিতীয় চিত্রে কতগুলো সংখ্যা ত্রিভুজাকারে সাজানো হয়েছে। সংখ্যাগুলো একটি বিশেষ নিয়ম মেনে নির্বাচন করা হয়েছে। নিয়মটি হলো: প্রতি লাইনের শুরুতে ও শেষে ১ থাকবে এবং অন্য সংখ্যাগুলো উপরের সারির দুইটি পাশাপাশি সংখ্যার যোগফলের সমান। যোগফল সাজানোর এই নিয়ম অন্য একটি প্যাটার্ন সৃষ্টি করেছে।

আবার, ১, ৪, ৭, ১০, ১৩, ... সংখ্যাগুলোতে একটি প্যাটার্ন বিদ্যমান। সংখ্যাগুলো ভালোভাবে লক্ষ করলে একটি নিয়ম খুঁজে পাওয়া যাবে। নিয়মটি হলো, ১ থেকে শুরু করে প্রতিবার ৩ যোগ করতে হবে। অন্য একটি উদাহরণ : ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ... যার প্রতিটি পদ পূর্ববর্তী পদের দ্বিগুণ হচ্ছে।

১.২ স্বাভাবিক সংখ্যার প্যাটার্ন

মৌলিক সংখ্যা (Prime Number) নির্ণয়

আমরা জানি যে, ১-এর চেয়ে বড় যেসব সংখ্যার ১ ও সংখ্যাটি ছাড়া অন্য কোনো গুণনীয়ক বা উৎপাদক নেই, সেগুলো মৌলিক সংখ্যা। ইরাটোস্থিনিস (Eratosthenes) ছাঁকনির সাহায্যে সহজেই মৌলিক সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো একটি চাটে লিখি। এবার সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা ২ চিহ্নিত করি এবং ২ ব্যতীত এর গুণিতকগুলো কেটে দিই। অনুরূপে ক্রমান্বয়ে ৩, ৫ এবং ৭ ইত্যাদি মৌলিক সংখ্যা চিহ্নিত করি এবং এদের গুণিতকগুলো কেটে দিই। তালিকায় যে সংখ্যাগুলো টিকে রইল সেগুলো মৌলিক সংখ্যা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০
৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০
৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০
৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০
৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০

সংখ্যা শ্রেণির নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ণয়

উদাহরণ ১। সংখ্যাগুলোর পরবর্তী দুইটি সংখ্যা নির্ণয় করো : ৩, ১০, ১৭, ২৪, ৩১, ...

সমাধান : প্রদত্ত সংখ্যাগুলো

$$\begin{array}{ccccccc} ৩, & ১০, & ১৭, & ২৪, & ৩১, & \dots \\ & \swarrow & \searrow & \swarrow & \searrow & \\ & ৭ & ৭ & ৭ & ৭ & \end{array}$$

পাশাপাশি দুইটি সংখ্যার পার্থক্য

লক্ষ করি, প্রতিবার পার্থক্য ৭। অতএব, পরবর্তী দুইটি সংখ্যা হবে যথাক্রমে $৩১+৭ = ৩৮$ ও $৩৮+৭ = ৪৫$ ।

উদাহরণ ২। সংখ্যাগুলোর পরবর্তী সংখ্যাটি নির্ণয় করো : ১, ৪, ৯, ১৬, ২৫, ...

সমাধান : প্রদত্ত সংখ্যাগুলো

$$\begin{array}{ccccccc} ১, & ৪, & ৯, & ১৬, & ২৫, & \dots \\ \swarrow & \searrow & \swarrow & \searrow & \swarrow & \\ ৩ & ৫ & ৭ & ৯ & & \end{array}$$

পাশাপাশি দুইটি সংখ্যার পার্থক্য

লক্ষ করি, প্রতিবার পার্থক্য ২ করে বাড়ছে। অতএব, পরবর্তী সংখ্যা হবে $২৫ + (৯ + ২) = ২৫ + ১১ = ৩৬$ ।

উদাহরণ ৩। সংখ্যাগুলোর পরবর্তী সংখ্যাটি নির্ণয় করো : ১, ৫, ৬, ১১, ১৭, ২৮, ...

সমাধান : প্রদত্ত সংখ্যাগুলো

$$\begin{array}{ccccccc} ১, & ৫, & ৬, & ১১, & ১৭, & ২৮, & \dots \\ \swarrow & \searrow & \swarrow & \searrow & \swarrow & \searrow & \\ ৬ & ১১ & ১৭ & ২৮ & ৪৫ & \dots \end{array}$$

পাশাপাশি দুইটি সংখ্যার যোগফল

প্রদত্ত সংখ্যাগুলো একটি প্যাটার্নে লেখা হয়েছে। পরপর দুইটি সংখ্যার যোগফল পরবর্তী সংখ্যাটির সমান। অতএব, পরবর্তী সংখ্যাটি হবে $১৭ + ২৮ = ৪৫$ ।

কাজ :

১। ০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ... সংখ্যাগুলোকে ফিবোনাচ্চি সংখ্যা বলা হয়। সংখ্যাগুলোতে কোনো প্যাটার্ন দেখতে পাও কি ?

লক্ষ কর : ২ পাওয়া যায় এর পূর্ববর্তী দুইটি সংখ্যা যোগ করে $(১+১)$

৩ " " " " দুইটি " " " $(১+২)$

২১ " " " " দুইটি " " " $(৮+১৩)$

পরবর্তী দশটি ফিবোনাচ্চি সংখ্যা বের করো।

স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয়

স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যার যোগফল বের করার একটি চমৎকার সূত্র রয়েছে। আমরা সহজেই সূত্রটি বের করতে পারি।

মনে করি, ১ থেকে ১০ পর্যন্ত ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোর যোগফল ক।

$$\text{অর্থাৎ, } ক = ১ + ২ + ৩ + ৪ + ৫ + ৬ + ৭ + ৮ + ৯ + ১০$$

লক্ষ করি, প্রথম ও শেষ পদের যোগফল $১ + ১০ = ১১$, দ্বিতীয় ও শেষ পদের আগের পদের যোগফলও $২ + ৯ = ১১$ ইত্যাদি। একই যোগফলের প্যাটার্ন অনুসরণ করে ৫ জোড়া সংখ্যা পাওয়া গেল। সুতরাং যোগফল $১১ \times ৫ = ৫৫$ । এ থেকে স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যার যোগফল বের করার একটি কৌশল পাওয়া গেল।

কৌশলটি হলো :

প্রদত্ত যোগফলের সাথে সংখ্যাগুলো বিপরীত ক্রমে লিখে যোগ করে পাই

$$ক = ১ + ২ + ৩ + ৪ + ৫ + ৬ + ৭ + ৮ + ৯ + ১০$$

$$ক = ১০ + ৯ + ৮ + ৭ + ৬ + ৫ + ৪ + ৩ + ২ + ১$$

$$২ক = (১+১০) + (২+৯) + ... + (৯+২) + (১০+১)$$

$$বা, ২ক = (১+১০) \times ১০$$

$$বা, ক = \frac{(১+১০) \times ১০}{২} = \frac{১১ \times ১০}{২} = ৫৫$$

$$\therefore \text{যোগফল} = \frac{(\text{প্রথম সংখ্যা} + \text{শেষ সংখ্যা}) \times \text{পদ সংখ্যা}}{২}$$

কাজ:

১ থেকে ১৫ পর্যন্ত ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করে সূত্র প্রতিষ্ঠা করো।

প্রথম দশটি বিজোড় সংখ্যার (Odd Number) যোগফল নির্ণয়

প্রথম দশটি বিজোড় সংখ্যার যোগফল কত? ক্যালকুলেটরের সাহায্যে সহজেই যোগফল পাই, ১০০।

$$১ + ৩ + ৫ + ৭ + ৯ + ১১ + ১৩ + ১৫ + ১৭ + ১৯ = ১০০$$

এভাবে প্রথম পঞ্চাশটি বিজোড় সংখ্যার যোগফল বের করা সহজ হবে না। বরং এ ধরনের যোগফল নির্ণয়ের জন্য কার্যকর গাণিতিক সূত্র তৈরি করি। ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যাগুলো লক্ষ করলে দেখা যায়, $১ + ১৯ = ২০$, $৩ + ১৭ = ২০$, $৫ + ১৫ = ২০$ ইত্যাদি। এ রকম ৫ জোড়া সংখ্যা পাওয়া যায় যাদের প্রত্যেক জোড়ার যোগফল ২০। সুতরাং, সংখ্যাগুলোর যোগফল $৫ \times ২০ = ১০০$ ।


আমরা লক্ষ করি,

$$১ + ৩ = ৪, \quad \text{একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা}$$

$$১ + ৩ + ৫ = ৯, \quad \text{একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা}$$

$$১ + ৩ + ৫ + ৭ = ১৬, \quad \text{একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা, ইত্যাদি।}$$

প্রতিবার যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা পাচ্ছি। বিষয়টি জ্যামিতিক প্যাটার্ন হিসেবে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। ক্ষুদ্রাকৃতির বর্গের সাহায্যে এই যোগফলের প্যাটার্ন লক্ষ করি।



দেখা যাচ্ছে, প্রথম দুইটি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার যোগের বেলায় প্রত্যেক পাশে ২টি করে ছোট বর্গ বসানো হয়েছে। আবার, প্রথম তিনটি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যা যোগের বেলায় প্রত্যেক পাশে ৩টি ছোট বর্গ বসানো হয়েছে। সুতরাং ১০টি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যা যোগ করলে চিত্রের প্রত্যেক পাশে ১০টি ছোট বর্গ থাকবে। অর্থাৎ, $১০ \times ১০ = ১০^২$ বা ১০০টি বর্গের প্রয়োজন হবে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, 'ক' সংখ্যক ক্রমিক স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার যোগফল $ক^২$ ।

কাজ :

১। যোগফল বের করো: $১ + ৪ + ৭ + ১০ + ১৩ + ১৬ + ১৯ + ২২ + ২৫ + ২৮ + ৩১$

১.৩ সংখ্যাকে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ

কিছু স্বাভাবিক সংখ্যা রয়েছে যেগুলোকে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা যায়। যেমন,

$$২ = ১^২ + ১^২$$

$$৫ = ১^২ + ২^২$$

$$৮ = ২^২ + ২^২$$

$$১০ = ১^২ + ৩^২$$

$$১৩ = ২^২ + ৩^২ \text{ ইত্যাদি।}$$

এভাবে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত মোট ৩৫টি সংখ্যাকে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের যোগফল হিসেবে প্রকাশ করা যায়। আবার কিছু স্বাভাবিক সংখ্যাকে দুই বা ততোধিক উপায়ে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা যায়। যেমন,

$$৫০ = ১^২ + ৭^২ = ৫^২ + ৫^২$$

$$৬৫ = ১^২ + ৮^২ = ৪^২ + ৭^২$$

কাজ

১। ১৩০, ১৭০, ১৮৫ কে দুইভাবে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করো।

২। ৩২৫ কে তিনটি ভিন্ন উপায়ে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করো।

১.৪ ম্যাজিক বর্গ গঠন

(ক) ৩ ক্রমের ম্যাজিক বর্গ

একটি বর্গক্ষেত্রকে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর তিন ভাগে ভাগ করে নয়টি ছোট বর্গক্ষেত্র করা হলো। প্রতিটি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে পাশাপাশি, উপর-নিচ, কোনাকুনি যোগ করলে যোগফল একই হয়। এ ক্ষেত্রে ৩ ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা হবে ১৫। সংখ্যাগুলো সাজানোর বিভিন্ন কৌশলের একটি কৌশল হলো কেন্দ্রের ছোট বর্গক্ষেত্রে ৫ সংখ্যা বসিয়ে কর্ণ বরাবর বর্গক্ষেত্রে জোড় সংখ্যাগুলো লিখতে হবে যেন কর্ণ দুইটির যোগফল ১৫ হয়। কর্ণের সংখ্যাগুলো বাদ দিয়ে বাকি বিজোড় সংখ্যাগুলো এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন পাশাপাশি, উপর-নিচ যোগফল ১৫ পাওয়া যায়। পাশাপাশি, উপর-নিচ, কোনাকুনি যোগ করে দেখা যায় ১৫ হচ্ছে।

(খ) ৪ ক্রমের ম্যাজিক বর্গ

একটি বর্গক্ষেত্রকে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর চার ভাগে ভাগ করে ষোলোটি ছোট বর্গক্ষেত্র করা হলো। প্রতিটি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে পাশাপাশি, উপর-নিচ, কোনাকুনি যোগ করলে যোগফল একই হয়। এ ক্ষেত্রে যোগফল হবে ৩৪ এবং ৩৪ হলো ৪ ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা। সংখ্যাগুলো সাজানোর বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। একটি কৌশল হলো সংখ্যাগুলো যেকোনো কোনা থেকে আরম্ভ করে ক্রমান্বয়ে পাশাপাশি, উপর-নিচ লিখতে হবে। কর্ণের সংখ্যাগুলো বাদ দিয়ে বাকি সংখ্যাগুলো নির্বাচন করতে হবে। এবার কর্ণের সংখ্যাগুলো বিপরীত কোনা থেকে লিখি। পাশাপাশি, উপর-নিচ, কোনাকুনি যোগ করে দেখা যায়, যোগফল ৩৪ হচ্ছে।

কাজ :

- ১। ভিন্ন কৌশলে ৪ ক্রমের ম্যাজিক বর্গ গঠন করো।
- ২। দলগতভাবে ৫ ক্রমের ম্যাজিক বর্গ গঠনের চেষ্টা করো।

১.৫ সংখ্যা নিয়ে খেলা

- ১। দুই অঙ্কের যেকোনো সংখ্যা নাও। সংখ্যার অঙ্ক দুইটির স্থান বদল করে প্রাপ্ত নতুন সংখ্যাটির সাথে আগের সংখ্যাটি যোগ করো। যোগফল কে ১১ দ্বারা ভাগ করো। ভাগশেষ হবে শূন্য।
- ২। দুই অঙ্কের যেকোনো সংখ্যার অঙ্ক দুইটির স্থান পরিবর্তন করো। বড় সংখ্যাটি থেকে ছোট সংখ্যাটি বিয়োগ করে বিয়োগফলকে ৯ দ্বারা ভাগ দাও। ভাগশেষ হবে শূন্য।
- ৩। তিন অঙ্কের যেকোনো সংখ্যা নাও। সংখ্যার অঙ্কগুলোকে বিপরীত ক্রমে লেখো। এবার বড় সংখ্যাটি থেকে ছোট সংখ্যাটি বিয়োগ করো। বিয়োগফল ৯৯ দ্বারা ভাগ করো। ভাগশেষ হবে শূন্য।

১.৬ জ্যামিতিক প্যাটার্ন


চিত্রের বর্গগুলো সমান দৈর্ঘ্যের রেখাংশের দ্বারা তৈরি করা হয়। এ রকম কয়েকটি অঙ্কের চিত্র লক্ষ করি :

৪	১২	২৪	১৩	৩ক+১
১২	২৪	৪০	২১	৫ক+১
১২	২৪	৪০	২২	৫ক+২

চিত্রগুলো তৈরি করতে কতগুলো রেখাংশ প্রয়োজন এর প্যাটার্ন লক্ষ করি। 'ক' সংখ্যক অঙ্ক তৈরির জন্য রেখাংশের সংখ্যা প্রতি প্যাটার্নের শেষে বীজগণিতীয় রাশির সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

ক্রমিক	রাশি	পদ							
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম		১০ম	১০০তম
১	$২ক+১$	৩	৫	৭	৯	১১		২১	২০১
২	$৩ক+১$	৪	৭	১০	১৩	১৬		৩১	৩০১
৩	$ক^২-১$	০	৩	৮	১৫	২৪		৯৯	৯৯৯৯
৪	$৪ক+৩$	৭	১১	১৫	১৯	২৩		৪৩	৪০৩

উদাহরণ ৪।




উপরের জ্যামিতিক চিত্রগুলো একটি প্যাটার্ন তৈরি করছে যা সমান দৈর্ঘ্যের কাঠি দিয়ে তৈরি।

ক. প্যাটার্নে চতুর্থ চিত্রটি তৈরি করে কাঠির সংখ্যা নির্ণয় করো।

খ. প্যাটার্নটি কোন বীজগণিতীয় রাশিকে সমর্থন করে তা যুক্তিসহ উপস্থাপন করো।

গ. প্যাটার্নটির প্রথম পঞ্চাশটি চিত্র তৈরি করতে মোট কতটি কাঠি দরকার হবে তা নির্ণয় করো।

সমাধান : (ক) উদ্দীপকের আলোকে চতুর্থ প্যাটার্নটি নিম্নরূপ



প্যাটার্নটিতে সমান দৈর্ঘ্যের কাঠির সংখ্যা ২১

(খ) ১ম চিত্রে কাঠির সংখ্যা = ৬

$$= ৫+১$$

$$= ৫ \times ১ + ১$$

২য় চিত্রে কাঠির সংখ্যা = ১১

$$= ১০+১$$

$$= ৫ \times ২ + ১$$

৩য় চিত্রে কাঠির সংখ্যা = ১৬

$$= ১৫+১$$

$$= ৫ \times ৩ + ১$$

৪র্থ চিত্রে কাঠির সংখ্যা = ২১

$$= ২০+১$$

$$= ৫ \times ৪ + ১$$

একইভাবে ক-তম চিত্রে, কাঠির সংখ্যা = $৫ \times ক + ১$

$$= ৫ক + ১$$

∴ প্যাটার্নগুলো $(৫ক+১)$ বীজগণিতিক রাশি দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

(গ) 'খ' অংশ থেকে পাই

প্যাটার্নটির বীজগাণিতিক রাশি $৫ক+১$

$$\begin{aligned}\therefore ৫০\text{তম প্যাটার্নে প্রয়োজনীয় কাঠির সংখ্যা} &= ৫ \times ৫০ + ১ \\ &= ২৫০ + ১ \\ &= ২৫১\end{aligned}$$

এখন, প্যাটার্নগুলোর কাঠির সংখ্যাগুলোর সমষ্টি $= ৬+১১+১৬+২১+...+২৫১$

এখানে, ১ম পদ $= ৬$

শেষ পদ $= ২৫১$

পদ সংখ্যা $= ৫০$

$$\begin{aligned}\therefore \text{সমষ্টি} &= \frac{৬+২৫১}{২} \times ৫০ \quad [\text{সমষ্টি} = \frac{১ম সংখ্যা + শেষ সংখ্যা}{২} \times \text{পদ সংখ্যা}] \\ &= ২৫৭ \times ২৫ \\ &= ৬৪২৫\end{aligned}$$

$\therefore$ প্রথম ৫০টি প্যাটার্ন তৈরিতে প্রয়োজনীয় কাঠির সংখ্যা ৬৪২৫

অনুশীলনী ১

১। নিচের কোন ফলাফলটি ৯ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা?

ক) $৫২+২৫$

খ) $৫২৭+৭২৫$

গ) $৪১২+২৩৪$

ঘ) $৭৫-৫৭$

২। 'ক' সংখ্যক ত্রমিক স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার যোগফল কত?

ক) ক

খ) $২ক-১$

গ) ক২

ঘ) $২ক+১$

৩। প্রথম তিনটি বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল একটি—

i. পূর্ণবর্গ সংখ্যা

ii. বিজোড় সংখ্যা

iii. মৌলিক সংখ্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

৪। তালিকার পাশাপাশি দুইটি পদের পার্থক্য বের করো এবং পরবর্তী দুইটি সংখ্যা নির্ণয় করো।

ক) ৭, ১২, ১৭, ২২, ২৭, ...

খ) ৬, ১৭, ২৮, ৩৯, ৫০, ...

ফর্ম-০২, গণিত-অষ্টম শ্রেণি

৫। নিচের সংখ্যা প্যাটার্নগুলোর মধ্যে কোনো মিল রয়েছে কি?

প্রতিটি তালিকার পরবর্তী সংখ্যা নির্ণয় করো।

ক) ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ...

খ) ৪, ৪, ৫, ৬, ৮, ১১, ...

৬। ৫, ১৩, ২১, ২৯, ৩৭, ...

ক. ২৯ ও ৩৭কে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করো।

খ. তালিকার পরবর্তী ৪টি সংখ্যা নির্ণয় করো।

গ. তালিকার প্রথম ৫০টি সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ৯৯৯৯ কোন বীজগণিতীয় রাশির শততম পদ?

ক) $৯৯ক+১$

খ) $৯৯ক-১$

গ) $ক২+১$

ঘ) $ক২-১$

২। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত কতটি সংখ্যাকে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের যোগফল আকারে প্রকাশ করা যায়?

ক) ১০টি

খ) ২০টি

গ) ৩৫টি

ঘ) ৫০টি

৩। প্রথম নয়টি স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা ৩ ক্রমের ম্যাজিক বর্গ গঠনে—

i. ম্যাজিক সংখ্যা হবে ১৫

ii. কেন্দ্রে ছোট বর্গক্ষেত্রে সংখ্যাটি হবে ৫

iii. ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রগুলোতে ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা বসানো থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

১২	১৯	১৪
১৭	ক	১৩
১৬	১১	১৮

← একটি ম্যাজিক বর্গ

৪। ম্যাজিক বর্গটির ম্যাজিক সংখ্যা কত?

ক) ১৫

খ) ৩৪

গ) ৩৫

ঘ) ৪৫

৫। 'ক' চিহ্নিত স্থানে উপযুক্ত সংখ্যাটি কত?

ক) ৪৫

খ) ২০

গ) ১৫

ঘ) ৩

সৃজনশীল প্রশ্ন

৬।  ক তম চিত্র
১ম চিত্র ২য় চিত্র ৩য় চিত্র

সমান দৈর্ঘ্যের কাঠি দ্বারা নির্মিত চিত্র প্যাটার্নটির ১৫ তম চিত্রে কাঠির সংখ্যা ৮৮

ক. প্যাটার্নটির পরবর্তী চিত্রটি এঁকে এর কাঠি সংখ্যা নির্ণয় করো।

খ. প্যাটার্নটির “ক” তম চিত্রে কাঠি সংখ্যা নির্ণয় করার সূত্র গঠন করে ২১তম পদ নির্ণয় করো।

গ. প্রথম ১৫টি চিত্রের শেষ ১২টি চিত্র তৈরি করতে প্রয়োজনীয় কাঠি সংখ্যা নির্ণয় করো।

৭। ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫ সংখ্যা প্যাটার্নের “ক” তম পদ ৩৮।

ক. দেখাও যে, ৬৯ সংখ্যাটি এবং এর অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তার যোগফল ১১এর গুণিতক।

খ. সংখ্যা প্যাটার্নটির প্রথম ২০টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো।

গ. সংখ্যা প্যাটার্নটির পাশাপাশি দুটি পদের যোগফল থেকে যে নতুন প্যাটার্ন পাওয়া যায় তার (ক-২) তম পদ নির্ণয় করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৮। (ক) (৪ক - ১) বীজগণিতীয় রাশির সংখ্যা প্যাটার্ন নির্ণয় করো।

(খ) ১৩০ কে দুইভাবে দুইটি বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করো।

(গ) ১৪, ১৭, ২০, প্যাটার্নটির পরবর্তী দুইটি পদ নির্ণয় করো।

(ঘ) ৫, ৭, ৯, ১১, সংখ্যাগুলোর প্যাটার্নের বীজগণিতীয় রাশি নির্ণয় করো।

(ঙ) (৩ক + ২) বীজগণিতীয় রাশির সংখ্যা প্যাটার্নের ৫৫তম পদ নির্ণয় করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুনাফা

দৈনন্দিন জীবনে সবাই বেচাকেনা ও লেনদেনের সাথে জড়িত। কেউ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করে পণ্য উৎপাদন করেন ও উৎপাদিত পণ্য বাজারে পাইকারদের নিকট বিক্রয় করেন। আবার পাইকারগণ তাদের ক্রয়কৃত পণ্য বাজারে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করেন। পরিশেষে খুচরা ব্যবসায়ীগণ তাদের ক্রয়কৃত পণ্য সাধারণ ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করেন। প্রত্যেক স্তরে সবাই মুনাফা বা লাভ করতে চান। তবে বিভিন্ন কারণে লোকসান বা ক্ষতিও হতে পারে। যেমন, শেয়ারবাজারে লাভ যেমন আছে, তেমন দরপতনের কারণে ক্ষতিও আছে। আবার আমরা নিরাপত্তার স্বার্থে টাকা ব্যাংকে আমানত রাখি। ব্যাংক সেই টাকা বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে লাভ বা মুনাফা পায় এবং ব্যাংকও আমানতকারীদের মুনাফা দেয়। তাই সকলেরই বিনিয়োগ ও মুনাফা সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। এ অধ্যায়ে লাভ-ক্ষতি এবং বিশেষভাবে মুনাফা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা –

- মুনাফা কী তা বলতে পারবে।
- সরল মুনাফার হার ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবে।
- চক্রবৃদ্ধি মুনাফার হার ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবে।
- ব্যাংকের হিসাব বিবরণী বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২.১ লাভ-ক্ষতি (Profit-Loss)

একজন ব্যবসায়ী দোকান ভাড়া, পরিবহন খরচ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ পণ্যের ক্রয়মূল্যের সাথে যোগ করে প্রকৃত খরচ নির্ধারণ করেন। এই প্রকৃত খরচকে বিনিয়োগ বলে। এই বিনিয়োগকেই লাভ বা ক্ষতি নির্ণয়ের জন্য ক্রয়মূল্য হিসেবে ধরা হয়। আর যে মূল্যে ঐ পণ্য বিক্রয় করা হয় তা বিক্রয়মূল্য। ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য বেশি হলে লাভ বা মুনাফা হয়। আর ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য কম হলে লোকসান বা ক্ষতি হয়। আবার ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য সমান হলে লাভ বা ক্ষতি কোনোটিই হয় না। লাভ বা ক্ষতি ক্রয়মূল্যের ওপর হিসাব করা হয়।

আমরা লিখতে পারি, লাভ = বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য

ক্ষতি = ক্রয়মূল্য – বিক্রয়মূল্য

উপরের সম্পর্ক থেকে ক্রয়মূল্য বা বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করা যায়।

তুলনার জন্য লাভ বা ক্ষতিকে শতকরা হিসেবেও প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণ ১। একজন দোকানদার প্রতি হালি ডিম ২৫ টাকা দরে ক্রয় করে প্রতি ২ হালি ৫৬ টাকা দরে বিক্রয় করলে তাঁর শতকরা কত লাভ হবে ?

সমাধান : ১ হালি ডিমের ক্রয়মূল্য ২৫ টাকা

∴ ২ হালি " " " ২৫ × ২ টাকা বা ৫০ টাকা।

যেহেতু ডিমের ক্রয়মূল্য থেকে বিক্রয়মূল্য বেশি, সুতরাং লাভ হবে।

এখানে, লাভ = (৫৬ - ৫০) টাকা বা ৬ টাকা।

৫০ টাকায় লাভ ৬ টাকা

∴ ১ " " $\frac{৬}{৫০}$ টাকা

∴ ১০০ " " $\frac{৬ \times ১০০}{৫০}$ "

= ১২ টাকা।

∴ লাভ ১২%

উদাহরণ ২। একটি ছাগল ৮% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো। ছাগলটি আরও ৮০০ টাকা বেশি মূল্যে বিক্রয় করলে ৮% লাভ হতো। ছাগলটির ক্রয়মূল্য নির্ণয় করো।

সমাধান : ছাগলটির ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে, ৮% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য (১০০ - ৮) টাকা বা ৯২ টাকা।

আবার, ৮% লাভে বিক্রয়মূল্য (১০০ + ৮) টাকা বা ১০৮ টাকা।

∴ বিক্রয়মূল্য বেশি হয় (১০৮ - ৯২) টাকা বা ১৬ টাকা।

বিক্রয়মূল্য ১৬ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

" ১ " " " " $\frac{১০০}{১৬}$ "

" ৮০০ " " " $\frac{১০০ \times ৮০০}{১৬}$ "

= ৫০০০ টাকা

৯৯৯

∴ ছাগলটির ক্রয়মূল্য ৫০০০ টাকা।

কাজ : নিচের খালি ঘর পূরণ করো :			
ক্রয়মূল্য (টাকা)	বিক্রয়মূল্য (টাকা)	লাভ/ক্ষতি	শতকরা লাভ/ক্ষতি
৬০০	৬৬০	লাভ ৬০ টাকা	লাভ ১০%
৬০০	৫৫২	ক্ষতি ৪৮ টাকা	ক্ষতি ৮ %
	৫৮৩	লাভ ৩৩ টাকা	
৮৫৬		ক্ষতি ১০৭ টাকা	
		লাভ ৬৪ টাকা	লাভ ৮%

২.২ মুনাফা (Profit)

ফরিদা বেগম তাঁর কিছু জমানো টাকা ব্যাংকে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ১০,০০০ টাকা ব্যাংকে আমানত রাখলেন। এক বছর পর ব্যাংকের হিসাব নিতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর জমা টাকার পরিমাণ ৭০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৭০০ টাকা হয়েছে। এক বছর পর ফরিদা বেগমের টাকা কীভাবে ৭০০ টাকা বৃদ্ধি পেল?

ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে ব্যাংক সেই টাকা ব্যবসা, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে ঋণ দিয়ে সেখান থেকে মুনাফা করে। ব্যাংক সেখান থেকে আমানতকারীকে কিছু টাকা দেয়। এ টাকাই হচ্ছে আমানতকারীর প্রাপ্ত মুনাফা বা লভ্যাংশ। আর যে টাকা প্রথমে ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছিল তা তার মূলধন বা আসল। কারো কাছে টাকা জমা রাখা বা ঋণ দেওয়া এবং কারো কাছ থেকে টাকা ধার বা ঋণ হিসেবে নেওয়া একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়া মূলধন, মুনাফার হার, সময় ও মুনাফার সাথে সম্পর্কিত।

লক্ষ করি :

মুনাফার হার : ১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফাকে মুনাফার হার বা শতকরা বার্ষিক মুনাফা বলা হয়।

সময়কাল : যে সময়ের জন্য মুনাফা হিসাব করা হয় তা এর সময়কাল।

সরল মুনাফা : প্রতি বছর শুধু প্রারম্ভিক মূলধনের ওপর যে মুনাফা হিসাব করা হয়, একে সরল মুনাফা (Simple Profit) বলে। শুধু মুনাফা বলতে সরল মুনাফা বোঝায়।

এ অধ্যায়ে আমরা নিচের বীজগণিতীয় প্রতীকগুলো ব্যবহার করব।

মূলধন বা আসল = P (principal)	মুনাফা-আসল = আসল + মুনাফা
মুনাফার হার = r (rate of interest)	
সময় = n (time)	অর্থাৎ, $A = P + I$
মুনাফা = I (profit)	এখান থেকে পাই,
সর্বমুদ্রা মূলধন বা মুনাফা-আসল = A (Total amount)	$P = A - I$
	$I = A - P$

২.৩ মুনাফাসংক্রান্ত সমস্যা

আসল, মুনাফার হার, সময় ও মুনাফা এই চারটি উপাত্তের যেকোনো তিনটি জানা থাকলে বাকি উপাত্তটি বের করা যায়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

(ক) মুনাফা নির্ণয় :

উদাহরণ ৩। রমিজ সাহেব ব্যাংকে ৫০০০ টাকা জমা রাখলেন এবং ঠিক করলেন যে, আগামী ৬ বছর তিনি ব্যাংক থেকে টাকা উঠাবেন না। ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফা ১০% হলে, ৬ বছর পর তিনি মুনাফা কত পাবেন? মুনাফা-আসল কত হবে?

সমাধান : ১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ১০ টাকা

$$\begin{array}{rcll} ১ & " & ১ & " & " & \frac{১০}{১০০} " \\ ৫০০০ & " & ১ & " & " & \frac{১০ \times ৫০০০}{১০০} " \\ ৫০০০ & " & ৬ & " & " & \frac{১০ \times ৫০০০ \times ৬}{১০০} " \\ & & & & & = ৩০০০ \text{ টাকা} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মুনাফা-আসল} &= \text{আসল} + \text{মুনাফা} \\ &= (৫০০০ + ৩০০০) \text{ টাকা} \\ &= ৮০০০ \text{ টাকা।} \end{aligned}$$

$\therefore$ মুনাফা ৩০০০ টাকা এবং মুনাফা-আসল ৮০০০ টাকা।

$$\text{লক্ষ করি : } ৫০০০ \text{ টাকার } ৬ \text{ বছরের মুনাফা } \left(৫০০০ \times \frac{১০}{১০০} \times ৬ \right) \text{ টাকা}$$

$$\text{সূত্র : মুনাফা} = \text{আসল} \times \text{মুনাফার হার} \times \text{সময়, } I = Prn$$

$$\text{মুনাফা-আসল} = \text{আসল} + \text{মুনাফা, } A = P + I = P + Prn = P(1 + rn)$$

উদাহরণ ৩-এর বিকল্প সমাধান :

আমরা জানি, $I = Prn$, অর্থাৎ, মুনাফা = আসল $\times$ মুনাফার হার $\times$ সময়

$$\begin{aligned} \therefore \text{মুনাফা} &= ৫০০০ \times \frac{১০}{১০০} \times ৬ \text{ টাকা} \\ &= ৩০০০ \text{ টাকা।} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মুনাফা-আসল} &= \text{আসল} + \text{মুনাফা} \\ &= (৫০০০ + ৩০০০) \text{ টাকা বা } ৮০০০ \text{ টাকা।} \end{aligned}$$

$\therefore$ মুনাফা ৩০০০ টাকা এবং মুনাফা-আসল ৮০০০ টাকা।

(খ) আসল বা মূলধন নির্ণয় :

উদাহরণ ৪। শতকরা বার্ষিক $৮\frac{১}{২}$ টাকা মুনাফায় কত টাকার ৬ বছরের মুনাফা ২৫৫০ টাকা হবে?

সমাধান : মুনাফার হার $৮\frac{১}{২}\%$ বা $\frac{১৭}{২}\%$

আমরা জানি, $I = Prn$

$$\text{বা, } P = \frac{I}{rn}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{আসল} &= \frac{২৫৫০}{\frac{১৭}{২} \times ৬} \text{ টাকা} \\ &= \frac{৫০ \times ১০০}{১৭ \times ৩} \text{ টাকা} \\ &= (৫০ \times ১০০) \text{ টাকা} \\ &= ৫০০০ \text{ টাকা।} \end{aligned}$$

যেখানে,

$P = \text{আসল} = \text{নির্ণেয়}$

$I = \text{মুনাফা} = ২৫৫০ \text{ টাকা}$

$r = \text{মুনাফার হার} = ৮\frac{১}{২}\%$
 $= \frac{১৭}{২ \times ১০০}$

$n = \text{সময়} = ৬ \text{ বছর}$

(গ) মুনাফার হার নির্ণয় :

উদাহরণ ৫। শতকরা বার্ষিক কত মুনাফায় ৩০০০ টাকার ৫ বছরের মুনাফা ১৫০০ টাকা হবে ?

সমাধান : আমরা জানি, $I = Prn$

$$\text{বা, } r = \frac{I}{Pn}$$

$$= \frac{১৫০০}{৩০০০ \times ৫}$$

$$\begin{aligned} \text{মুনাফার হার} &= \frac{১৫০০}{৩০০০ \times ৫} = \frac{১}{১০} = \frac{১ \times ১০০}{১০ \times ১০০} = \frac{১০}{১০০} \\ &= ১০\% \end{aligned}$$

মুনাফার হার ১০%

যেখানে,

$P = \text{আসল} = ৩০০০ \text{ টাকা}$

$I = \text{মুনাফা} = ১৫০০ \text{ টাকা}$

$r = \text{মুনাফার হার} = \text{নির্ণেয়}$

$n = \text{সময়} = ৫ \text{ বছর}$

উদাহরণ ৬। কোনো আসল ৩ বছরে মুনাফা-আসলে ৫৫০০ টাকা হয়। মুনাফা, আসলের $\frac{৩}{৮}$ অংশ হলে, আসল ও মুনাফার হার নির্ণয় করো।

সমাধান : আমরা জানি, আসল + মুনাফা = মুনাফা-আসল

$$\text{বা, আসল} + \text{আসলের } \frac{৩}{৮} = ৫৫০০$$

$$\text{বা, } \left(1 + \frac{৩}{৮}\right) \times \text{আসল} = ৫৫০০$$

$$\text{বা, } \frac{১১}{৮} \times \text{আসল} = ৫৫০০$$

$$\begin{aligned} \text{বা, আসল} &= \frac{৫০০ \times ৫৫০০ \times ৮}{১১} \text{ টাকা} \\ &= ৪০০০ \text{ টাকা।} \end{aligned}$$

∴ মুনাফা = মুনাফা-আসল - আসল

$$= (৫৫০০ - ৪০০০) \text{ টাকা, বা } ১৫০০ \text{ টাকা}$$

আবার, আমরা জানি, $I = Prn$

$$\text{বা, } r = \frac{I}{Pn}$$

$$\text{মুনাফার হার} = \frac{১৫০০}{৪০০০ \times ৩}$$

$$= \frac{২৫ \times ৫০০ \times ১৫০০ \times ১০০}{৪০০০ \times ৮০ \times ৩} \% \text{ বা } \frac{২৫}{২} \% \text{ বা } ১২ \frac{১}{২} \%$$

∴ আসল ৪০০০ টাকা ও মুনাফার হার $১২ \frac{১}{২} \%$

(ঘ) সময় নির্ণয় :

উদাহরণ ৭। বার্ষিক ১২% মুনাফায় কত বছরে ১০০০০ টাকার মুনাফা ৪৮০০ টাকা হবে ?

সমাধান : আমরা জানি, $I = Prn$

$$\text{বা, } n = \frac{I}{Pr}$$

ফর্ম-০৩, গণিত-অষ্টম শ্রেণি

যেখানে,

$P = \text{আসল} = ৪০০০ \text{ টাকা}$

$I = \text{মুনাফা} = ১৫০০ \text{ টাকা}$

$r = \text{মুনাফার হার} = \text{নির্ণেয়}$

$n = \text{সময়} = ৩ \text{ বছর}$

যেখানে মুনাফা $I = ৪৮০০$ টাকা, মূলধন $P = ১০০০০$ টাকা,

মুনাফার হার $r = ১২\%$, সময় $n = ?$

$$\therefore \text{সময়} = \frac{\text{মুনাফা}}{\text{আসল} \times \text{মুনাফার হার}}$$

$$= \frac{৪৮০০}{১০০০০ \times \frac{১২}{১০০}} \text{ বছর}$$

$$\text{বা, সময়} = \frac{৪৮০০ \times ১০০}{১০০০০ \times ১২} \text{ বছর}$$

$$= ৪ \text{ বছর}$$

$\therefore$ সময় ৪ বছর

অনুশীলনী ২.১

- ১। একটি দ্রব্য বিক্রয় করে পাইকারি বিক্রেতার ২০% এবং খুচরা বিক্রেতার ২০% লাভ হয়। যদি দ্রব্যটির খুচরা বিক্রয়মূল্য ৫৭৬ টাকা হয়, তবে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয়মূল্য কত ?
- ২। একজন দোকানদার কিছু ডাল ২৩৭৫.০০ টাকায় বিক্রয় করায় ৫% ক্ষতি হলো। ঐ ডাল কত টাকায় বিক্রয় করলে তাঁর ৬% লাভ হতো ?
- ৩। ৩০ টাকায় ১০টি দরে ও ১৫টি দরে সমান সংখ্যক কলা ক্রয় করে সবগুলো কলা ৩০ টাকায় ১২টি দরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে ?
- ৪। বার্ষিক মুনাফার হার ১০.৫০ টাকা হলে, ২০০০ টাকার ৫ বছরের মুনাফা কত হবে ?
- ৫। বার্ষিক মুনাফা শতকরা ১০ টাকা থেকে কমে ৮ টাকা হলে, ৩০০০ টাকার ৩ বছরের মুনাফা কত কম হবে ?
- ৬। বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে, ১৩০০০ টাকা ৫ বছরে মুনাফা-আসলে ১৮৮৫০ টাকা হবে ?
- ৭। বার্ষিক শতকরা কত মুনাফায় কোনো আসল ৮ বছরে মুনাফা-আসলে দ্বিগুণ হবে ?
- ৮। ৬৫০০ টাকা যে হার মুনাফায় ৪ বছরে মুনাফা-আসলে ৮৮৪০ টাকা হয়, ঐ একই হার মুনাফায় কত টাকা ৪ বছরে মুনাফা-আসলে ১০২০০ টাকা হবে ?

- ৯। রিয়াজ সাহেব কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রেখে ৪ বছর পর ৪৭৬০ টাকা মুনাফা পান। ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফার হার ৮.৫০ টাকা হলে, তিনি ব্যাংকে কত টাকা জমা রেখেছিলেন ?
- ১০। শতকরা বার্ষিক যে হারে কোনো মূলধন ৬ বছরে মুনাফা-মূলধনে দ্বিগুণ হয়, সেই হারে কত টাকা ৪ বছরে মুনাফা-মূলধনে ২০৫০ টাকা হবে ?
- ১১। বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা মুনাফায় ৫০০ টাকার ৪ বছরের মুনাফা যত হয়, বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা মুনাফায় কত টাকার ২ বছর ৬ মাসের মুনাফা তত হবে ?
- ১২। বার্ষিক মুনাফা ৮% থেকে বেড়ে ১০% হওয়ায় তিশা মারমার আয় ৪ বছরে ১২৮ টাকা বেড়ে গেল। তাঁর মূলধন কত ছিল ?
- ১৩। কোনো আসল ৩ বছরে মুনাফা-আসলে ১৫৭৮ টাকা এবং ৫ বছরে মুনাফা-আসলে ১৮৩০ টাকা হয়। আসল ও মুনাফার হার নির্ণয় করো।
- ১৪। বার্ষিক ১০% মুনাফায় ৩০০০ টাকা এবং ৮% মুনাফায় ২০০০ টাকা বিনিয়োগ করলে মোট মূলধনের ওপর গড়ে শতকরা কত টাকা হারে মুনাফা পাওয়া যাবে ?
- ১৫। রব্রিক গোমেজ ৩ বছরের জন্য ১০০০০ টাকা এবং ৪ বছরের জন্য ১৫০০০ টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মোট ৯৯০০ টাকা মুনাফা দেন। উভয়ক্ষেত্রে মুনাফার হার সমান হলে, মুনাফার হার নির্ণয় করো।
- ১৬। একই হার মুনাফায় কোনো আসল ৬ বছরে মুনাফা-আসলে দ্বিগুণ হলে, কত বছরে তা মুনাফা-আসলে তিনগুণ হবে ?
- ১৭। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মুনাফা-আসল ৫৬০০ টাকা এবং মুনাফা, আসলের $\frac{২}{৫}$ অংশ। মুনাফা বার্ষিক শতকরা ৮ টাকা হলে, আসল ও সময় নির্ণয় করো।
- ১৮। জামিল সাহেব পেনশনের টাকা পেয়ে ১০ লাখ টাকার তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক ৫ বছর মেয়াদি পেনশনার সঞ্চয়পত্র কিনলেন। বার্ষিক মুনাফা ১২% হলে, তিনি ১ম কিস্তিতে অর্থাৎ প্রথম ৩ মাস পর কত মুনাফা পাবেন ?
- ১৯। একজন ফল ব্যবসায়ী যশোর থেকে ৩৬ টাকায় ১২টি দরে কিছু সংখ্যক এবং কুষ্টিয়া থেকে ৩৬ টাকায় ১৮টি দরে সমান সংখ্যক কলা খরিদ করলেন। তিনি ৩৬ টাকায় ১৫টি দরে তা বিক্রয় করলেন।
- ক. ব্যবসায়ী যশোর থেকে প্রতি একশত কলা কী দরে ক্রয় করেছিল?
- খ. সবগুলো কলা বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?
- গ. ২৫% লাভ করতে চাইলে প্রতি হালি কলা কী দরে বিক্রয় করতে হবে?

২০। কোন আসল ৩ বছরে সরল মুনাফাসহ ২৮০০০ টাকা এবং ৫ বছরে সরল মুনাফাসহ ৩০০০০ টাকা।

ক. প্রতীকগুলোর বর্ণনাসহ মূলধন নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।

খ. মুনাফার হার নির্ণয় করো।

গ. একই হারে ব্যাংকে কত টাকা জমা রাখলে ৫ বছরের মুনাফা-আসলে ৪৮০০০ টাকা হবে।

২.৪ চক্রবৃদ্ধি মুনাফা : (Compound Profit)

চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বছরের শেষে মূলধনের সাথে মুনাফা যোগ হয়ে নতুন মূলধন হয়। যদি কোনো আমানতকারী ব্যাংকে ১০০০ টাকা জমা রাখেন এবং ব্যাংক তাঁকে বার্ষিক ১২% মুনাফা দেয়, তবে আমানতকারী বছরান্তে ১০০০ টাকার ওপর মুনাফা পাবেন।

$$1000 \text{ টাকার } 12\% \text{ বা } 1000 \text{ এর } \frac{12}{100} \text{ টাকা}$$

$$= 120 \text{ টাকা।}$$

তখন, ২য় বছরের জন্য তার মূলধন হবে $(1000 + 120)$ টাকা, বা ১১২০ টাকা, যা তাঁর চক্রবৃদ্ধি মূলধন। ২য় বছরান্তে ১১২০ টাকার ওপর ১২% মুনাফা দেওয়া হবে।

$$1120 \text{ টাকার } 12\% = \frac{1120}{100} \times \frac{12}{100} \text{ টাকা}$$

$$= \frac{672}{5} \text{ টাকা}$$

$$= 134.40 \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{ ৩য় বছরের জন্য আমানতকারীর চক্রবৃদ্ধি মূলধন হবে } (1120 + 134.40) \text{ টাকা}$$

$$= 1254.40 \text{ টাকা।}$$

এভাবে প্রতি বছরান্তে ব্যাংকে আমানতকারীর মূলধন বাড়তে থাকবে। এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূলধনকে বলা হয় চক্রবৃদ্ধি মূলধন বা চক্রবৃদ্ধি মূল। আর প্রতিবছর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূলধনের ওপর যে মুনাফা হিসাব করা হয়, একে বলে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা। তবে এ মুনাফা নির্ণয় তিন মাস, ছয় মাস বা এর চেয়ে কম সময়ের জন্যও হতে পারে।

চক্রবৃদ্ধি মূলধন ও মুনাফার সূত্র গঠন :

ধরা যাক, প্রারম্ভিক মূলধন বা আসল P এবং বার্ষিক মুনাফার হার r

$\therefore$ ১ম বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন = আসল + মুনাফা

$$= P + P \times r$$

$$= P (1 + r)$$

২য় বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন = ১ম বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন + মুনাফা

$$= P (1 + r) + P (1 + r) \times r$$

$$= P (1 + r) (1 + r)$$

$$= P (1 + r)^2$$

৩য় বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন = ২য় বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন + মুনাফা

$$= P (1 + r)^2 + P (1 + r)^2 \times r$$

$$= P (1 + r)^2 (1 + r)$$

$$= P (1 + r)^3$$

লক্ষ করি : ১ম বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধনে $(1 + r)$ এর সূচক ১

২য় " " " $(1 + r)$ এর সূচক ২

৩য় " " " $(1 + r)$ এর সূচক ৩

$\therefore$ n বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন হবে $(1 + r)$ এর সূচক n

$\therefore$ n বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন C হলে, $C = P (1 + r)^n$

আবার, চক্রবৃদ্ধি মুনাফা = চক্রবৃদ্ধি মূলধন - প্রারম্ভিক মূলধন = $P (1 + r)^n - P$

$$\text{সূত্র : চক্রবৃদ্ধি মূলধন } C = P (1 + r)^n$$

$$\text{চক্রবৃদ্ধি মুনাফা} = C - P = P (1 + r)^n - P$$

এখন, চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে যে মূলধন ১০০০ টাকা এবং মুনাফা ১২% ধরা হয়েছিল, সেখানে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র প্রয়োগ করি :

$$\text{১ম বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন} = P (1 + r)$$

$$= ১০০০ \times \left(1 + \frac{১২}{১০০} \right) \text{ টাকা}$$

$$= ১০০০ \times (1 + ০.১২) \text{ টাকা}$$

$$= ১০০০ \times ১.১২ \text{ টাকা}$$

$$= ১১২০ \text{ টাকা}$$

$$\begin{aligned}
\text{২য় বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন} &= P(1+r)^2 \\
&= 1000 \times \left(1 + \frac{12}{100}\right)^2 \text{ টাকা} \\
&= 1000 \times (1 + 0.12)^2 \text{ টাকা} \\
&= 1000 \times (1.12)^2 \text{ টাকা} \\
&= 1000 \times 1.2544 \text{ টাকা} \\
&= 1254.80 \text{ টাকা} \quad |
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{৩য় বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন} &= P(1+r)^3 \\
&= 1000 \times \left(1 + \frac{12}{100}\right)^3 \text{ টাকা} \\
&= 1000 \times (1 + 0.12)^3 \text{ টাকা} \\
&= 1000 \times (1.12)^3 \text{ টাকা} \\
&= 1000 \times 1.404928 \text{ টাকা} \\
&= 1404.93 \text{ টাকা (প্রায়)} \quad |
\end{aligned}$$

উদাহরণ ১। বার্ষিক শতকরা ৮ টাকা মুনাফায় ৬২৫০০ টাকার ৩ বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয় করো।

সমাধান : আমরা জানি, $C = P(1+r)^n$

দেওয়া আছে, প্রারম্ভিক মূলধন, $P = ৬২৫০০$ টাকা

বার্ষিক মুনাফার হার, $r = ৮\%$

এবং সময় $n = ৩$ বছর

$$\therefore C = ৬২৫০০ \times \left(1 + \frac{৮}{১০০}\right)^3 \text{ টাকা, বা } ৬২৫০০ \times \left(\frac{১০৮}{১০০}\right)^3 \text{ টাকা}$$

$$= ৬২৫০০ \times (1.08)^3 \text{ টাকা}$$

$$= ৬২৫০০ \times ১.২৫৯৭১২ \text{ টাকা}$$

$$= ৭৮৭৩২ \text{ টাকা}$$

$\therefore$ চক্রবৃদ্ধি মূলধন ৭৮৭৩২ টাকা।

উদাহরণ ২। বার্ষিক ১০.৫০% মুনাফায় ৫০০০ টাকার ২ বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা নির্ণয় করো।

সমাধান : চক্রবৃদ্ধি মুনাফা নির্ণয়ের জন্য প্রথমে চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয় করি।

আমরা জানি, চক্রবৃদ্ধি মূলধন $C = P(1 + r)^n$, যেখানে মূলধন $P = ৫০০০$ টাকা,

$$\text{মুনাফার হার } r = ১০.৫০\% = \frac{২১}{২০০}$$

সময়, $n = ২$ বছর

$$\therefore C = P(1 + r)^2$$

$$= ৫০০০ \times \left(1 + \frac{২১}{২০০}\right)^2 \text{ টাকা}$$

$$= ৫০০০ \times \left(\frac{২২১}{২০০}\right)^2 \text{ টাকা}$$

$$= \cancel{৫০০০}^1 \times \frac{২২১}{\cancel{২০০}_1} \times \frac{২২১}{\cancel{২০০}_1} \text{ টাকা}$$

$$= \frac{৪৮৮৪১}{৮} \text{ টাকা বা } ৬১০৫.১৩ \text{ টাকা (প্রায়)}$$

$$\therefore \text{চক্রবৃদ্ধি মুনাফা} = C - P = P(1 + r)^2 - P$$

$$= (৬১০৫.১৩ - ৫০০০) \text{ টাকা}$$

$$= ১১০৫.১৩ \text{ টাকা (প্রায়)}$$

উদাহরণ ৩। একটি ফ্ল্যাট মালিক কল্যাণ সমিতি আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ থেকে উদ্ধৃত ২০০০০০ টাকা ব্যাংকে ছয় মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি মুনাফাভিত্তিক স্থায়ী আমানত রাখলেন। মুনাফার হার বার্ষিক ১২ টাকা হলে, ছয় মাস পর ঐ সমিতির হিসাবে কত টাকা মুনাফা জমা হবে? এক বছর পর চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত হবে?

সমাধান : দেওয়া আছে, মূলধন $P = ২০০০০০$ টাকা,

মুনাফার হার $r = ১২\%$, সময় $n = ৬$ মাস বা $\frac{১}{২}$ বছর

$$\therefore \text{মুনাফা } I = Prn$$

$$= \frac{২০০০}{২০০০০০} \times \frac{১২}{১০০} \times \frac{১}{২}$$

$$= ১২০০০ \text{ টাকা}$$

∴ ৬ মাস পর মুনাফা হবে ১২০০০ টাকা

$$\begin{aligned} ১ম ছয় মাস পর চক্রবৃদ্ধিমূল &= (২০০০০০ + ১২০০০) \text{ টাকা} \\ &= ২১২০০০ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{আবার, পরবর্তী ছয় মাসের মুনাফা-আসল} &= ২১২০০০ \left(১ + \frac{১২}{১০০} \times \frac{১}{২} \right) \text{ টাকা} \\ &= ২১২০০০ \times ১.০৬ \text{ টাকা} \\ &= ২২৪৭২০ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

১ বছর পর চক্রবৃদ্ধি মূলধন হবে ২২৪৭২০ টাকা।

উদাহরণ ৪। কোনো শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ৮০ লক্ষ। ঐ শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে ৩০ হলে, ৩ বছর পর ঐ শহরের জনসংখ্যা কত হবে?

সমাধান : শহরটির বর্তমান জনসংখ্যা, $P = ৮০০০০০০$

$$\text{জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, } r = \frac{৩০}{১০০০} \times ১০০\% = ৩\%$$

সময়, $n = ৩$ বছর।

এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র প্রযোজ্য।

$$\begin{aligned} \therefore C &= P(1+r)^n \\ &= ৮০,০০,০০০ \times \left(১ + \frac{৩}{১০০} \right)^3 \text{ জন} \\ &= ৮০,০০,০০০ \times \frac{১০৩}{১০০} \times \frac{১০৩}{১০০} \times \frac{১০৩}{১০০} \text{ জন} \\ &= ৮ \times ১০৩ \times ১০৩ \times ১০৩ \text{ জন} \\ &= ৮৭৪১৮১৬ \text{ জন} \end{aligned}$$

∴ ৩ বছর পর শহরটির জনসংখ্যা হবে ৮৭,৪১,৮১৬ জন।

উদাহরণ ৫। মনোয়ারা বেগম তার পারিবারিক প্রয়োজনে ৬% হারে x টাকা এবং ৪% হারে y টাকা ঋণ নিল। সে মোট ৫৬০০০ টাকা ঋণ নিল এবং বছর শেষে ২৮৪০ টাকা মুনাফা শোধ করল।

ক. সম্পূর্ণ ঋণের ওপর ৫% মুনাফা প্রযোজ্য হলে বার্ষিক মুনাফা কত?

খ. x এবং y এর মান নির্ণয় কর।

গ. সম্পূর্ণ ঋণের ওপর ৫% চক্রবৃদ্ধি মুনাফা প্রযোজ্য হলে ২ বছর পর মনোয়ারা বেগমকে কত টাকা মুনাফা পরিশোধ করতে হবে?

সমাধান : (ক) মোট ঋণের পরিমাণ, $P = ৫৬০০০$ টাকা

মুনাফার হার, $r = ৫\%$

সময়, $n = ১$ বছর

$$\begin{aligned}\text{এখন, মুনাফা } I &= Pnr \\ &= (৫৬০০০ \times ১ \times \frac{৫}{১০০}) \\ &= ২৮০০ \text{ টাকা}\end{aligned}$$

$\therefore$ নির্ণেয় বার্ষিক মুনাফা ২৮০০ টাকা

$$\begin{aligned}\text{(খ) } ৬\% \text{ হার মুনাফায় } x \text{ টাকার বার্ষিক মুনাফা} &= (x \times ১ \times \frac{৬}{১০০}) \text{ টাকা} \\ &= \frac{৬x}{১০০} \text{ টাকা}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{আবার } ৮\% \text{ হার মুনাফায় } y \text{ টাকার বার্ষিক মুনাফা} &= (y \times ১ \times \frac{৮}{১০০}) \text{ টাকা} \\ &= \frac{৮y}{১০০} \text{ টাকা}\end{aligned}$$

এখন উদ্দীপকের তথ্যানুসারে $x+y = ৫৬০০০ \dots\dots(i)$

$$\begin{aligned}\text{এবং } \frac{৬x}{১০০} + \frac{৮y}{১০০} &= ২৮৮০ \\ \text{বা } ৬x + ৮y &= ২৮৮০০০ \\ \text{বা } ৩x + ২y &= ১৪২০০০ \dots\dots(ii)\end{aligned}$$

এখন, (i) নং সমীকরণকে ৩ দ্বারা গুন করে গুণফল থেকে

$$\begin{aligned}\text{(ii) নং সমীকরণ বিয়োগ করি } ৩x + ৩y &= ১৬৮০০০ \\ ৩x + ২y &= ১৪২০০০ \\ \hline y &= ২৬০০০\end{aligned}$$

y এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই $x = ৩০,০০০$

$\therefore X = ৩০,০০০$ এবং $Y = ২৬,০০০$

(গ) মনোয়ারা বেগমের ঋণের পরিমাণ $P = ৫৬,০০০$ টাকা

মুনাফার হার, $r = ৫\%$

সময়, $n = ২$ বছর

এখন, চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বদ্ধিমূল $= P (1 + r)^n$

$$\begin{aligned} \therefore ২ \text{ বছর পর মনোয়ারার ঋণের সর্বদ্ধিমূল} &= ৫৬০০০ (1 + \frac{৫}{১০০})^২ \text{ টাকা} \\ &= ৫৬০০০ \times (1.০৫)^২ \text{ টাকা} \\ &= ৫৬০০০ \times (১.০৫)^২ \text{ টাকা} \\ &= ৬১৭৪০ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{মনোয়ারা মুনাফা পরিশোধ করবেন (৬১৭৪০ - ৫৬০০০) টাকা} \\ = ৫৭৪০ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

অনুশীলনী ২.২

- ১। বার্ষিক ১০% সরল মুনাফায় ১২০০ টাকার ৪ বছরের সরল মুনাফা কত ?
ক. ১২০ টাকা খ. ২৪০ টাকা গ. ৩৬০ টাকা ঘ. ৪৮০ টাকা
- ২। বার্ষিক ১০% মুনাফায় ৮০০০ টাকার ৩ বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয় করো।
- ৩। বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা মুনাফায় ৫০০০ টাকার ৩ বছরের সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য কত হবে ?
- ৪। একই হার মুনাফায় কোনো মূলধনের এক বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন ৬৫০০ টাকা ও দুই বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন ৬৭৬০ টাকা হলে, মূলধন কত ?
- ৫। বার্ষিক শতকরা ৮.৫০ টাকা চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় ১০০০০ টাকার ২ বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফা নির্ণয় করো।
- ৬। কোনো শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ৬৪ লক্ষ। শহরটির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে ২৫ জন হলে, ২ বছর পর ঐ শহরের জনসংখ্যা কত হবে ?
- ৭। এক ব্যক্তি একটি ঋণদান সংস্থা থেকে বার্ষিক ৮% চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় ৫০০০ টাকা ঋণ নিলেন। প্রতিবছর শেষে তিনি ২০০০ টাকা করে পরিশোধ করেন। ২য় কিস্তি পরিশোধের পর তাঁর আর কত টাকা ঋণ থাকবে ?

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। ১০৫০ টাকার ৮% নিচের কোনটি ?
ক. ৮০ টাকা খ. ৮২ টাকা গ. ৮৪ টাকা ঘ. ৮৬ টাকা

২। টাকায় ৫টি দরে ক্রয় করে ৪টি দরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?

ক) লাভ ২৫% খ) ক্ষতি ২৫% গ) লাভ ২০% ঘ) ক্ষতি ২০%

৩। ১০% হার মুনাফায় ২০০ টাকার ৩ বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ৬৬ টাকা হলে—

i. সরল মুনাফা ৬০ টাকা

ii. চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় সর্বমূল্য ২৬৬ টাকা

iii. চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ও সরল মুনাফার পার্থক্য ৬ টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) i i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

জামিল সাহেব বার্ষিক ১০% মুনাফায় ব্যাংকে ২০০০ টাকা জমা রাখলেন।

উদ্দীপকের আলোকে নিচের ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৪। সরল মুনাফায় ২য় বছরান্তে মুনাফা - আসল কত হবে ?

ক. ২৪০০ টাকা খ. ২৪২০ টাকা গ. ২৪৪০ টাকা ঘ. ২৪৫০ টাকা

৫। ১ম বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত হবে ?

ক. ২০৫০ টাকা খ. ২১০০ টাকা গ. ২১৫০ টাকা ঘ. ২২০০ টাকা

সৃজনশীল প্রশ্ন

৬। একই হার চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় কোনো মূলধন এক বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন ১৯৫০০ টাকা এবং

দুই বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন ২০২৮০ টাকা হলো।

ক. মুনাফা নির্ণয়ের সূত্র লেখো।

খ. মূলধন নির্ণয় করো।

গ. একই হারে উক্ত মূলধনের জন্য ৩ বছর পর সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য নির্ণয় করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৭। (ক) ৫% হার মুনাফায় ৫০০ টাকার কত বছরের মুনাফা ২৫০ টাকা হবে?

খ) একটি পণ্য ১২% মুনাফায় ১৩৪৪ টাকায় বিক্রয় করা হলে ক্রয়মূল্য কত?

গ) শতকরা বার্ষিক কত মুনাফায় ২৫০০ টাকার ৩ বছরের মুনাফা ৬০০ টাকা হবে?

ঘ) ১২% মুনাফায় ১০০০ টাকা ব্যাংকে রাখলে ২ বছরে চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত হবে?

ঙ) কোন শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ৩০ লক্ষ এবং ঐ শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে ৩০ জন। এক বছর পরে ঐ শহরের জনসংখ্যা কত হবে?

তৃতীয় অধ্যায়

পরিমাপ

প্রাথমিক জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের আকার, আকৃতি ও ধরনের ওপর এ পরিমাপ পদ্ধতি নির্ভর করে। দৈর্ঘ্য মাপার জন্য, ওজন পরিমাপ করার জন্য ও তরল পদার্থের আয়তন বের করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতি রয়েছে। ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নির্ণয়ের জন্য দৈর্ঘ্য পরিমাপ দ্বারা তৈরি পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। আবার জনসংখ্যা, পশুপাখি, গাছপালা, নদীনালা, ঘরবাড়ি, যানবাহন ইত্যাদির সংখ্যাও আমাদের জানার প্রয়োজন হয়। গণনা করে এগুলো পরিমাপ করা হয়।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা –

- দেশীয়, ব্রিটিশ ও আন্তর্জাতিক পরিমাপ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, ওজন ও তরল পদার্থের আয়তন নির্ণয়সংবলিত সমস্যার সমাধান করতে পারবে।
- দেশীয়, ব্রিটিশ ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত পরিমাপকের সাহায্যে পরিমাপ করতে পারবে।

৩.১ পরিমাপ ও এককের ধারণা (Concept of Measure and Unit)

যেকোনো গণনায় বা পরিমাপে একক প্রয়োজন। গণনার জন্য একক হচ্ছে প্রথম স্বাভাবিক সংখ্যা ১। দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যকে ১ একক ধরা হয়। অনুরূপভাবে, ওজন পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট কোনো ওজনকে একক ধরা হয়, যাকে ওজনের একক বলে। আবার তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের এককও অনুরূপভাবে বের করা যায়। ক্ষেত্রফল পরিমাপের ক্ষেত্রে ১ একক দৈর্ঘ্যের বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গাকার ক্ষেত্রকে একক ধরা হয়। একে ১ বর্গ একক বলে। তদ্রূপ ১ একক দৈর্ঘ্যের বাহুবিশিষ্ট একটি ঘনকের ঘনফলকে ১ ঘন একক বলে। সকল ক্ষেত্রেই এককের মাধ্যমে গণনায় বা পরিমাপে সম্পূর্ণ পরিমাপের ধারণা লাভ করা যায়। কিন্তু পরিমাপের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন একক রয়েছে।

৩.২ মেট্রিক পদ্ধতিতে পরিমাপ

বিভিন্ন দেশে পরিমাপের জন্য বিভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতি প্রচলিত থাকায় আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে ও আদান-প্রদানে অসুবিধা হয়। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যে ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে পরিমাপ করার জন্য আন্তর্জাতিক রীতি তথা মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এ পরিমাপের বৈশিষ্ট্য হলো এটা দশগুণোত্তর। দশমিক ভগ্নাংশের দ্বারা এ পদ্ধতিতে পরিমাপ সহজে প্রকাশ করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে প্রথম এ পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়।

বাংলাদেশে ১লা জুলাই, ১৯৮২ সাল থেকে মেট্রিক পদ্ধতি চালু করা হয়। এখন দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, ওজন ও তরল পদার্থের আয়তন প্রতিটি পরিমাপেই এ পদ্ধতি পুরোপুরি প্রচলিত রয়েছে।

দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক মিটার। পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের দ্রাঘিমা রেখা বরাবর বিষুবরেখা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের কোটি ভাগের এক ভাগকে এক মিটার হিসেবে গণ্য করা হয়। পরবর্তী সময়ে প্যারিস মিউজিয়ামে রক্ষিত এক খণ্ড ‘প্লাটিনাম ও ইরিডিয়ামের তৈরি রড’-এর দৈর্ঘ্য এক মিটার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এ দৈর্ঘ্যকেই একক হিসেবে ধরে রৈখিক পরিমাপ করা হয়। দৈর্ঘ্যের পরিমাপ ছোট হলে সেন্টিমিটারে এবং বড় হলে কিলোমিটারে প্রকাশ করা হয়। দৈর্ঘ্যের একক মিটার থেকে মেট্রিক পদ্ধতি নামকরণ করা হয়েছে।

ওজন পরিমাপের একক গ্রাম। এটি মেট্রিক পদ্ধতির একক। কম ওজনের বস্তুকে গ্রামে এবং বেশি ওজনের বস্তুকে কিলোগ্রাম (কে.জি.)-এ প্রকাশ করা হয়।

তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক লিটার। এটি মেট্রিক পদ্ধতির একক। অল্প আয়তনের তরল পদার্থের পরিমাপে লিটার ও বেশি পরিমাপের জন্য কিলোলিটার ব্যবহার করা হয়।

মেট্রিক পদ্ধতিতে কোনো দৈর্ঘ্যকে নিম্নতর থেকে উচ্চতর অথবা উচ্চতর থেকে নিম্নতর এককে পরিবর্তিত করতে হলে, অঙ্কগুলো পাশাপাশি লিখে দশমিক বিন্দুটি প্রয়োজনমতো বামে বা ডানে সরাতে হবে।

যেমন, ৫ কি. মি. ৪ হে. মি. ৭ ডেকা.মি. ৬ মি. ৯ ডেসি.মি. ২ সে. মি. ৩ মি. মি.

$$= (৫০০০০০ + ৪০০০০০ + ৭০০০০ + ৬০০০ + ৯০০ + ২০ + ৩) \text{ মি.মি.}$$

$$= ৫৪৭৬৯২৩ \text{ মি. মি.} = ৫৪৭৬৯২.৩ \text{ সে. মি.} = ৫৪৭৬৯.২৩ \text{ ডেসি.মি.} = ৫৪৭৬.৯২৩ \text{ মি.}$$

$$= ৫৪৭.৬৯২৩ \text{ ডেকা.মি.} = ৫৪.৭৬৯২৩ \text{ হে. মি.} = ৫.৪৭৬৯২৩ \text{ কি. মি.}$$

আমরা জানি, কোনো দশমিক সংখ্যার কোনো অঙ্কের স্থানীয় মান এর সন্নিহিতবর্তী ডান অঙ্কের স্থানীয় মানের দশ গুণ এবং এর অব্যবহিত বাম অঙ্কের স্থানীয় মানের দশ ভাগের এক ভাগ। মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ওজন বা আয়তন মাপার ক্রমিক এককগুলোর মধ্যেও এরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। সুতরাং, মেট্রিক পদ্ধতিতে নিরূপিত কোনো দৈর্ঘ্য, ওজন বা আয়তনের মাপকে দশমিকের সাহায্যে সহজেই যেকোনো এককে প্রকাশ করা যায়।

নিচে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা থেকে গৃহীত স্থানীয় মানের একটি ছক দেওয়া হলো :

গ্রিক ভাষা হতে গৃহীত			একক	ল্যাটিন ভাষা হতে গৃহীত		
সহস্র	শতক	দশক		দশমাংশ	শতাংশ	সহস্রাংশ
১০০০ কিলো	১০০ হেক্টো	১০ ডেকা	১ মিটার গ্রাম লিটার	$\frac{১}{১০} = .১$ ডেসি	$\frac{১}{১০০} = .০১$ সেন্টি	$\frac{১}{১০০০} = .০০১$ মিলি

গ্রিক ভাষা থেকে গুণিতকবোধক এবং ল্যাটিন ভাষা থেকে অংশবোধক শব্দ এককের নামের আগে উপসর্গ হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে।

গ্রিক ভাষায় ডেকা অর্থ ১০ গুণ, হেক্টো অর্থ ১০০ গুণ এবং কিলো অর্থ ১০০০ গুণ। ল্যাটিন ভাষায় ডেসি অর্থ দশমাংশ, সেন্টি অর্থ শতাংশ এবং মিলি অর্থ সহস্রাংশ।

৩.৩ দৈর্ঘ্য পরিমাপের এককাবলি

মেট্রিক পদ্ধতি	ব্রিটিশ পদ্ধতি
১০ মিলিমিটার (মি. মি.) = ১ সেন্টিমিটার (সে. মি.)	১২ ইঞ্চি = ১ ফুট
১০ সেন্টিমিটার = ১ ডেসিমিটার (ডেসি.মি.)	৩ ফুট = ১ গজ
১০ ডেসিমিটার = ১ মিটার (মি.)	১৭৬০ গজ = ১ মাইল
১০ মিটার = ১ ডেকামিটার (ডেকা.মি.)	৬০৮০ ফুট = ১ নটিকেল মাইল
১০ ডেকামিটার = ১ হেক্টোমিটার (হে. মি.)	২২০ গজ = ১ ফার্লং
১০ হেক্টোমিটার = ১ কিলোমিটার (কি. মি.)	৮ ফার্লং = ১ মাইল

দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক : মিটার

৩.৪ মেট্রিক ও ব্রিটিশ পরিমাপের সম্পর্ক

১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সে. মি. (প্রায়)	১ মিটার = ৩৯.৩৭ ইঞ্চি (প্রায়)
১ গজ = ০.৯১৪৪ মি.(প্রায়)	১ কি. মি. = ০.৬২ মাইল (প্রায়)
১ মাইল = ১.৬১ কি. মি. (প্রায়)	

মেট্রিক ও ব্রিটিশ পরিমাপের সম্পর্ক সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই এ সম্পর্ক আসন্ন মান হিসেবে কয়েক দশমিক স্থান পর্যন্ত মান নিয়ে প্রকাশ করা হয়।

ছোট দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য স্কেল ব্যবহৃত হয়। বড় দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য ফিতা ব্যবহার করা হয়। ফিতা ৩০ মিটার বা ১০০ ফুট লম্বা হয়ে থাকে।

কাজ :

- ১। স্কেল দিয়ে তোমার বেঞ্চটির দৈর্ঘ্য ইঞ্চি ও সেন্টিমিটারে মাপ। এ হতে ১ মিটার সমান কত ইঞ্চি তা নির্ণয় করো।
- ২। উপরের সম্পর্ক হতে ১ মাইল সমান কত কিলোমিটার তা-ও নির্ণয় করো।

উদাহরণ ১। একজন দৌড়বিদ ৪০০ মিটারবিশিষ্ট গোলাকার ট্র্যাকে ২৪ চক্কর দৌড়ালে, সে কত দূরত্ব দৌড়াল ?

সমাধান : ১ চক্কর দৌড়ালে ৪০০ মিটার হয় ।

∴ ২৪ চক্কর দৌড়ালে দূরত্ব হবে (৪০০×২৪) মিটার বা ৯৬০০ মিটার বা ৯ কিলোমিটার ৬০০ মিটার ।

অতএব, দৌড়বিদ ৯ কিলোমিটার ৬০০ মিটার দৌড়াল ।

৩.৫ ওজন পরিমাপ

প্রত্যেক বস্তুর ওজন আছে । বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন এককের সাহায্যে বস্তু ওজন করা হয় ।

ওজন পরিমাপের মেট্রিক এককাবলি

১০ মিলিগ্রাম (মি. গ্রা.)	= ১ সেন্টিগ্রাম (সে. গ্রা.)
১০ সেন্টিগ্রাম	= ১ ডেসিগ্রাম (ডেসিগ্রা.)
১০ ডেসিগ্রাম	= ১ গ্রাম (গ্রা.)
১০ গ্রাম	= ১ ডেকাগ্রাম (ডেকা গ্রা.)
১০ ডেকাগ্রাম	= ১ হেক্টোগ্রাম (হে. গ্রা.)
১০ হেক্টোগ্রাম	= ১ কিলোগ্রাম (কে. জি.)

ওজন পরিমাপের একক : গ্রাম	১ কিলোগ্রাম বা ১ কে.জি. = ১০০০ গ্রাম
--------------------------	--------------------------------------

মেট্রিক পদ্ধতিতে ওজন পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত আরও দুইটি একক আছে । অধিক পরিমাণ বস্তুর ওজন পরিমাপের জন্য কুইন্টাল ও মেট্রিক টন একক দুইটি ব্যবহার করা হয় ।

১০০ কিলোগ্রাম	= ১ কুইন্টাল
১০০০ কিলোগ্রাম	= ১ মেট্রিক টন

কাজ :

- ১। দাগকাটা ব্যালেন্স দ্বারা তোমরা তোমাদের ৫টি বইয়ের ওজন বের করো ।
- ২। ডিজিটাল ব্যালেন্সের সাহায্যে তোমাদের ওজন নির্ণয় করো ।

উদাহরণ ২। ১ মেট্রিক টন চাল ৬৪ জন শ্রমিকের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কী পরিমাণ চাল পাবে ?

সমাধান : ১ মেট্রিক টন = ১০০০ কেজি

৬৪ জন শ্রমিক পায় ১০০০ কেজি চাল

$$\therefore ১ ,, ,, ,, \frac{১০০০}{৬৪} \text{ কেজি চাল}$$

$$= ১৫.৬২৫ \text{ কেজি চাল}$$

$$= ১৫ \text{ কেজি } ৬২৫ \text{ গ্রাম চাল}$$

$\therefore$ প্রত্যেক শ্রমিক ১৫ কেজি ৬২৫ গ্রাম চাল পাবে।

৩.৬ তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ

কোনো তরল পদার্থ কোনো ধারকের যতখানি জায়গা নিয়ে থাকে তা এর আয়তন। একটি ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে। কিন্তু কোনো তরল পদার্থের নির্দিষ্টভাবে তা নেই। যে পাত্রে তরল পদার্থ রাখা হয় তা সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। যার কারণে তরল পদার্থের আয়তন মাপার জন্য নির্দিষ্ট কোনো ঘনবস্তুর আকৃতির মাপনি বা কাপ ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে আমরা সাধারণত লিটার মাপনি ব্যবহার করি। তবে বর্তমান বাজারে মিলিলিটার এককে দাগাঙ্কিত নির্দিষ্ট পরিমাপের কাপ, আয়তন মাপক চোঙ, কোণক আকৃতির পাত্র বা সিলিন্ডার আকৃতির মগ পাওয়া যায় যা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, স্বচ্ছ কাচ, অ্যালুমিনিয়াম বা টিনের শিট দ্বারা তৈরি থাকে। এছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে তরল পদার্থের আয়তন মাপার ক্ষেত্রে গিল, পিন্ট, কোয়ার্ট, গ্যালন, তরল আউন্স ইত্যাদি মাপনিও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাধারণত দুধ, অ্যালকোহল, তেল এবং অন্যান্য তরল পদার্থ মাপারক্ষেত্রে উল্লিখিত পাত্রগুলো ব্যবহার করা হয়। ক্রেতা-বিক্রেতার সুবিধার্থে বর্তমানে ভোজ্যতেল, খাবার পানি, কোমল পানীয়, মেশিন তেল ইত্যাদি মিলিলিটার বা লিটারে বোতলজাত করে বিক্রি করা হচ্ছে।

তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের মেট্রিক এককাবলি

১০ মিলিলিটার (মি. লি.)	= ১ সেন্টিলিটার (সে. লি.)
১০ সেন্টিলিটার	= ১ ডেসিলিটার (ডেসিলি.)
১০ ডেসিলিটার	= ১ লিটার (লি.)
১০ লিটার	= ১ ডেকালিটার (ডেকালি.)
১০ ডেকালিটার	= ১ হেক্টোলিটার (হে. লি.)
১০ হেক্টোলিটার	= ১ কিলোলিটার (কি. লি.)

তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক : লিটার

মন্তব্য : ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১ ঘন সেন্টিমিটার (Cubic Centimetre) বিশুদ্ধ পানির ওজন ১ গ্রাম। Cubic Centimetre কে সংক্ষেপে ইংরেজিতে c. c. (সি.সি.) লেখা হয়।

১ লিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন ১ কিলোগ্রাম

মেট্রিক এককাবলিতে যেকোনো একটি পরিমাপের এককাবলি জানা থাকলে অপরগুলো সহজে মনে রাখা যায়। দৈর্ঘ্যের এককাবলি জানা থাকলে ওজন ও তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের এককগুলো শুধু মিটারের জায়গায় 'গ্রাম' বা 'লিটার' বসালেই পাওয়া যায়।

কাজ :

- ১। তোমার পানীয় জলের পাত্রের ধারণক্ষমতা কত সি. সি. পরিমাপ কর এবং তা ঘন ইঞ্চিতে প্রকাশ করো।
- ২। শিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত অজানা আয়তনের একটি পাত্রের আয়তন অনুমান কর। তারপর এর সঠিক আয়তন বের করে ভুলের পরিমাণ নির্ণয় করো।

উদাহরণ ৩। একটি চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য ৩ মিটার, প্রস্থ ২ মিটার ও উচ্চতা ৪ মিটার। এতে কত লিটার এবং কত কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ পানি ধরবে ?

সমাধান : চৌবাচ্চাটির দৈর্ঘ্য = ৩ মিটার, প্রস্থ = ২ মিটার এবং উচ্চতা = ৪ মিটার

$$\begin{aligned}\therefore \text{চৌবাচ্চাটির আয়তন} &= (৩ \times ২ \times ৪) \text{ ঘন মি.} = ২৪ \text{ ঘন মি.} \\ &= ২৪০০০০০০ \text{ ঘন সে. মি} \\ &= ২৪০০০ \text{ লিটার} \quad [১০০০ \text{ ঘন সে. মি.} = ১ \text{ লিটার}]\end{aligned}$$

১ লিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন ১ কিলোগ্রাম।

$\therefore$ ২৪০০০ লিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন ২৪০০০ কিলোগ্রাম।

অতএব, চৌবাচ্চাটিতে ২৪০০০ লিটার বিশুদ্ধ পানি ধরবে এবং এর ওজন ২৪০০০ কিলোগ্রাম।

৩.৭ ক্ষেত্রফল পরিমাপ

আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের পরিমাপ = দৈর্ঘ্যের পরিমাপ $\times$ প্রস্থের পরিমাপ

বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের পরিমাপ = (বাহুর পরিমাপ)^২

ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের পরিমাপ = $\frac{১}{২} \times$ ভূমির পরিমাপ $\times$ উচ্চতার পরিমাপ

ক্ষেত্রফল পরিমাপের একক : বর্গমিটার

ক্ষেত্রফল পরিমাপে মেট্রিক এককাবলি

১০০ বর্গসেন্টিমিটার (ব. সে. মি.)	=	১ বর্গডেসিমিটার (ব. ডেসিমি.)
১০০ বর্গডেসিমিটার	=	১ বর্গমিটার (ব. মি.)
১০০ বর্গমিটার	=	১ এয়র (বর্গডেকামিটার)
১০০ এয়র (বর্গডেকামিটার)	=	১ হেক্টর বা ১ বর্গহেক্টোমিটার
১০০ বর্গহেক্টোমিটার	=	১ বর্গকিলোমিটার

ক্ষেত্রফল পরিমাপে ব্রিটিশ এককাবলি

১৪৪ বর্গইঞ্চি	=	১ বর্গফুট
৯ বর্গফুট	=	১ বর্গগজ
৪৮৪০ বর্গগজ	=	১ একর
১০০ শতক (ডেসিম্নল)	=	১ একর

ক্ষেত্রফল পরিমাপে দেশীয় এককাবলি

১ বর্গহাত	=	১ গণ্ডা
২০ গণ্ডা	=	১ ছটাক
১৬ ছটাক	=	১ কাঠা
২০ কাঠা	=	১ বিঘা

ক্ষেত্রফল পরিমাপে মেট্রিক ও ব্রিটিশ পদ্ধতির সম্পর্ক

১ বর্গসেন্টিমিটার	=	০.১৬ বর্গইঞ্চি (প্রায়)
১ বর্গমিটার	=	১০.৭৬ বর্গফুট (প্রায়)
১ হেক্টর	=	২.৪৭ একর (প্রায়)
১ বর্গইঞ্চি	=	৬.৪৫ বর্গসেন্টিমিটার (প্রায়)
১ বর্গফুট	=	৯২৯ বর্গসেন্টিমিটার (প্রায়)
১ বর্গগজ	=	০.৮৪ বর্গমিটার (প্রায়)
১ বর্গমাইল	=	৬৪০ একর

ক্ষেত্রফল পরিমাপে মেট্রিক, ব্রিটিশ ও দেশীয় এককগুলির সম্পর্ক

১ বর্গহাত	=	৩২৪ বর্গইঞ্চি
১ বর্গগজ বা ৪ গণ্ডা	=	৯ বর্গফুট = ০.৮৩৬ বর্গমিটার (প্রায়)
১ কাঠা	=	৭২০ বর্গফুট = ৮০ বর্গগজ = ৬৬.৮৯ বর্গমিটার (প্রায়)
১ বিঘা	=	১৬০০ বর্গগজ = ১৩৩৭.৮ বর্গমিটার (প্রায়)
১ একর	=	৩ বিঘা ৮ ছটাক = ৪০৪৬.৮৬ বর্গমিটার (প্রায়)
১ শতক	=	৪৩৫.৬ বর্গফুট = ১০০০ বর্গকড়ি (১০০ কড়ি = ৬৬ ফুট)
১ বর্গমাইল	=	১৯৩৬ বিঘা
১ বর্গমিটার	=	৪.৭৮ গণ্ডা (প্রায়) = ০.২৩৯ ছটাক (প্রায়)
১ এয়র	=	২৩.৯ ছটাক (প্রায়)

কাজ :

- ১। স্কেল দিয়ে তোমার একটি বইয়ের ও পড়ার টেবিলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইঞ্চি ও সেন্টিমিটারে মেপে উভয় এককে এদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। এ থেকে ১ বর্গইঞ্চি ও ১ বর্গসেন্টিমিটারের সম্পর্ক বের করো।
- ২। দলগতভাবে তোমরা বেঞ্চ, টেবিল, দরজা, জানালা ইত্যাদির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ স্কেলের সাহায্যে ইঞ্চি ও সেন্টিমিটারে মেপে এগুলোর ক্ষেত্রফল বের করো।

উদাহরণ ৪। ১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার এবং ১ একর = ৪৮৪০ বর্গগজ। ১ একরে কত বর্গমিটার?

সমাধান : ১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সে. মি.

$$\therefore ৩৬ ইঞ্চি বা ১ গজ = ২.৫৪ \times ৩৬ \text{ সে. মি.}$$

$$= ৯১.৪৪ \text{ সে. মি.}$$

$$= \frac{৯১.৪৪}{১০০} \text{ মিটার} = ০.৯১৪৪ \text{ মিটার}$$

$$\therefore ১ গজ \times ১ গজ = ০.৯১৪৪ \text{ মিটার} \times ০.৯১৪৪ \text{ মিটার}$$

$$\text{বা, } ১ \text{ বর্গগজ} = ০.৮৩৬১২৭৩৬ \text{ বর্গমিটার}$$

$$\therefore ৪৮৪০ \text{ বর্গগজ} = ০.৮৩৬১২৭৩৬ \times ৪৮৪০ \text{ বর্গমিটার}$$

$$= ৪০৪৬.৮৫৬৪২২৪০$$

$$= ৪০৪৬.৮৬ \text{ ব. মি. (প্রায়)}$$

$$\therefore ১ \text{ একর} = ৪০৪৬.৮৬ \text{ ব. মি. (প্রায়)}।$$

উদাহরণ ৫। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের এলাকা ৭০০ একর। একে নিকটতম পূর্ণসংখ্যক হেক্টরে প্রকাশ করো।

সমাধান : ২.৪৭ একর = ১ হেক্টর

$$\therefore ১ \text{ ,, } = \frac{১}{২.৪৭} \text{ ,,}$$

$$\therefore ৭০০ \text{ ,, } = \frac{১ \times ৭০০ \times ১০০}{২৪৭} \text{ হেক্টর } = ২৮৩.৪ \text{ হেক্টর}$$

অতএব, নির্ণেয় এলাকা ২৮৩ হেক্টর (প্রায়)।

উদাহরণ ৬। একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার এবং প্রস্থ ৩০ মিটার ৩০ সে. মি.। ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত?

সমাধান : ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য = ৪০ মিটার = (৪০ × ১০০) সে.মি. = ৪০০০ সে. মি.।

এবং প্রস্থ = ৩০ মিটার ৩০ সে. মি.

$$= (৩০ \times ১০০) \text{ সে. মি. } + ৩০. \text{সে. মি.}$$

$$= ৩০৩০ \text{ সে. মি.}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} = (৪০০০ \times ৩০৩০) \text{ বর্গ সে. মি.} = ১২১২০০০০ \text{ বর্গ সে. মি.}$$

$$= ১২১২ \text{ বর্গমিটার} = ১২ \text{ এর } ১২ \text{ বর্গমিটার।}$$

অতএব, ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল ১২ এর ১২ বর্গমিটার।

৩.৮ আয়তন

ঘনবস্তুর ঘনফলই আয়তন

আয়তাকার ঘনবস্তুর আয়তনের পরিমাপ = দৈর্ঘ্যের পরিমাপ × প্রস্থের পরিমাপ × উচ্চতার পরিমাপ

দৈর্ঘ্যের পরিমাপ, প্রস্থের পরিমাপ ও উচ্চতার পরিমাপ একই এককে প্রকাশ করে আয়তনের পরিমাপ ঘন এককে নির্ণয় করা হয়। দৈর্ঘ্য ১ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ১ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা ১ সেন্টিমিটারবিশিষ্ট বস্তুর আয়তন ১ ঘন সেন্টিমিটার।

আয়তন পরিমাপে মেট্রিক এককাবলি

১০০০ ঘন সেন্টিমিটার (ঘন সে. মি.)	=	১ ঘন ডেসিমিটার (ঘ. ডেসি.মি.) = ১ লিটার
১০০০ ঘন ডেসিমিটার	=	১ ঘন মিটার (ঘ.মি.)
১ ঘন মিটার	=	১ স্টেয়ার
১০ ঘন স্টেয়ার	=	১ ডেকা স্টেয়ার
১ ঘন সে.মি. (সি.সি.) = ১ মিলিলিটার		১ ঘনইঞ্চি = ১৬.৩৯ মিলিলিটার (প্রায়)

১ স্টেয়ার	=	৩৫.৩ ঘনফুট (প্রায়)
১ ডেকাস্টেয়ার	=	১৩.০৮ ঘনগজ (প্রায়)
১ ঘনফুট	=	২৮.৬৭ লিটার (প্রায়)

- ১। তোমার সবচেয়ে মোটা বইটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মেপে এর ঘনফল নির্ণয় করো।
- ২। শ্রেণিশিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত অজানা আয়তনের একটি বাক্সের আয়তন অনুমান করো। তারপর এর সঠিক আয়তন বের করে ভুলের পরিমাণ নির্ণয় করো।

সমাধান :

বাক্সের দৈর্ঘ্য = ২ মিটার = ২০০ সে. মি.

প্রস্থ = ১ মিটার ৫০ সে. মি. = ১৫০ সে. মি.

এবং উচ্চতা = ১ মিটার = ১০০ সে. মি.

∴ বাক্সটির আয়তন = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা

= (২০০ × ১৫০ × ১০০) ঘন সে. মি.

= ৩০০০০০০ ঘন সে. মি.

= ৩ ঘনমিটার

$$\begin{aligned}\therefore \text{বারুটির আয়তন} &= \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} \times \text{উচ্চতা} \\ &= \left(2 \times \frac{3}{2} \times 1\right) \text{ঘনমিটার} \\ &= 3 \text{ ঘনমিটার}\end{aligned}$$

উদাহরণ ৮। একটি চৌবাচ্চায় ৮০০০ লিটার পানি ধরে। চৌবাচ্চাটির দৈর্ঘ্য ২.৫৬ মিটার এবং প্রস্থ ১.২৫ মিটার হলে, গভীরতা কত ?

$$\begin{aligned}
 \text{সমাধান : চৌবাচ্চাটির তলার ক্ষেত্রফল} &= ২.৫৬ \text{ মিটার} \times ১.২৫ \text{ মিটার} \\
 &= ২.৫৬ \text{ সে. মি.} \times ১.২৫ \text{ সে. মি.} \\
 &= ৩২০০০ \text{ বর্গ সে. মি.}
 \end{aligned}$$

চৌবাচ্চায় ৮০০০ লিটার বা ৮০০০×১০০০ ঘন সে. মি. পানি ধরে। [১০০০ ঘন সে. মি. = ১ লিটার]
 অতএব, চৌবাচ্চাটির আয়তন ৮০০০০০০ ঘন সে. মি

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{চৌবাচ্চাটির গভীরতা} &= \frac{৮০০০০০০}{৩২০০০} \text{ সে. মি.} = ২৫০ \text{ সে. মি.} \\
 &= ২.৫ \text{ মিটার।}
 \end{aligned}$$

বিকল্প পদ্ধতি :

$$\begin{aligned}
 \text{চৌবাচ্চাটির তলার ক্ষেত্রফল} &= ২.৫৬ \text{ মিটার} \times ১.২৫ \text{ মিটার} \\
 &= ৩.২ \text{ বর্গ মি.}
 \end{aligned}$$

চৌবাচ্চায় ৮০০০ লিটার বা ৮০০০×১০০০ ঘন সে. মি. পানি ধরে।

$$\therefore \text{চৌবাচ্চাটির আয়তন} = \frac{৮০০০ \times ১০০০}{১০০০০০০} \text{ ঘন মি.} = ৮ \text{ ঘন মিটার} \quad [১ \text{ ঘন মি.} = ১০০০০০০ \text{ ঘন সে. মি.}]$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{চৌবাচ্চাটির গভীরতা} &= \frac{৮}{৩.২} \text{ মিটার} \\
 &= ২.৫ \text{ মিটার।}
 \end{aligned}$$

উদাহরণ ৯। একটি ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ৩ গুণ। প্রতি বর্গমিটারে ৭.৫০ টাকা দরে ঘরটির মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে মোট ১১০২.৫০ টাকা ব্যয় হয়। ঘরটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো।

সমাধান : ৭.৫০ টাকা খরচ হয় ১ বর্গমিটারে

$$\begin{aligned}
 \therefore ১ \text{ ,, ,, ,, } \frac{১}{৭.৫০} \text{ বর্গমিটারে} \\
 \therefore ১১০২.৫০ \text{ ,, ,, ,, } \frac{১ \times ১১০২.৫}{৭.৫০} \text{ বর্গমিটারে} \\
 = ১৪৭ \text{ বর্গমিটারে}
 \end{aligned}$$

অর্থাৎ, ঘরের ক্ষেত্রফল ১৪৭ বর্গমিটার।

মনে করি, প্রস্থ = ক মিটার

$$\therefore \text{দৈর্ঘ্য} = ৩ক \text{ মিটার}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ক্ষেত্রফল} &= (\text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ}) \text{ বর্গ একক} \\ &= (৩ক \times ক) \text{ বর্গমিটার} = ৩ক^2 \text{ বর্গমিটার}\end{aligned}$$

শর্তানুসারে,

$$৩ক^2 = ১৪৭$$

$$\text{বা, } ক^2 = \frac{১৪৭}{৩}$$

$$\text{বা, } ক^2 = ৪৯$$

$$\therefore ক = \sqrt{৪৯} = ৭$$

অতএব, প্রস্থ = ৭ মিটার,

এবং দৈর্ঘ্য = (৩ × ৭) মিটার বা ২১ মিটার।

উদাহরণ ১০। বায়ু পানির তুলনায় ০.০০১২৯ গুণ ভারী। একটি ঘরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ১৬ মিটার, ১২ মিটার ও ৪ মিটার। ঘরটিতে কত কিলোগ্রাম বায়ু আছে?

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : ঘরটির আয়তন} &= \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} \times \text{উচ্চতা} \\ &= ১৬ \text{ মি.} \times ১২ \text{ মি.} \times ৪ \text{ মি.} \\ &= ৭৬৮ \text{ ঘনমিটার} \\ &= ৭৬৮ \times ১০০০০০০ \text{ ঘন সে.মি.} \\ &= ৭৬৮০০০০০০ \text{ ঘন সে.মি.}\end{aligned}$$

বায়ু পানির তুলনায় ০.০০১২৯ গুণ ভারী।

$$\therefore ১ \text{ ঘন সে. মি. বায়ুর ওজন} = ০.০০১২৯ \text{ গ্রাম}$$

$$\begin{aligned}\text{অতএব, ঘরটিতে বায়ুর পরিমাণ} &= ৭৬৮০০০০০০ \times ০.০০১২৯ \text{ গ্রাম} \\ &= ৯৯০৭২০ \text{ গ্রাম} \\ &= ৯৯০.৭২ \text{ কিলোগ্রাম}\end{aligned}$$

$\therefore$ ঘরটিতে ৯৯০.৭২ কিলোগ্রাম বায়ু আছে।

উদাহরণ ১১। ২১ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ মিটার প্রস্থ একটি বাগানের বাইরে চারদিকে ২ মিটার প্রশস্ত একটি রাস্তা আছে। প্রতি বর্গমিটারে ২.৭৫ টাকা দরে রাস্তাটিতে ঘাস লাগাতে মোট কত খরচ হবে?

সমাধান :

রাস্তাসহ বাগানের দৈর্ঘ্য = ২১ মি. + (২ + ২) মি. = ২৫ মিটার

,, ,, প্রস্থ = ১৫ মি. + (২ + ২) মি. = ১৯ মিটার


রাস্তাসহ বাগানের ক্ষেত্রফল = (২৫ × ১৯) বর্গমিটার
= ৪৭৫ বর্গমিটার

রাস্তাবাদে বাগানের ক্ষেত্রফল = (২১ × ১৫) বর্গমিটার
= ৩১৫ বর্গমিটার

∴ রাস্তার ক্ষেত্রফল = (৪৭৫ - ৩১৫) বর্গমিটার
= ১৬০ বর্গমিটার

ঘাস লাগানোর মোট খরচ = (১৬০ × ২.৭৫) টাকা
= ৪৪০.০০ টাকা

অতএব, ঘাস লাগানোর মোট খরচ ৪৪০ টাকা।



উদাহরণ ১২। ৪০ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ৩০ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট একটি মাঠের ঠিক মাঝে আড়াআড়িভাবে ১.৫ মিটার প্রশস্ত দুইটি রাস্তা আছে। রাস্তা দুইটির মোট ক্ষেত্রফল কত ?

সমাধান : দৈর্ঘ্য বরাবর রাস্তাটির ক্ষেত্রফল = ৪০ × ১.৫ বর্গমিটার
= ৬০ বর্গমিটার

প্রস্থ বরাবর রাস্তাটির ক্ষেত্রফল = (৩০ - ১.৫) × ১.৫ বর্গমিটার
= ২৮.৫ × ১.৫ বর্গমিটার
= ৪২.৭৫ বর্গমিটার

অতএব, রাস্তাদ্বয়ের ক্ষেত্রফল = (৬০ + ৪২.৭৫) বর্গমিটার
= ১০২.৭৫ বর্গমিটার

∴ রাস্তাদ্বয়ের মোট ক্ষেত্রফল ১০২.৭৫ বর্গমিটার।



উদাহরণ ১৩। ২০ মিটার দীর্ঘ একটি কামরার মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে ৭৫০০ টাকা খরচ হয়।

যদি ঐ কামরাটির প্রস্থ ৪ মিটার কম হতো, তবে ৬০০০ টাকা খরচ হতো। কামরাটির প্রস্থ কত ?

সমাধান : কামরার দৈর্ঘ্য ২০ মিটার। প্রস্থ ৪ মিটার কমলে ক্ষেত্রফল কমে (২০ মিটার × ৪ মিটার)
= ৮০ বর্গমিটার

ক্ষেত্রফল ৮০ বর্গমিটার কমার জন্য খরচ কমে (৭৫০০ – ৬০০০) টাকা
= ১৫০০ টাকা

১৫০০ টাকা খরচ হয় ৮০ বর্গমিটারে

$$\therefore ১ \text{ ,, ,, ,, } = \frac{৮০}{১৫০০} \text{ ,, }$$

$$\therefore ৭৫০০ \text{ ,, ,, ,, } = \frac{৮০ \times ৭৫০০}{১৫০০} \text{ ,, বা } ৪০০ \text{ বর্গমিটারে}$$

অতএব, কামরার ক্ষেত্রফল ৪০০ বর্গমিটার।


$$\begin{aligned} \therefore \text{কামরাটির প্রস্থ} &= \frac{\text{ক্ষেত্রফল}}{\text{দৈর্ঘ্য}} \\ &= \frac{৪০০}{২০} \text{ মিটার} \\ &= ২০ \text{ মিটার} \end{aligned}$$

$\therefore$ কামরাটির প্রস্থ ২০ মিটার।

উদাহরণ ১৪। একটি ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য ৪ মিটার এবং প্রস্থ ৩.৫ মিটার। ঘরটির উচ্চতা ৩ মিটার এবং এর দেয়ালগুলো ১৫ সে. মি. পুরু হলে, চার দেয়ালের আয়তন কত ?

সমাধান : দেয়ালের পুরুত্ব ১৫ সে.মি. = $\frac{১৫}{১০০} = ০.১৫$ মিটার

চিত্রানুসারে, দৈর্ঘ্যের দিকে ২টি দেয়ালের



$$\begin{aligned} \text{আয়তন} &= (৪ + ২ \times ০.১৫) \times ৩ \times ০.১৫ \times ২ \text{ ঘনমিটার} = ৪.৩ \times ৩ \times ০.১৫ \times ২ \text{ ঘনমিটার} \\ &= ৩.৮৭ \text{ ঘনমিটার} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এবং প্রস্থের দিকে ২টি দেয়ালের আয়তন} &= ৩.৫ \times ৩ \times ০.১৫ \times ২ \text{ ঘনমিটার} \\ &= ৩.১৫ \text{ ঘনমিটার} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{দেয়ালগুলোর মোট আয়তন} &= (৩.৮৭ + ৩.১৫) \text{ ঘনমিটার} \\ &= ৭.০২ \text{ ঘনমিটার} \end{aligned}$$

$\therefore$ নির্ণেয় আয়তন ৭.০২ ঘনমিটার।

উদাহরণ ১৫। একটি ঘরের ৩টি দরজা এবং ৬টি জানালা আছে। প্রত্যেকটি দরজা ২ মিটার দৈর্ঘ্যের ও ১.২৫ মিটার প্রস্থের; প্রত্যেক জানালা ১.২৫ মিটার দৈর্ঘ্যের ও ১ মিটার প্রস্থের। ঐ ঘরের দরজা জানালা তৈরি করতে ৫ মিটার দৈর্ঘ্যের এবং ০.৬০ মিটার প্রস্থের কয়টি তক্তার প্রয়োজন ?

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : ৩টি দরজার ক্ষেত্রফল} &= (২ \times ১.২৫) \times ৩ \text{ বর্গমিটার} \\ &= ৭.৫ \text{ বর্গমিটার}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{৬টি জানালার ক্ষেত্রফল} &= (১.২৫ \times ১) \times ৬ \text{ বর্গমিটার} \\ &= ৭.৫ \text{ বর্গমিটার}\end{aligned}$$

$$\text{দরজা ও জানালার মোট ক্ষেত্রফল} = (৭.৫ + ৭.৫) \text{ বর্গমিটার} = ১৫ \text{ বর্গমিটার}$$

$$\text{একটি তক্তার ক্ষেত্রফল} = (৫ \times ০.৬) \text{ বর্গমিটার} = ৩ \text{ বর্গমিটার}$$

$$\begin{aligned}\text{নির্ণেয় তক্তার সংখ্যা} &= \text{দরজা ও জানালার মোট ক্ষেত্রফল} \div \text{তক্তার ক্ষেত্রফল} \\ &= (১৫ \div ৩) \text{ টি} \\ &= ৫ \text{ টি}\end{aligned}$$

উদাহরণ ১৬। একটি আয়তাকার লোহার টুকরার দৈর্ঘ্য ৮.৮ সে. মি, প্রস্থ ৬ সে.মি ও উচ্চতা ২.৫ সে. মি.। লোহার টুকরাটিকে ১৫ সে.মি. দৈর্ঘ্য, ৬.৫ সে.মি. প্রস্থ ও ৪ সে.মি. উচ্চতার আয়তাকার পাত্রে রেখে পানি দ্বারা পূর্ণ করা হলো। লোহা পানির তুলনায় ৭.৫ গুণ ভারী।

ক. পানির পাত্রের আয়তন নির্ণয় করো।

খ. লোহার টুকরার ওজন নির্ণয় করো।

গ. পাত্রটি পানিপূর্ণ অবস্থায় লোহার টুকরাটি তুলে আনা হলে, পাত্রের পানির উচ্চতা কত হবে?

সমাধান : (ক) পানির পাত্রটির দৈর্ঘ্য ১৫ সে.মি.

প্রস্থ ৬.৫ সে.মি.

এবং উচ্চতা ৪ সে.মি.

$$\therefore \text{পানির পাত্রটির আয়তন} = (১৫ \times ৬.৫ \times ৪) \text{ ঘন সে.মি.}$$

$$= ৩৯০ \text{ ঘন সে.মি.}$$

(খ) লোহার টুকরাটির দৈর্ঘ্য ৮.৮ সে.মি.

প্রস্থ ৬ সে.মি.

এবং উচ্চতা ২.৫ সে.মি.

$$\text{লোহার টুকরাটির আয়তন} = (৮.৮ \times ৬ \times ২.৫)$$

$$= ১৩২ \text{ ঘন সে.মি.}$$

আমরা জানি,

১ ঘন সে.মি. পানির ওজন ১ গ্রাম

এবং দেওয়া আছে লোহা পানির তুলনায় ৭.৫ গুণ ভারী

- ∴ ১ ঘন সে.মি. লোহার ওজন (১×৭.৫) গ্রাম
 ∴ ১৩২ ঘন সে.মি. লোহার ওজন (৭.৫×১৩২) গ্রাম
 $= ৯৯০$ গ্রাম
 ∴ লোহার টুকরাটির ওজন ৯৯০ গ্রাম

(গ) পানির পাত্রের আয়তন ৩৯০ ঘন সে.মি.
 লোহার টুকরাটির আয়তন ১৩২ ঘন সে.মি.

- ∴ লোহার টুকরাসহ পানিপূর্ণ পাত্র থেকে লোহার টুকরাটিকে তুলে
 আনা হলে পাত্রের অবশিষ্ট পানির আয়তন $= (৩৯০ - ১৩২)$ ঘন সে.মি.
 $= ২৫৮$ ঘন সে.মি.

পাত্রের অবশিষ্ট পানির উচ্চতা x সে.মি. হলে

$$x \times ১৫ \times ৬.৫ = ২৫৮$$

$$\text{বা } x = \frac{২৫৮}{১৫ \times ৬.৫}$$

$$= \frac{২৫৮}{৯৭.৫}$$

$$= ২.৬৫ \text{ (প্রায়)}$$

- ∴ পাত্রের অবশিষ্ট পানির উচ্চতা ২.৬৫ সে.মি. (প্রায়)

অনুশীলনী ৩

- ১। ৪ সে.মি. বাহুবিশিষ্ট ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?
 ক) ১৬ খ) ২৪ গ) ৬৪ ঘ) ৯৬
- ২। একটি গাড়ির চাকার পরিধি ৫ মিটার। ১ কি.মি. ৫০০ মিটার পথ যেতে চাকাটি কতবার ঘুরবে?
 ক) ২০০ খ) ২৫০ গ) ৩০০ ঘ) ৩৫০
- ৩। একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ৬০ মিটার এবং প্রস্থ ৪০ মিটার। পুকুরের পাড়ের বিস্তার ৩ মিটার হলে, পাড়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।
- ৪। আয়তাকার একটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ১০ একর এবং তার দৈর্ঘ্য প্রস্থের ৪ গুণ। ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য কত মিটার?
- ৫। একটি আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ। এর ক্ষেত্রফল ২১৬ বর্গমিটার হলে, পরিসীমা কত?
- ৬। একটি ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রের ভূমি ২৪ মিটার এবং উচ্চতা ১৫ মিটার ৫০ সেন্টিমিটার হলে, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

- ৭। একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ৪৮ মিটার এবং প্রস্থ ৩২ মিটার ৮০ সে. মি.। ক্ষেত্রটির বাইরে চারদিকে ৩ মিটার বিস্তৃত একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত ?
- ৮। একটি বর্গাকার ক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য ৩০০ মিটার এবং বাইরে চারদিকে ৪ মিটার প্রস্থ একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত ?
- ৯। একটি ত্রিভুজাকৃতি জমির ক্ষেত্রফল ২৬৪ বর্গমিটার। এর ভূমি ২২ মিটার হলে, উচ্চতা নির্ণয় করো।
- ১০। একটি চৌবাচ্চায় ১৯২০০ লিটার পানি ধরে। এর গভীরতা ২.৫৬ মিটার এবং প্রস্থ ২.৫ মিটার হলে, দৈর্ঘ্য কত ?
- ১১। স্বর্ণ, পানির তুলনায় ১৯.৩ গুণ ভারী। আয়তাকার একটি স্বর্ণের বারের দৈর্ঘ্য ৭.৮ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৬.৪ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা ২.৫ সেন্টিমিটার। স্বর্ণের বারটির ওজন কত ?
- ১২। একটি ছোট বাক্সের দৈর্ঘ্য ১৫ সে. মি. ২.৪ মি. মি., প্রস্থ ৭ সে. মি. ৬.২ মি. মি. এবং উচ্চতা ৫ সে. মি. ৮ মি. মি.। বাক্সটির আয়তন কত ঘন সেন্টিমিটার ?
- ১৩। একটি আয়তাকার চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য ৫.৫ মিটার, প্রস্থ ৪ মিটার এবং উচ্চতা ২ মিটার। উক্ত চৌবাচ্চাটি পানিভর্তি থাকলে পানির আয়তন কত লিটার এবং ওজন কত কিলোগ্রাম হবে ?
- ১৪। আয়তাকার একটি মাঠের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ১.৫ গুণ। প্রতি বর্গমিটার ১.৯০ টাকা দরে ঘাস লাগাতে ১০২৬০.০০ টাকা ব্যয় হয়। প্রতি মিটার ২.৫০ টাকা দরে ঐ মাঠের চারদিকে বেড়া দিতে মোট কত ব্যয় হবে?
- ১৫। একটি ঘরের মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে মোট ৭২০০ টাকা খরচ হয়। ঘরটির প্রস্থ ৩ মিটার কম হলে ৫৭৬ টাকা কম খরচ হতো। ঘরটির প্রস্থ কত ?
- ১৬। ৮০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৬০ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট একটি আয়তাকার বাগানের ভিতর চারদিকে ৪ মিটার প্রশস্ত কটি পথ আছে। প্রতি বর্গমিটার ৭.২৫ টাকা দরে ঐ পথ বাঁধানোর খরচ কত ?
- ১৭। ২.৫ মিটার গভীর একটি বর্গাকৃতি খোলা চৌবাচ্চায় ২৮,৯০০ লিটার পানি ধরে। এর ভেতরের দিকে সিসার পাত লাগাতে প্রতি বর্গমিটার ১২.৫০ টাকা হিসাবে মোট কত খরচ হবে ?
- ১৮। একটি ঘরের মেঝে ২৬ মি. দৈর্ঘ্য ও ২০ মি. প্রস্থ। ৪ মি. দৈর্ঘ্যের ও ২.৫ মি. প্রস্থের কয়টি মাদুর দিয়ে মেঝেটি সম্পূর্ণ ঢাকা যাবে ? প্রতিটি মাদুরের দাম ২০০ টাকা হলে, মোট খরচ কত হবে ?
- ১৯। একটি বইয়ের দৈর্ঘ্য ২৫ সে. মি. ও প্রস্থ ১৮ সে. মি.। বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০০ এবং প্রতি পাতা কাগজের পুরুত্ব ০.১ মি. মি. হলে, বইটির আয়তন নির্ণয় করো।
- ২০। একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ৩২ মিটার, প্রস্থ ২০ মিটার এবং পুকুরের পানির গভীরতা ৩ মিটার। একটি পানির মোটর দ্বারা পুকুরটি পানিশূন্য করা হচ্ছে যা প্রতি সেকেন্ডে ০.১ ঘনমিটার পানি সেচতে পারে। পুকুরটি পানিশূন্য করতে কত সময় লাগবে ?
- ২১। ৩ মিটার দৈর্ঘ্য, ২ মিটার প্রস্থ ও ১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি খালি চৌবাচ্চায় ৫০ সে.মি. বাহুবিশিষ্ট একটি নিরেট ধাতব ঘনক রাখা আছে। চৌবাচ্চাটি পানি দ্বারা পূর্ণ করার পর ঘনকটি তুলে আনা হলে, পানির গভীরতা কত হবে ?

- ২২। একটি ঘরের প্রস্থ দৈর্ঘ্যের $\frac{2}{3}$ অংশ। ঘরের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা যথাক্রমে ১৫ মিটার ও ৪ মিটার। মেঝের চারদিকে ১ মিটার ফাঁকা রেখে ৫০ সে.মি বর্গাকার পাথর বসানো হলো। বায়ু পানির তুলনায় ০.০০১২৯ গুণ ভারী।
- ক. ঘরের পরিসীমা নির্ণয় করো।
- খ. মেঝের উল্লিখিত স্থান বাঁধাই করতে কতটি পাথরের প্রয়োজন হবে?
- গ. ঘরটিতে কত কিলোগ্রাম বায়ু আছে তা নির্ণয় করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। গ্রিক ভাষায় ডেকা অর্থ—
- ক) ১০ গুণ খ) ১০০ গুণ গ) দশমাংশ ঘ) শতাংশ
- ২। একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ১০ হেক্টর। এর এয়রে প্রকাশিত মান—
- ক) ২.৪৭ খ) ৪.০৪৯ গ) ১০০ ঘ) ১০০০
- ৩। পানিপূর্ণ একটি চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য ৩ মিটার, প্রস্থ ২ মিটার ও উচ্চতা ১ মিটার হলে—
- i. চৌবাচ্চার আয়তন ৬ ঘনমিটার হবে।
- ii. চৌবাচ্চার পানির ওজন ৬ কিলোগ্রাম হবে।
- iii. পানি ভর্তি চৌবাচ্চায় পানির আয়তন ৬০০০ লিটার হবে।
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i,ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি আয়তাকার বাগানের ক্ষেত্রফল ৪০০ বর্গমিটার এবং প্রস্থ ১৬ মিটার।

- ৪। বাগানের পরিসীমা কত মিটার?
- ক) ১৬ খ) ২৫ গ) ৪১ ঘ) ৮২
- ৫। বাগানের কর্ণ কত মিটার?
- ক) ২৯.৬৮ খ) ২৯.৮৬ গ) ৩২.৬৮ ঘ) ৪১

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ৬। একটি আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৮০ মিটার ও ৬০ মিটার। জমির ভিতর ৪ মিটার চওড়া পাড় ও ৩ মিটার গভীরতাবিশিষ্ট একটি পুকুর খনন করা হলো। একটি পানির মোটর দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে ০.১ ঘনমিটার পানি শূন্য করা যায়।
- ক. পুকুরের গভীরতা ইঞ্চিতে প্রকাশ করো।
- খ. পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।
- গ. পানিপূর্ণ পুকুরটি পানি শূন্য করতে কত সময় প্রয়োজন?
- ৭। আয়তাকার একটি স্কুল ক্যাম্পাসের ক্ষেত্রফল ১০ একর এবং এর দৈর্ঘ্য প্রস্থের ৪ গুণ। ক্যাম্পাসে অবস্থিত অডিটোরিয়ামের ভেতরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৪০ মিটার, ৩৫ মিটার ও ১০ মিটার এবং দেয়ালের পুরুত্ব ১৫ সে.মি.।
- ক. ক্যাম্পাস এলাকা কত হেক্টর?
- খ. স্কুল ক্যাম্পাসের সীমানা প্রাচীরের দৈর্ঘ্য মিটারে নির্ণয় করো।
- গ. অডিটোরিয়ামের চার দেয়ালের আয়তন নির্ণয় করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ৮। (ক) কোনো বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য ৬০০ সেন্টিমিটার হলে, এর ক্ষেত্রফল বর্গমিটারে নির্ণয় করো।
- খ) একটি আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা ৪ মিটার বেশি এবং পরিসীমা ৩২ মিটার হলে, ঘরের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।
- গ) কবিতাদের বাড়ির পানির ট্যাংকে ৮০০০ লিটার পানি ধরে। ট্যাংকটির আয়তন ঘনমিটারে নির্ণয় করো।
- ঘ) একটি আয়তাকার বাগানের ক্ষেত্রফল ৮৪০ বর্গমিটার এবং দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার হলে, বাগানের প্রস্থ নির্ণয় করো।
- ঙ) আয়তাকার একটি ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ২.৫ গুণ এবং ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল ১৬০ বর্গমিটার হলে, ক্ষেত্রটির প্রস্থ নির্ণয় করো।

চতুর্থ অধ্যায় বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ

দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সমাধানে বীজগণিতের প্রয়োগ ও ব্যবহার ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। বীজগণিতীয় প্রতীক দ্বারা প্রকাশিত যেকোনো সাধারণ নিয়ম বা সিদ্ধান্তকে বীজগণিতীয় সূত্র বা সংক্ষেপে সূত্র বলা হয়। নানাবিধ গাণিতিক সমস্যা বীজগণিতীয় সূত্রের সাহায্যে সমাধান করা যায়। সপ্তম শ্রেণিতে প্রথম চারটি সূত্র ও এদের সাথে সম্পৃক্ত অনুসিদ্ধান্তগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সেগুলো পুনরুল্লেখ করা হলো এবং এদের প্রয়োগ দেখানোর জন্য কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো যেন শিক্ষার্থীরা প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এ অধ্যায়ে বীজগণিতীয় সূত্র প্রয়োগ করে দ্বিপদী ও ত্রিপদী রাশির বর্গ ও ঘন নির্ণয়, মধ্যপদ বিশ্লেষণ, উৎপাদক এবং এদের সাহায্যে কীভাবে বীজগণিতীয় রাশির গ.সা.গু. ও ল.সা.গু. নির্ণয় করা যায় তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা—

- বীজগণিতীয় সূত্র প্রয়োগ করে দ্বিপদী ও ত্রিপদী রাশির বর্গ নিরূপণ, সরলীকরণ ও মান নির্ণয় করতে পারবে।
- বীজগণিতীয় সূত্র প্রয়োগ করে দ্বিপদী ও ত্রিপদী রাশির ঘন নির্ণয়, সরলীকরণ ও মান নির্ণয় করতে পারবে।
- মধ্যপদ বিশ্লেষণের সাহায্যে রাশিমালার উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বীজগণিতীয় রাশির গ.সা.গু. ও ল.সা.গু. নির্ণয় করতে পারবে।

৪.১ বীজগণিতীয় সূত্রাবলি

সপ্তম শ্রেণিতে বীজগণিতীয় প্রথম চারটি সূত্র ও এদের সাথে সম্পৃক্ত অনুসিদ্ধান্তগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সেগুলো পুনরুল্লেখ করা হলো।


$(a + b)^2$ এর জ্যামিতিক ব্যাখ্যাটি নিম্নরূপ :

সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল $= (a + b) \times (a + b) = (a + b)^2$

$$\begin{aligned}\therefore (a + b)^2 &= a \times (a + b) + b \times (a + b) \\ &= a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2\end{aligned}$$

আবার, বর্গক্ষেত্রটির অংশগুলোর ক্ষেত্রফলের সমষ্টি

$$\begin{aligned}a \times a + a \times b + b \times a + b \times b \\ &= a^2 + ab + ab + b^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2\end{aligned}$$



লক্ষ করি, সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল = বর্গক্ষেত্রটির অংশগুলোর ক্ষেত্রফলের সমষ্টি

$$\therefore (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

সপ্তম শ্রেণিতে যে সূত্র ও অনুসিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে জেনেছি তা হলো :

সূত্র ১। $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

কথায়, দুইটি রাশির যোগফলের বর্গ = ১ম রাশির বর্গ + ২ × ১ম রাশি × ২য় রাশি + ২য় রাশির বর্গ।

সূত্র ২। $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

কথায়, দুইটি রাশির বিয়োগফলের বর্গ = ১ম রাশির বর্গ - ২ × ১ম রাশি × ২য় রাশি + ২য় রাশির বর্গ।

সূত্র ৩। $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

কথায়, দুইটি রাশির বর্গের বিয়োগফল = রাশি দুইটির যোগফল × রাশি দুইটির বিয়োগফল

সূত্র ৪। $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

কথায়, দুইটি দ্বিপদী রাশির প্রথম পদ একই হলে, তাদের গুণফল হবে প্রথম পদের বর্গ, স্ব-স্ব চিহ্নযুক্ত দ্বিতীয় পদদ্বয়ের সমষ্টির সাথে প্রথম পদের গুণফল ও স্ব-স্ব চিহ্নযুক্ত দ্বিতীয় পদদ্বয়ের গুণফলের সমষ্টির সমান।

অর্থাৎ, $(x + a)(x + b) = x^2 + (a \text{ এবং } b \text{ এর বীজগণিতীয় যোগফল})x + (a \text{ এবং } b \text{ এর গুণফল})$

অনুসিদ্ধান্ত ১। $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$

অনুসিদ্ধান্ত ২। $a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$

অনুসিদ্ধান্ত ৩। $(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$

অনুসিদ্ধান্ত ৪। $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$

অনুসিদ্ধান্ত ৫। $2(a^2 + b^2) = (a + b)^2 + (a - b)^2$

অনুসিদ্ধান্ত ৬। $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$

$$\text{বা, } ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$$

উদাহরণ ১। $3x + 5y$ এর বর্গ নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } (3x + 5y)^2 &= (3x)^2 + 2 \times 3x \times 5y + (5y)^2 \\ &= 9x^2 + 30xy + 25y^2 \end{aligned}$$

উদাহরণ ২। বর্গের সূত্র প্রয়োগ করে ২৫ এর বর্গ নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } (25)^2 &= (20 + 5)^2 = (20)^2 + 2 \times 20 \times 5 + (5)^2 \\ &= 400 + 200 + 25 \\ &= 625\end{aligned}$$

উদাহরণ ৩। $4x - 7y$ এর বর্গ নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } (4x - 7y)^2 &= (4x)^2 - 2 \times 4x \times 7y + (7y)^2 \\ &= 16x^2 - 56xy + 49y^2\end{aligned}$$

উদাহরণ ৪। $a + b = 8$ এবং $ab = 15$ হলে, $a^2 + b^2$ এর মান নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } a^2 + b^2 &= (a + b)^2 - 2ab \\ &= (8)^2 - 2 \times 15 \\ &= 64 - 30 \\ &= 34\end{aligned}$$

উদাহরণ ৫। $a - b = 7$ এবং $ab = 60$ হলে, $a^2 + b^2$ এর মান নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } a^2 + b^2 &= (a - b)^2 + 2ab \\ &= (7)^2 + 2 \times 60 \\ &= 49 + 120 \\ &= 169\end{aligned}$$

উদাহরণ ৬। $x - y = 3$ এবং $xy = 10$ হলে, $(x + y)^2$ এর মান নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } (x + y)^2 &= (x - y)^2 + 4xy \\ &= (3)^2 + 4 \times 10 \\ &= 9 + 40 \\ &= 49\end{aligned}$$

উদাহরণ ৭। $a + b = 7$ এবং $ab = 10$ হলে, $(a - b)^2$ এর মান নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } (a - b)^2 &= (a + b)^2 - 4ab \\ &= (7)^2 - 4 \times 10 \\ &= 49 - 40 \\ &= 9\end{aligned}$$

উদাহরণ ৮। $x - \frac{1}{x} = 5$ হলে, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ এর মান নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 &= \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 4 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \\ &= (5)^2 + 4 \\ &= 25 + 4 \\ &= 29\end{aligned}$$

কাজ :

- ১। $2a + 5b$ এর বর্গ নির্ণয় করো।
- ২। $4x - 7$ এর বর্গ নির্ণয় করো।
- ৩। $a + b = 7$ এবং $ab = 9$ হলে, $a^2 + b^2$ এর মান নির্ণয় করো।
- ৪। $x - y = 5$ এবং $xy = 6$ হলে, $(x + y)^2$ এর মান নির্ণয় করো।

উদাহরণ ৯। সূত্রের সাহায্যে $3p + 4$ কে $3p - 4$ দ্বারা গুণ করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } (3p + 4)(3p - 4) &= (3p)^2 - (4)^2 \quad [\because (a+b)(a-b) = a^2 - b^2] \\ &= 9p^2 - 16\end{aligned}$$

উদাহরণ ১০। সূত্রের সাহায্যে $5m + 8$ কে $5m + 9$ দ্বারা গুণ করো।

$$\text{সমাধান : আমরা জানি, } (x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$\begin{aligned}\therefore (5m + 8)(5m + 9) &= (5m)^2 + (8 + 9) \times 5m + 8 \times 9 \\ &= 25m^2 + 17 \times 5m + 72 \\ &= 25m^2 + 85m + 72\end{aligned}$$

উদাহরণ ১১। সরল করো: $(5a - 7b)^2 + 2(5a - 7b)(9b - 4a) + (9b - 4a)^2$

$$\text{সমাধান : ধরি, } (5a - 7b) = x \text{ এবং } 9b - 4a = y$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{প্রদত্ত রাশি} &= x^2 + 2xy + y^2 \\
 &= (x + y)^2 \\
 &= (5a - 7b + 9b - 4a)^2 \quad [x \text{ এবং } y \text{ এর মান বসিয়ে}] \\
 &= (a + 2b)^2 \\
 &= a^2 + 4ab + 4b^2
 \end{aligned}$$

উদাহরণ ১২। $(x + 6)(x + 4)$ কে দুইটি রাশির বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করো।

সমাধান : আমরা জানি, $ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$

$$\begin{aligned}
 \therefore (x+6)(x+4) &= \left(\frac{x+6+x+4}{2}\right)^2 - \left(\frac{x+6-x-4}{2}\right)^2 \\
 &= \left(\frac{2x+10}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2 \\
 &= (x+5)^2 - 1^2
 \end{aligned}$$

উদাহরণ ১৩। $x = 4$, $y = -8$ এবং $z = 5$ হলে, $25(x + y)^2 - 20(x + y)(y + z) + 4(y + z)^2$ এর মান কত ?

সমাধান : ধরি, $x + y = a$ এবং $y + z = b$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{প্রদত্ত রাশি} &= 25a^2 - 20ab + 4b^2 \\
 &= (5a)^2 - 2 \times 5a \times 2b + (2b)^2 \\
 &= (5a - 2b)^2 \\
 &= \{5(x + y) - 2(y + z)\}^2 \quad [a \text{ ও } b \text{ এর মান বসিয়ে}] \\
 &= (5x + 5y - 2y - 2z)^2 \\
 &= (5x + 3y - 2z)^2 \\
 &= \{5 \times 4 + 3 \times (-8) - 2 \times 5\}^2 \quad [x, y \text{ ও } z \text{ এর মান বসিয়ে}] \\
 &= (20 - 24 - 10)^2 \\
 &= (-14)^2 = 196
 \end{aligned}$$

- কাজ : ১। সূত্রের সাহায্যে $(5x + 7y)$ ও $(5x - 7y)$ এর গুণফল নির্ণয় করো।
 ২। সূত্রের সাহায্যে $(x + 10)$ ও $(x - 14)$ এর গুণফল নির্ণয় করো।
 ৩। $(4x - 3y)(6x + 5y)$ কে দুইটি রাশির বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করো।

$(a + b + c)^2$ এর জ্যামিতিক ব্যাখ্যা :

সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল


$$(a + b + c) \times (a + b + c) = (a + b + c)^2$$

$$\therefore (a + b + c)^2 = a \times (a + b + c) + b \times (a + b + c) + c \times (a + b + c)$$

$$= a^2 + ab + ac + ab + b^2 + bc + ca + bc + c^2$$

$$= a^2 + 2ab + 2ac + b^2 + 2bc + c^2$$

$$\therefore (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$



আবার, বর্গক্ষেত্রটির অংশগুলোর ক্ষেত্রফলের সমষ্টি

$$= a^2 + ab + ac + ab + b^2 + bc + ac + bc + c^2$$

$$= a^2 + 2ab + 2ac + b^2 + 2bc + c^2$$

$$= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

লক্ষ করি, সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল = বর্গক্ষেত্রটির অংশগুলোর ক্ষেত্রফলের সমষ্টি

$$\therefore (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

উদাহরণ ১৪। $2x + 3y + 5z$ এর বর্গ নির্ণয় করো।

সমাধান : ধরি, $2x = a$, $3y = b$ এবং $5z = c$

$$\therefore \text{প্রদত্ত রাশির বর্গ} = (a + b + c)^2$$

$$= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$$

$$= (2x)^2 + (3y)^2 + (5z)^2 + 2 \times 2x \times 3y + 2 \times 3y \times 5z + 2 \times 2x \times 5z \quad [a, b \text{ ও } c \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

$$= 4x^2 + 9y^2 + 25z^2 + 12xy + 30yz + 20xz$$

$$\therefore (2x + 3y + 5z)^2 = 4x^2 + 9y^2 + 25z^2 + 12xy + 30yz + 20xz$$

উদাহরণ ১৫। $5a - 6b - 7c$ এর বর্গ নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}
 \text{সমাধান : } (5a - 6b - 7c)^2 &= \{5a - (6b + 7c)\}^2 \\
 &= (5a)^2 - 2 \times 5a \times (6b + 7c) + (6b + 7c)^2 \\
 &= 25a^2 - 10a(6b + 7c) + (6b)^2 + 2 \times 6b \times 7c + (7c)^2 \\
 &= 25a^2 - 60ab - 70ac + 36b^2 + 84bc + 49c^2 \\
 &= 25a^2 + 36b^2 + 49c^2 - 60ab + 84bc - 70ac
 \end{aligned}$$

বিকল্প সমাধান :

আমরা জানি, $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz$

এখানে, $5a = x$, $-6b = y$ এবং $-7c = z$ ধরে

$$\begin{aligned}
 (5a - 6b - 7c)^2 &= (5a)^2 + (-6b)^2 + (-7c)^2 \\
 &\quad + 2 \times (5a) \times (-6b) + 2 \times (-6b) \times (-7c) + 2 \times (5a) \times (-7c) \\
 &= 25a^2 + 36b^2 + 49c^2 - 60ab + 84bc - 70ac
 \end{aligned}$$

কাজ : সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করো:

$$১। ax + by + c \quad ২। 4x + 5y - 7z$$

অনুশীলনী ৪.১

১। সূত্রের সাহায্যে নিচের রাশিগুলোর বর্গ নির্ণয় করো :

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| (ক) $5a + 7b$ | (খ) $6x + 3$ | (গ) $7p - 2q$ |
| (ঘ) $ax - by$ | (ঙ) $x^3 + xy$ | (চ) $11a - 12b$ |
| (ছ) $6x^2y - 5xy^2$ | (জ) $-x - y$ | (ঝ) $-xyz - abc$ |
| (ঞ) $a^2x^3 - b^2y^4$ | (ট) 108 | (ঠ) 606 |
| (ড) 597 | (ঢ) $a - b + c$ | (ণ) $ax + b + 2$ |
| (ত) $xy + yz - zx$ | (থ) $3p + 2q - 5r$ | (দ) $x^2 - y^2 - z^2$ |
| (ধ) $7a^2 + 8b^2 - 5c^2$ | | |

২। সরল করো :

(ক) $(x + y)^2 + 2(x + y)(x - y) + (x - y)^2$

(খ) $(2a + 3b)^2 - 2(2a + 3b)(3b - a) + (3b - a)^2$

(গ) $(3x^2 + 7y^2)^2 + 2(3x^2 + 7y^2)(3x^2 - 7y^2) + (3x^2 - 7y^2)^2$

(ঘ) $(8x + y)^2 - (16x + 2y)(5x + y) + (5x + y)^2$

(ঙ) $(5x^2 - 3x - 2)^2 + (2 + 5x^2 - 3x)^2 - 2(5x^2 - 3x - 2)(2 + 5x^2 - 3x)$

৩। সূত্র প্রয়োগ করে গুণফল নির্ণয় করো :

(ক) $(x + 7)(x - 7)$

(খ) $(5x + 13)(5x - 13)$

(গ) $(xy + yz)(xy - yz)$

(ঘ) $(ax + b)(ax - b)$

(ঙ) $(a + 3)(a + 4)$

(চ) $(ax + 3)(ax + 4)$

(ছ) $(6x + 17)(6x - 13)$

(জ) $(a^2 + b^2)(a^2 - b^2)(a^4 + b^4)$

(ঝ) $(ax - by + cz)(ax + by - cz)$

(ঞ) $(3a - 10)(3a - 5)$

(ট) $(5a + 2b - 3c)(5a + 2b + 3c)$

(ঠ) $(ax + by + 5)(ax + by + 3)$

৪। $a = 4$, $b = 6$ এবং $c = 3$ হলে $4a^2b^2 - 16ab^2c + 16b^2c^2$ এর মান নির্ণয় করো।

৫। $x - \frac{1}{x} = 3$ হলে, $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান নির্ণয় করো।

৬। $a + \frac{1}{a} = 4$ হলে, $a^4 + \frac{1}{a^4}$ এর মান কত ?

৭। $m = 6$, $n = 7$ হলে, $16(m^2 + n^2)^2 + 56(m^2 + n^2)(3m^2 - 2n^2) + 49(3m^2 - 2n^2)^2$

এর মান নির্ণয় করো।

৮। $a - \frac{1}{a} = m$ হলে, দেখাও যে, $a^4 + \frac{1}{a^4} = m^4 + 4m^2 + 2$

৯। $x - \frac{1}{x} = 4$ হলে, প্রমাণ করো যে, $x^2 + \frac{1}{x^2} = 18$

১০। $m + \frac{1}{m} = 2$ হলে, প্রমাণ করো যে, $m^4 + \frac{1}{m^4} = 2$

১১। $x + y = 12$ এবং $xy = 27$ হলে, $(x - y)^2$ ও $x^2 + y^2$ এর মান নির্ণয় করো।

১২। $a + b = 13$ এবং $a - b = 3$ হলে, $2a^2 + 2b^2$ ও ab এর মান নির্ণয় করো।

১৩। দুইটি রাশির বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করো :

(ক) $(5p - 3q)(p + 7q)$

(খ) $(6a + 9b)(7b - 8a)$

(গ) $(3x + 5y)(7x - 5y)$

(ঘ) $(5x + 13)(5x - 13)$

১৪। দুইটি সংখ্যা a ও b , যেখানে $a > b$ । সংখ্যা দুয়ের যোগফল 12 এবং গুণফল 32।

ক) সূত্রের সাহায্যে গুণ করো: $(2x + 3)(2x - 7)$

খ) $2a^2 + 2b^2$ এর মান নির্ণয় করো।

গ) প্রমাণ করো যে, $(a + 2b)^2 - 5b^2 = 176$

৪.২ ঘনফলের সূত্রাবলি ও অনুসিদ্ধান্ত

সূত্র ৫। $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
 $= a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$

প্রমাণ : $(a + b)^3 = (a + b)(a + b)^2$
 $= (a + b)(a^2 + 2ab + b^2)$
 $= a(a^2 + 2ab + b^2) + b(a^2 + 2ab + b^2)$
 $= a^3 + 2a^2b + ab^2 + (a^2b + 2ab^2 + b^3)$
 $= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
 $= a^3 + 3ab(a + b) + b^3$
 $= a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$

অনুসিদ্ধান্ত ৭। $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$

সূত্র ৬। $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
 $= a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$

প্রমাণ : $(a - b)^3 = (a - b)(a - b)^2$
 $= (a - b)(a^2 - 2ab + b^2)$
 $= a(a^2 - 2ab + b^2) - b(a^2 - 2ab + b^2)$
 $= a^3 - 2a^2b + ab^2 - a^2b + 2ab^2 - b^3$
 $= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
 $= a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$

অনুসিদ্ধান্ত ৮। $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$

উদাহরণ ১৬। $3x + 2y$ এর ঘন নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } (3x + 2y)^3 &= (3x)^3 + 3 \times (3x)^2 \times (2y) + 3 \times (3x) \times (2y)^2 + (2y)^3 \\ &= 27x^3 + 3 \times 9x^2 \times 2y + 3 \times 3x \times 4y^2 + 8y^3 \\ &= 27x^3 + 54x^2y + 36xy^2 + 8y^3\end{aligned}$$

উদাহরণ ১৭। $2a + 5b$ এর ঘন নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } (2a + 5b)^3 &= (2a)^3 + 3 \times (2a)^2 \times (5b) + 3 \times (2a) \times (5b)^2 + (5b)^3 \\ &= 8a^3 + 3 \times 4a^2 \times 5b + 3 \times 2a \times 25b^2 + 125b^3 \\ &= 8a^3 + 60a^2b + 150ab^2 + 125b^3\end{aligned}$$

উদাহরণ ১৮। $m - 2n$ এর ঘন নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } (m - 2n)^3 &= (m)^3 - 3 \times (m)^2 \times (2n) + 3 \times m \times (2n)^2 - (2n)^3 \\ &= m^3 - 3m^2 \times 2n + 3m \times 4n^2 - 8n^3 \\ &= m^3 - 6m^2n + 12mn^2 - 8n^3\end{aligned}$$

উদাহরণ ১৯। $4x - 5y$ এর ঘন নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } (4x - 5y)^3 &= (4x)^3 - 3 \times (4x)^2 \times (5y) + 3 \times (4x) \times (5y)^2 - (5y)^3 \\ &= 64x^3 - 3 \times 16x^2 \times 5y + 3 \times 4x \times 25y^2 - 125y^3 \\ &= 64x^3 - 240x^2y + 300xy^2 - 125y^3\end{aligned}$$

উদাহরণ ২০। $x + y - z$ এর ঘন নির্ণয় করো।

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : } (x + y - z)^3 &= \{(x + y) - z\}^3 \\ &= (x + y)^3 - 3(x + y)^2 \times z + 3(x + y) \times z^2 - z^3 \\ &= (x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3) - 3(x^2 + 2xy + y^2) \times z + 3(x + y) \times z^2 - z^3 \\ &= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 - 3x^2z - 6xyz - 3y^2z + 3xz^2 + 3yz^2 - z^3 \\ &= x^3 + y^3 - z^3 + 3x^2y + 3xy^2 - 3x^2z - 3y^2z + 3xz^2 + 3yz^2 - 6xyz\end{aligned}$$

কাজ : সূত্রের সাহায্যে ঘন নির্ণয় করো :

১। $ab + bc$ ২। $2x - 5y$ ৩। $2x - 3y - z$

উদাহরণ ২১। সরল করো :

$$(4m + 2n)^3 + 3(4m + 2n)^2(m - 2n) + 3(4m + 2n)(m - 2n)^2 + (m - 2n)^3$$

সমাধান : ধরি, $4m + 2n = a$ এবং $m - 2n = b$

$$\therefore \text{প্রদত্ত রাশি} = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$= (a + b)^3$$

$$= \{(4m + 2n) + (m - 2n)\}^3$$

$$= (4m + 2n + m - 2n)^3$$

$$= (5m)^3 = 125m^3$$

উদাহরণ ২২। সরল করো :

$$(4a - 8b)^3 - (3a - 9b)^3 - 3(a + b)(4a - 8b)(3a - 9b)$$

সমাধান : ধরি, $4a - 8b = x$ এবং $3a - 9b = y$

$$\therefore x - y = (4a - 8b) - (3a - 9b) = 4a - 8b - 3a + 9b = a + b$$

$$\text{এখন প্রদত্ত রাশি} = x^3 - y^3 - 3(x - y) \times x \times y$$

$$= x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$$

$$= (x - y)^3$$

$$= (a + b)^3$$

উদাহরণ ২৩। $a + b = 3$ এবং $ab = 2$ হলে, $a^3 + b^3$ এর মান নির্ণয় করো।

$$\text{সমাধান : } a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$$

$$= (3)^3 - 3 \times 2 \times 3 \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$= 27 - 18$$

$$= 9$$

বিকল্প সমাধান: দেওয়া আছে, $a + b = 3$ এবং $ab = 2$

$$\text{এখন, } a + b = 3$$

$$\text{বা, } (a + b)^3 = (3)^3 \quad [\text{উভয়পক্ষকে ঘন করে}]$$

$$\text{বা, } a^3 + b^3 + 3ab(a + b) = 27$$

$$\text{বা, } a^3 + b^3 + 3 \times 2 \times 3 = 27$$

$$\text{বা, } a^3 + b^3 + 18 = 27$$

$$\text{বা, } a^3 + b^3 = 27 - 18$$

$$\therefore a^3 + b^3 = 9$$

উদাহরণ ২৪। $x - y = 10$ এবং $xy = 30$ হলে, $x^3 - y^3$ এর মান নির্ণয় করো।

$$\text{সমাধান : } x^3 - y^3 = (x - y)^3 + 3xy(x - y)$$

$$= (10)^3 + 3 \times 30 \times 10$$

$$= 1000 + 900$$

$$= 1900$$

উদাহরণ ২৫। $x + y = 4$ হলে, $x^3 + y^3 + 12xy$ এর মান কত ?

$$\text{সমাধান : } x^3 + y^3 + 12xy = x^3 + y^3 + 3 \times 4 \times xy$$

$$= x^3 + y^3 + 3(x + y) \times xy$$

$$= x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$$

$$= (x + y)^3$$

$$= (4)^3$$

$$= 64.$$

উদাহরণ ২৬। $a + \frac{1}{a} = 7$ হলে, $a^3 + \frac{1}{a^3}$ এর মান নির্ণয় করো।

$$\text{সমাধান : } a^3 + \frac{1}{a^3} = a^3 + \left(\frac{1}{a}\right)^3$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3 \times a \times \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a}\right) \\
 &= (7)^3 - 3 \times 7 \quad \left[a + \frac{1}{a} = 7\right] \\
 &= 343 - 21 \\
 &= 322
 \end{aligned}$$

উদাহরণ ২৭। $m = 2$ হলে, $27m^3 + 54m^2 + 36m + 3$ এর মান নির্ণয় করো।

সমাধান : প্রদত্ত রাশি = $27m^3 + 54m^2 + 36m + 3$

$$\begin{aligned}
 &= (3m)^3 + 3 \times (3m)^2 \times 2 + 3 \times (3m) \times (2)^2 + (2)^3 - 5 \\
 &= (3m + 2)^3 - 5 \\
 &= (3 \times 2 + 2)^3 - 5 \quad [m \text{ এর মান বসিয়ে}] \\
 &= (6 + 2)^3 - 5 = 8^3 - 5 \\
 &= 512 - 5 = 507
 \end{aligned}$$

কাজ : ১। সরল করো : $(7x - 6)^3 - (5x - 6)^3 - 6x(7x - 6)(5x - 6)$

২। $a + b = 10$ এবং $ab = 21$ হলে, $a^3 + b^3$ এর মান নির্ণয় করো।

৩। $a + \frac{1}{a} = 3$ হলে, দেখাও যে, $a^3 + \frac{1}{a^3} = 18$

৪.৩ ঘনফলের সাথে সম্পৃক্ত আরও দুইটি সূত্র

সূত্র ৭। $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

প্রমাণ : $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$

$$\begin{aligned}
 &= (a + b)\{(a + b)^2 - 3ab\} \\
 &= (a + b)(a^2 + 2ab + b^2 - 3ab) \\
 &= (a + b)(a^2 - ab + b^2)
 \end{aligned}$$

বিপরীতভাবে, $(a + b)(a^2 - ab + b^2)$

$$\begin{aligned}
 &= a(a^2 - ab + b^2) + b(a^2 - ab + b^2) \\
 &= a^3 - a^2b + ab^2 + a^2b - ab^2 + b^3 \\
 &= a^3 + b^3
 \end{aligned}$$

$\therefore (a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$

সূত্র ৮। $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

প্রমাণ : $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$

$$= (a - b)\{(a - b)^2 + 3ab\}$$

$$= (a - b)(a^2 - 2ab + b^2 + 3ab)$$

$$= (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

বিপরীতভাবে, $(a - b)(a^2 + ab + b^2)$

$$= a(a^2 + ab + b^2) - b(a^2 + ab + b^2)$$

$$= a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3$$

$$= a^3 - b^3$$

$\therefore (a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$

উদাহরণ ২৮। সূত্রের সাহায্যে $(x^2 + 2)$ ও $(x^4 - 2x^2 + 4)$ এর গুণফল নির্ণয় করো।

সমাধান : $(x^2 + 2)(x^4 - 2x^2 + 4)$

$$= (x^2 + 2)\{(x^2)^2 - x^2 \times 2 + 2^2\}$$

$$= (x^2)^3 + (2)^3$$

$$= x^6 + 8$$

উদাহরণ ২৯। সূত্রের সাহায্যে $(4a - 5b)$ ও $(16a^2 + 20ab + 25b^2)$ এর গুণফল নির্ণয় করো।

সমাধান : $(4a - 5b)(16a^2 + 20ab + 25b^2)$

$$= (4a - 5b)\{(4a)^2 + 4a \times 5b + (5b)^2\}$$

$$= (4a)^3 - (5b)^3$$

$$= 64a^3 - 125b^3$$

কাজ : সূত্রের সাহায্যে $(2a + 3b)$ ও $(4a^2 - 6ab + 9b^2)$ এর গুণফল নির্ণয় করো।

অনুশীলনী ৪.২

১। সূত্রের সাহায্যে নিচের রাশিগুলোর ঘন নির্ণয় করো :

- (ক) $3x + y$ (খ) $x^2 + y$ (গ) $5p + 2q$ (ঘ) $a^2b + c^2d$ (ঙ) $6p - 7$ (চ) $ax - by$
 (ছ) $2p^2 - 3r^2$ (জ) $x^3 + 2$ (ঝ) $2m + 3n - 5p$ (ঞ) $x^2 - y^2 + z^2$ (ট) $a^2b^2 - c^2d^2$
 (ঠ) $a^2b - b^3c$ (ড) $x^3 - 2y^3$ (ঢ) $11a - 12b$ (ণ) $x^3 + y^3$

২। সরল করো :

- (ক) $(3x + y)^3 + 3(3x + y)^2(3x - y) + 3(3x + y)(3x - y)^2 + (3x - y)^3$
 (খ) $(2p + 5q)^3 + 3(2p + 5q)^2(5q - 2p) + 3(2p + 5q)(5q - 2p)^2 + (5q - 2p)^3$
 (গ) $(x + 2y)^3 - 3(x + 2y)^2(x - 2y) + 3(x + 2y)(x - 2y)^2 - (x - 2y)^3$
 (ঘ) $(6m + 2)^3 - 3(6m + 2)^2(6m - 4) + 3(6m + 2)(6m - 4)^2 - (6m - 4)^3$
 (ঙ) $(x - y)^3 + (x + y)^3 + 6x(x^2 - y^2)$

৩। $a + b = 8$ এবং $ab = 15$ হলে, $a^3 + b^3$ এর মান কত ?

৪। $x + y = 2$ হলে, দেখাও যে, $x^3 + y^3 + 6xy = 8$

৫। $2x + 3y = 13$ এবং $xy = 6$ হলে, $8x^3 + 27y^3$ এর মান নির্ণয় করো।

৬। $p - q = 5$, $pq = 3$ হলে, $p^3 - q^3$ এর মান নির্ণয় করো।

৭। $x - 2y = 3$ হলে, $x^3 - 8y^3 - 18xy$ এর মান নির্ণয় করো।

৮। $4x - 3 = 5$ হলে, প্রমাণ করো যে, $64x^3 - 27 - 180x = 125$

৯। $a = -3$ এবং $b = 2$ হলে, $8a^3 + 36a^2b + 54ab^2 + 27b^3$ এর মান নির্ণয় করো।

১০। $a = 7$ হলে, $a^3 + 6a^2 + 12a + 1$ এর মান নির্ণয় করো।

১১। $x = 5$ হলে, $x^3 - 12x^2 + 48x - 64$ এর মান কত ?

১২। $a^2 + b^2 = c^2$ হলে, প্রমাণ করো যে, $a^6 + b^6 + 3a^2b^2c^2 = c^6$

১৩। $x + \frac{1}{x} = 4$ হলে, প্রমাণ করো যে, $x^3 + \frac{1}{x^3} = 52$

১৪। $a - \frac{1}{a} = 5$ হলে, $a^3 - \frac{1}{a^3}$ এর মান কত ?

১৫। সূত্রের সাহায্যে গুণফল নির্ণয় করো :

- (ক) $(a^2 + b^2)(a^4 - a^2b^2 + b^4)$ (খ) $(ax - by)(a^2x^2 + abxy + b^2y^2)$
 (গ) $(2ab^2 - 1)(4a^2b^4 + 2ab^2 + 1)$ (ঘ) $(x^2 + a)(x^4 - ax^2 + a^2)$
 (ঙ) $(7a + 4b)(49a^2 - 28ab + 16b^2)$ (চ) $(2a - 1)(4a^2 + 2a + 1)(8a^3 + 1)$
 (ছ) $(x + a)(x^2 - ax + a^2)(x - a)(x^2 + ax + a^2)$
 (জ) $(5a + 3b)(25a^2 - 15ab + 9b^2)(125a^3 - 27b^3)$

৪.৪ উৎপাদকে বিশ্লেষণ

উৎপাদক : যদি কোনো বীজগণিতীয় রাশি দুই বা ততোধিক রাশির গুণফল হয়, তাহলে শেষোক্ত রাশিগুলোর প্রত্যেকটিকে প্রথম রাশির উৎপাদক বা গুণনীয়ক (*Factor*) বলা হয়। যেমন,

$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$, এখানে $(a + b)$ ও $(a - b)$ রাশি দুইটি $(a^2 - b^2)$ এর উৎপাদক।

উৎপাদকে বিশ্লেষণ : যখন কোনো বীজগণিতীয় রাশিকে সম্ভাব্য দুই বা ততোধিক রাশির গুণফলরূপে প্রকাশ করা হয়, তখন একে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা বলে এবং ঐ রাশিগুলোর প্রত্যেকটিকে প্রথমোক্ত রাশির উৎপাদক বলা হয়। যেমন, $x^2 + 2x = x(x + 2)$ [এখানে x ও $(x + 2)$ উৎপাদক]

উৎপাদক নির্ণয়ের নিয়মগুলো নিচে দেওয়া হলো :

(ক) সুবিধামতো সাজিয়ে :

$px - qy + qx - py$ কে সাজানো হলো, $px + qx - py - qy$ রূপে।

এখন, $px + qx - py - qy = x(p + q) - y(p + q) = (p + q)(x - y)$.

আবার, $px - qy + qx - py$ কে সাজানো হলো, $px - py + qx - qy$ রূপে।

এখন, $px - py + qx - qy = p(x - y) + q(x - y) = (x - y)(p + q)$.

(খ) একটি রাশিকে পূর্ণ বর্গ আকারে প্রকাশ করে :

$$\begin{aligned} x^2 + 4xy + 4y^2 &= (x)^2 + 2 \times x \times 2y + (2y)^2 \\ &= (x + 2y)^2 = (x + 2y)(x + 2y) \end{aligned}$$

(গ) একটি রাশিকে দুইটি রাশির বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করে এবং $a^2 - b^2$ সূত্র প্রয়োগ করে :

$$\begin{aligned} &a^2 + 2ab - 2b - 1 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 - b^2 - 2b - 1 \quad [\text{এখানে } b^2 \text{ একবার যোগ এবং একবার বিয়োগ করা হয়েছে। এতে} \\ &\quad \text{রাশির মানের কোনো পরিবর্তন হয় না}] \\ &= (a^2 + 2ab + b^2) - (b^2 + 2b + 1) \\ &= (a + b)^2 - (b + 1)^2 \\ &= (a + b + b + 1)(a + b - b - 1) \\ &= (a + 2b + 1)(a - 1) \end{aligned}$$

বিকল্প নিয়ম :

$$\begin{aligned} & a^2 + 2ab - 2b - 1 \\ &= (a^2 - 1) + (2ab - 2b) \\ &= (a+1)(a-1) + 2b(a-1) \\ &= (a-1)(a+1+2b) \\ &= (a-1)(a+2b+1) \end{aligned}$$

(ঘ) $x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$ সূত্রটি ব্যবহার করে :

$$\begin{aligned} x^2 + 7x + 10 &= x^2 + (2+5)x + 2 \times 5 \\ &= (x+2)(x+5) \end{aligned}$$

(ঙ) একটি রাশিকে ঘন আকারে প্রকাশ করে :

$$\begin{aligned} & 8x^3 + 36x^2 + 54x + 27 \\ &= (2x)^3 + 3 \times (2x)^2 \times 3 + 3 \times 2x \times (3)^2 + (3)^3 \\ &= (2x+3)^3 \\ &= (2x+3)(2x+3)(2x+3) \end{aligned}$$

(চ) $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$ এবং $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

সূত্র দুইটি ব্যবহার করে :

$$\begin{aligned} 8x^3 + 125 &= (2x)^3 + (5)^3 = (2x+5)\{(2x)^2 - (2x) \times 5 + (5)^2\} \\ &= (2x+5)(4x^2 - 10x + 25) \\ 27x^3 - 8 &= (3x)^3 - (2)^3 = (3x-2)\{(3x)^2 + (3x) \times 2 + (2)^2\} \\ &= (3x-2)(9x^2 + 6x + 4) \end{aligned}$$

উদাহরণ ১। $27x^4 + 8xy^3$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } 27x^4 + 8xy^3 &= x(27x^3 + 8y^3) \\ &= x\{(3x)^3 + (2y)^3\} \\ &= x(3x+2y)\{(3x)^2 - (3x) \times (2y) + (2y)^2\} \\ &= x(3x+2y)(9x^2 - 6xy + 4y^2) \end{aligned}$$

উদাহরণ ২। $24x^3 - 81y^3$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } 24x^3 - 81y^3 &= 3(8x^3 - 27y^3) \\ &= 3\{(2x)^3 - (3y)^3\} \\ &= 3(2x-3y)\{(2x)^2 + (2x) \times (3y) + (3y)^2\} \\ &= 3(2x-3y)(4x^2 + 6xy + 9y^2) \end{aligned}$$

কাজ : উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো :

$$১। 4x^2 - y^2 \quad ২। 6ab^2 - 24a \quad ৩। x^2 + 2px + p^2 - 4 \quad ৪। x^3 + 27y^3 \quad ৫। 27a^3 - 8$$

৪.৫ $x^2 + px + q$ আকারের রাশির উৎপাদক

আমরা জানি, $x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$ । এই সূত্রটির বামপাশের রাশির সাথে $x^2 + px + q$ এর তুলনা করলে দেখা যায় যে, উভয় রাশিতেই তিনটি পদ আছে, প্রথম পদটি x^2 ও এর সহগ 1 (এক), দ্বিতীয় বা মধ্য পদটিতে x আছে যার সহগ যথাক্রমে $(a + b)$ ও p এবং তৃতীয় পদটি x বর্জিত, যেখানে যথাক্রমে ab ও q আছে।

$x^2 + (a + b)x + ab$ এর দুইটি উৎপাদক রয়েছে। অতএব, $x^2 + px + q$ এরও দুইটি উৎপাদক হবে। মনে করি, $x^2 + px + q$ এর উৎপাদক দুইটি $(x + a), (x + b)$

$$\text{সুতরাং, } x^2 + px + q = (x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

তাহলে, $p = a + b$ এবং $q = ab$

এখন, $x^2 + px + q$ এর উৎপাদক নির্ণয় করতে হলে, q কে এমন দুইটি উৎপাদকে প্রকাশ করতে হবে যার বীজগণিতীয় সমষ্টি p হয়। এই প্রক্রিয়াকে মধ্যপদ বিভাজন (*Middle term breakup*) বলে। $x^2 + 7x + 12$ রাশিটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হলে 12 কে এমন দুইটি উৎপাদকে প্রকাশ করতে হবে যার সমষ্টি 7 এবং গুণফল 12 হয়। 12 এর সম্ভাব্য উৎপাদক জোড়াসমূহ 1, 12; 2, 6 ও 3, 4। এদের মধ্যে 3, 4 জোড়াটির সমষ্টি $(3 + 4) = 7$ এবং গুণফল $3 \times 4 = 12$

$$\therefore x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$$

মন্তব্য : প্রতিক্ষেত্রে p ও q উভয়ই ধনাত্মক বিবেচনা করে, $x^2 + px + q, x^2 - px + q, x^2 + px - q$ এবং $x^2 - px - q$ আকারের রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হলে, প্রথম ও দ্বিতীয় রাশিতে q ধনাত্মক চিহ্নযুক্ত হওয়াতে q এর উৎপাদক দুইটি একই চিহ্নযুক্ত রাশি অর্থাৎ, উভয়ই ধনাত্মক অথবা উভয়ই ঋণাত্মক হবে। এক্ষেত্রে, p ধনাত্মক চিহ্নযুক্ত হলে, q এর উভয় উৎপাদকই ধনাত্মক হবে, আর p ঋণাত্মক হলে, q এর উভয় উৎপাদকই ঋণাত্মক হবে।

তৃতীয় ও চতুর্থ আকারের রাশিতে q ঋণাত্মক চিহ্নযুক্ত অর্থাৎ, $(-q)$ হওয়াতে এর উৎপাদক দুইটি বিপরীত চিহ্নযুক্ত হবে এবং p ধনাত্মক চিহ্নযুক্ত হলে, উৎপাদক দুইটির ধনাত্মক সংখ্যাটি ঋণাত্মক সংখ্যাটির পরম মান থেকে বড় হবে। আর p ঋণাত্মক চিহ্নযুক্ত হলে, উৎপাদক দুইটির ঋণাত্মক সংখ্যার পরম মান ধনাত্মক সংখ্যা থেকে বড় হবে।

উদাহরণ ৩। $x^2 + 5x + 6$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান : এমন দুইটি ধনাত্মক সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে, যাদের সমষ্টি 5 এবং গুণফল 6।

6 এর সম্ভাব্য উৎপাদক জোড়াগুলো হচ্ছে 1, 6 ও 2, 3।

এদের মধ্যে 2, 3 জোড়াটির সংখ্যাগুলোর সমষ্টি $2 + 3 = 5$ এর গুণফল $2 \times 3 = 6$

$$\begin{aligned}\therefore x^2 + 5x + 6 &= x^2 + 2x + 3x + 6 \\ &= x(x + 2) + 3(x + 2) \\ &= (x + 2)(x + 3)\end{aligned}$$

উদাহরণ ৪। $x^2 - 15x + 54$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

সমাধান : এমন দুইটি সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে যাদের সমষ্টি -15 এবং গুণফল 54 । এখানে দুইটি সংখ্যার সমষ্টি ঋণাত্মক, কিন্তু গুণফল ধনাত্মক। কাজেই, সংখ্যা দুইটি উভয়ই ঋণাত্মক হবে।

54 এর সম্ভাব্য উৎপাদক জোড়াগুলো হচ্ছে $-1, -54; -2, -27; -3, -18; -6, -9$ । এদের মধ্যে $-6, -9$ এর সংখ্যাগুলোর সমষ্টি $= -6 - 9 = -15$ এবং এদের গুণফল $= (-6) \times (-9) = 54$

$$\begin{aligned}\therefore x^2 - 15x + 54 &= x^2 - 6x - 9x + 54 \\ &= x(x - 6) - 9(x - 6) \\ &= (x - 6)(x - 9)\end{aligned}$$

উদাহরণ ৫। $x^2 + 2x - 15$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

সমাধান : এমন দুইটি সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে যাদের সমষ্টি 2 এবং গুণফল (-15) । এখানে দুইটি সংখ্যার সমষ্টি ধনাত্মক, কিন্তু গুণফল ঋণাত্মক। কাজেই, সংখ্যা দুইটির মধ্যে যে সংখ্যার পরম মান বড় সেই সংখ্যাটি ধনাত্মক, আর যে সংখ্যার পরম মান ছোট সে সংখ্যাটি ঋণাত্মক হবে। (-15) এর সম্ভাব্য উৎপাদক জোড়াগুলো হচ্ছে $(-1, 15)$ ও $(-3, 5)$ ।

এদের মধ্যে $-3, 5$ এর সংখ্যাগুলোর সমষ্টি $= -3 + 5 = 2$

$$\begin{aligned}\therefore x^2 + 2x - 15 &= x^2 + 5x - 3x - 15 \\ &= x(x + 5) - 3(x + 5) \\ &= (x + 5)(x - 3)\end{aligned}$$

উদাহরণ ৬। $x^2 - 3x - 28$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

সমাধান : এমন দুইটি সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে যাদের সমষ্টি (-3) এবং গুণফল (-28) । এখানে দুইটি সংখ্যার সমষ্টি ঋণাত্মক এবং গুণফল ঋণাত্মক, কাজেই সংখ্যা দুইটির মধ্যে যে সংখ্যার পরম মান বড় সেই সংখ্যাটি ঋণাত্মক, আর যে সংখ্যাটির পরম মান ছোট সেই সংখ্যাটি ধনাত্মক হবে। (-28) এর সম্ভাব্য উৎপাদক জোড়াগুলো হচ্ছে, $-1, 28; 2, -14$ ও $4, -7$ । এদের মধ্যে $4, -7$ এর সংখ্যাগুলোর সমষ্টি $= -7 + 4 = -3$

$$\begin{aligned}\therefore x^2 - 3x - 28 &= x^2 - 7x + 4x - 28 \\ &= x(x - 7) + 4(x - 7) \\ &= (x - 7)(x + 4)\end{aligned}$$

কাজ : উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো :

$$১। x^2 - 18x + 72 \quad ২। x^2 - 9x - 36 \quad ৩। x^2 - 23x + 132$$

৪.৬ $ax^2 + bx + c$ আকারের রাশির উৎপাদক

$$\begin{aligned} \text{মনে করি, } ax^2 + bx + c &= (rx + p)(sx + q) \\ &= rsx^2 + (rq + sp)x + pq \end{aligned}$$

তাহলে, $a = rs$, $b = rq + sp$ এবং $c = pq$

সুতরাং, $ac = rspq = rq \times sp$ এবং $b = rq + sp$

এখন, $ax^2 + bx + c$ আকারের রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হলে, x^2 এর সহগ a এবং ধ্রুবক c -এর গুণফলকে এমন দুইটি উৎপাদকে প্রকাশ করতে হবে, যেন এদের বীজগণিতীয় যোগফল x এর সহগ b এর সমান হয় এবং a ও c এর গুণফলের সমান হয়।

$2x^2 + 11x + 15$ রাশিটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হলে, $(2 \times 15) = 30$ কে এমন দুইটি উৎপাদকে প্রকাশ করতে হবে, যার যোগফল 11 এবং গুণফল 30 হয়।

30 এর উৎপাদক জোড়াসমূহ 1, 30; 2, 15; 3, 10 ও 5, 6 এর মধ্যে 5,6 জোড়াটির যোগফল $5 + 6 = 11$ এবং গুণফল $5 \times 6 = 30$

$$\begin{aligned} \therefore 2x^2 + 11x + 15 &= 2x^2 + 5x + 6x + 15 \\ &= x(2x + 5) + 3(2x + 5) = (2x + 5)(x + 3) \end{aligned}$$

মন্তব্য : $ax^2 + bx + c$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষণের সময় $x^2 + px + q$ এর p, q এর ধনাত্মক ঋণাত্মক চিহ্নযুক্ত মানের জন্য যে নিয়মগুলো অনুসরণ করা হয়েছে ; a, b, c এর চিহ্নযুক্ত মানের জন্যও একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে p এর পরিবর্তে b এবং q এর পরিবর্তে $(a \times c)$ ধরতে হবে।

উদাহরণ ৭। $2x^2 + 9x + 10$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

সমাধান : এখানে, $2 \times 10 = 20$ [x^2 এর সহগ ও ধ্রুবক পদের গুণফল]

এখন, $4 \times 5 = 20$ এবং $4 + 5 = 9$

$$\begin{aligned} \therefore 2x^2 + 9x + 10 &= 2x^2 + 4x + 5x + 10 \\ &= 2x(x + 2) + 5(x + 2) = (x + 2)(2x + 5) \end{aligned}$$

উদাহরণ ৮। $3x^2 + x - 10$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

সমাধান : এখানে, $3 \times (-10) = -30$

এখন, $(-5) \times 6 = -30$ এবং $(-5) + 6 = 1$

$$\begin{aligned}\therefore 3x^2 + x - 10 &= 3x^2 + 6x - 5x - 10 \\ &= 3x(x + 2) - 5(x + 2) \\ &= (x + 2)(3x - 5)\end{aligned}$$

উদাহরণ ৯। $4x^2 - 23x + 33$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

সমাধান : এখানে, $4 \times 33 = 132$

এখন, $(-11) \times (-12) = 132$ এবং $(-11) + (-12) = -23$

$$\begin{aligned}\therefore 4x^2 - 23x + 33 &= 4x^2 - 11x - 12x + 33 \\ &= x(4x - 11) - 3(4x - 11) \\ &= (4x - 11)(x - 3)\end{aligned}$$

উদাহরণ ১০। $9x^2 - 9x - 4$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

সমাধান : এখানে, $9 \times (-4) = -36$

এখন, $3 \times (-12) = -36$ এবং $3 + (-12) = -9$

$$\begin{aligned}\therefore 9x^2 - 9x - 4 &= 9x^2 + 3x - 12x - 4 \\ &= 3x(3x + 1) - 4(3x + 1) \\ &= (3x + 1)(3x - 4)\end{aligned}$$

কাজ : উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো :

$$১। 8x^2 + 18x + 9 \quad ২। 27x^2 + 15x + 2 \quad ৩। 2a^2 - 6a - 20$$

অনুশীলনী ৪.৩

উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো :

- ১। a^3+8 ২। $8x^3+343$ ৩। $8a^4+27ab^3$ ৪। $8x^3+1$
 ৫। $64a^3-125b^3$ ৬। $729a^3-64b^3c^6$ ৭। $27a^3b^3+64b^3c^3$ ৮। $56x^3-189y^3$
 ৯। $3x-75x^3$ ১০। $4x^2-y^2$ ১১। $3ay^2-48a$
 ১২। $a^2-2ab+b^2-p^2$ ১৩। $16y^2-a^2-6a-9$ ১৪। $8a+ap^3$
 ১৫। $2a^3+16b^3$ ১৬। $x^2+y^2-2xy-1$ ১৭। $a^2-2ab+2b-1$
 ১৮। x^4-2x^2+1 ১৯। $36-12x+x^2$ ২০। x^6-y^6
 ২১। $(x-y)^3+z^3$ ২২। $64x^3-8y^3$ ২৩। $x^2+14x+40$
 ২৪। $x^2+7x-120$ ২৫। $x^2-51x+650$ ২৬। $a^2+7ab+12b^2$
 ২৭। $p^2+2pq-80q^2$ ২৮। $x^2-3xy-40y^2$ ২৯। $(x^2-x)^2+3(x^2-x)-40$
 ৩০। $(a^2+b^2)^2-18(a^2+b^2)-88$ ৩১। $(a^2+7a)^2-8(a^2+7a)-180$
 ৩২। $x^2+(3a+4b)x+(2a^2+5ab+3b^2)$ ৩৩। $6x^2-x-15$ ৩৪। $x^2-x-(a+1)(a+2)$
 ৩৫। $3x^2+11x-4$ ৩৬। $3x^2-16x-12$ ৩৭। $2x^2-9x-35$
 ৩৮। $2x^2-5xy+2y^2$ ৩৯। $x^3-8(x-y)^3$ ৪০। $10p^2+11pq-6q^2$
 ৪১। $2(x+y)^2-3(x+y)-2$ ৪২। $ax^2+(a^2+1)x+a$ ৪৩। $15x^2-11xy-12y^2$
 ৪৪। $a^3-3a^2b+3ab^2-2b^3$

৪.৭ বীজগণিতীয় রাশির গ.সা.গু. এবং ল.সা.গু.

সপ্তম শ্রেণিতে অনূর্ধ্ব তিনটি বীজগণিতীয় রাশির সাংখ্যিক সহগসহ গ.সা.গু. এবং ল.সা.গু. নির্ণয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে এ সম্পর্কে পুনরালোচনা করা হলো।

সাধারণ গুণনীয়ক : যে রাশি দুই বা ততোধিক রাশির প্রত্যেকটির গুণনীয়ক, একে উক্ত রাশিগুলোর সাধারণ গুণনীয়ক (*Common factor*) বলা হয়। যেমন, x^2y , xy , xy^2 , $5x$ রাশিগুলোর সাধারণ গুণনীয়ক হলো x ।

আবার, (a^2-b^2) , $(a+b)^2$, (a^3+b^3) রাশিগুলোর সাধারণ গুণনীয়ক $(a+b)$

৪.৭.১ গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (গ.সা.গু.)

দুই বা ততোধিক রাশির ভিতর যতগুলো মৌলিক সাধারণ গুণনীয়ক আছে, এদের সকলের গুণফলকে ঐ রাশিদ্বয় বা রাশিগুলোর গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক

(Highest Common Factor) বা সংক্ষেপে গ.সা.গু. (H.C.F.) বলা হয়। যেমন, $a^3b^2c^3$, $a^5b^3c^4$ ও $a^4b^3c^2$ এই রাশি তিনটির গ.সা.গু. হবে $a^3b^2c^2$ ।

আবার, $(x+y)^2$, $(x+y)^3$ ও (x^2-y^2) এই তিনটি রাশির গ.সা.গু. $(x+y)$ ।

গ.সা.গু. নির্ণয়ের নিয়ম

প্রথমে পাটিগণিতের নিয়মে প্রদত্ত রাশিগুলোর সাংখ্যিক সহগের গ.সা.গু. নির্ণয় করতে হবে। এরপর বীজগণিতীয় রাশিগুলোর মৌলিক উৎপাদক বের করতে হবে। অতঃপর সাংখ্যিক সহগের গ.সা.গু. এবং প্রদত্ত রাশিগুলোর সর্বোচ্চ বীজগণিতীয় সাধারণ মৌলিক উৎপাদকগুলোর ধারাবাহিক গুণফলই হবে নির্ণেয় গ.সা.গু.।

উদাহরণ ১। $9a^3b^2c^2$, $12a^2bc$ ও $15ab^3c^3$ এর গ.সা.গু. নির্ণয় করো।

সমাধান : 9, 12, 15 এর গ.সা.গু. = 3

a^3, a^2, a এর গ.সা.গু. = a

b^2, b, b^3 এর গ.সা.গু. = b

c^2, c, c^3 এর গ.সা.গু. = c

নির্ণেয় গ.সা.গু. = $3abc$

উদাহরণ ২। $x^3 - 2x^2$, $x^2 - 4$ ও $xy - 2y$ এর গ.সা.গু. নির্ণয় করো।

সমাধান : এখানে, প্রথম রাশি = $x^3 - 2x^2 = x^2(x - 2)$

দ্বিতীয় রাশি = $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$

তৃতীয় রাশি = $xy - 2y = y(x - 2)$

রাশিগুলোতে সাধারণ উৎপাদক $(x - 2)$ এবং এর সর্বোচ্চ সাধারণ ঘাতযুক্ত উৎপাদক $(x - 2)$

∴ গ.সা.গু. = $(x - 2)$

উদাহরণ ৩। $x^2y(x^3 - y^3)$, $x^2y^2(x^4 + x^2y^2 + y^4)$ ও $(x^3y^2 + x^2y^3 + xy^4)$ এর গ.সা.গু. নির্ণয় করো।

সমাধান : এখানে, প্রথম রাশি = $x^2y(x^3 - y^3)$

$$= x^2y(x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

$$\text{দ্বিতীয় রাশি} = x^2y^2(x^4 + x^2y^2 + y^4)$$

$$= x^2y^2\{(x^2)^2 + 2x^2y^2 + (y^2)^2 - x^2y^2\}$$

$$= x^2y^2\{(x^2 + y^2)^2 - (xy)^2\}$$

$$= x^2y^2\{(x^2 + y^2 + xy)(x^2 + y^2 - xy)\}$$

$$= x^2y^2(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)$$

$$\text{তৃতীয় রাশি} = x^3y^2 + x^2y^3 + xy^4 = xy^2(x^2 + xy + y^2)$$

এখানে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাশির সাধারণ উৎপাদক $xy(x^2 + xy + y^2)$

$$\therefore \text{গ.সা.গু.} = xy(x^2 + xy + y^2)$$

কাজ : গ.সা.গু. নির্ণয় করো :

$$১ \mid 15a^3b^2c^4, 25a^2b^4c^3 \text{ এবং } 20a^4b^3c^2$$

$$২ \mid (x+2)^2, (x^2+2x) \text{ এবং } (x^2+5x+6)$$

$$৩ \mid 6a^2+3ab, 2a^3+5a^2-12a \text{ এবং } a^4-8a$$

সাধারণ গুণিতক : কোনো একটি রাশি অপর দুই বা ততোধিক রাশি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হলে, ভাজ্যকে ভাজকদ্বয় বা ভাজকগুলোর সাধারণ গুণিতক (*Common Multiple*) বলে। যেমন, a^2b^2c রাশিটি $a, b, c, ab, bc, ca, a^2b, ab^2, a^2c, b^2c$ রাশিগুলোর প্রত্যেকটি দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং, a^2b^2c রাশিটি $a, b, c, ab, bc, ca, a^2b, a^2c, ab^2, b^2c$ রাশিগুলোর সাধারণ গুণিতক। আবার, $(a+b)^2(a-b)$ রাশিটি $(a+b), (a+b)^2$ ও (a^2-b^2) রাশি তিনটির সাধারণ গুণিতক।

৪.৭.২ লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল.সা.গু.)

দুই বা ততোধিক রাশির সম্ভাব্য সকল উৎপাদকের সর্বোচ্চ ঘাতের গুণফলকে রাশিগুলোর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (*Least Common Multiple*) বা সংক্ষেপে ল.সা.গু. (L.C.M.) বলা হয়।

যেমন, x^2y^2z রাশিটি x^2yz, xy^2 ও xyz রাশি তিনটির ল.সা.গু.।

আবার, $(x+y)^2(x-y)$ রাশিটি $(x+y), (x+y)^2$ ও (x^2-y^2) রাশি তিনটির ল.সা.গু.।

ল.সা.গু. নির্ণয়ের নিয়ম

প্রথমে প্রদত্ত রাশিগুলোর সাংখ্যিক সহগের ল.সা.গু. নির্ণয় করতে হবে।

এরপর মৌলিক উৎপাদকের সর্বোচ্চ ঘাত বের করতে হবে। অতঃপর উভয়ের গুণফলই হবে প্রদত্ত রাশিগুলোর ল.সা.গু.।

উদাহরণ ৪। $4a^2bc, 8ab^2c$ ও $6a^2b^2c$ এর ল.সা.গু. নির্ণয়

সামাধান : এখানে, ৪, ৮ ও ৬ এর ল.সা.গু. = ২৪

প্রদত্ত রাশিগুলোর সর্বোচ্চ ঘাতের উৎপাদক যথাক্রমে a^2, b^2, c

$$\therefore \text{ল.সা.গু.} = 24a^2b^2c.$$

উদাহরণ ৫। $x^3 + x^2y, x^2y + xy^2, x^3 + y^3$ এবং $(x + y)^3$ এর ল.সা.গু. নির্ণয় করো।

সমাধান : এখানে, প্রথম রাশি $= x^3 + x^2y = x^2(x + y)$

দ্বিতীয় রাশি $= x^2y + xy^2 = xy(x + y)$

তৃতীয় রাশি $= x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$

চতুর্থ রাশি $= (x + y)^3 = (x + y)(x + y)(x + y)$

$\therefore$ ল.সা.গু. $= x^2y(x + y)^3(x^2 - xy + y^2) = x^2y(x + y)^2(x^3 + y^3)$

উদাহরণ ৬। $4(x^2 + ax)^2, 6(x^3 - a^2x)$ ও $14x^3(x^3 - a^3)$ এর ল.সা.গু. নির্ণয় করো।

সমাধান : এখানে, প্রথম রাশি $= 4(x^2 + ax)^2 = 2 \times 2 \times x^2(x + a)^2$

দ্বিতীয় রাশি $= 6(x^3 - a^2x) = 2 \times 3 \times x(x^2 - a^2) = 2 \times 3 \times x(x + a)(x - a)$

তৃতীয় রাশি $= 14x^3(x^3 - a^3) = 2 \times 7 \times x^3(x - a)(x^2 + ax + a^2)$

$\therefore$ ল.সা.গু. $= 2 \times 2 \times 3 \times 7 \times x^3(x + a)^2(x - a)(x^2 + ax + a^2)$

$= 84x^3(x + a)^2(x^3 - a^3)$

কাজ : ল.সা.গু. নির্ণয় করো :

১। $5x^3y, 10x^2y, 20x^4y^2$

২। $x^2 - y^2, 2(x + y), 2x^2y + 2xy^2$

৩। $a^3 - 1, a^3 + 1, a^4 + a^2 + 1$

অনুশীলনী ৪.৪

১। $(3x - 5)(5 + 3x)$ কে দুইটি রাশির বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি সঠিক?

ক) $3x^2 - 25$

খ) $9x^2 - 5$

গ) $(3x)^2 - 5^2$

ঘ) $9x^2 - 25$

নিচের তথ্যের আলোকে (২-৪) নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

$x^2 - \sqrt{3}x + 1 = 0$ হলে

২। $x + \frac{1}{x}$ এর মান নিচের কোনটি?

ক) $-\sqrt{3}x$

খ) $\sqrt{3}x$

গ) $-\sqrt{3}$

ঘ) $\sqrt{3}$

৯। $20x^3y^2a^3b^4$, $15x^4y^3a^4b^3$ এবং $35x^2y^4a^3b^2$

১০। x^2-3x , x^2-9 এবং x^2-4x+3

১১। $18(x+y)^3$, $24(x+y)^2$ এবং $32(x^2-y^2)$

১২। $a^2b(a^3-b^3)$, $a^2b^2(a^4+a^2b^2+b^4)$ এবং $a^3b^2+a^2b^3+ab^4$

১৩। a^3-3a^2-10a , a^3+6a^2+8a এবং $a^4-5a^3-14a^2$

ল.সা.গু. নির্ণয় করো (১৪-১৯) :

১৪। a^5b^2c , ab^3c^2 এবং $a^7b^4c^3$

১৫। $5a^2b^3c^2$, $10ab^2c^3$ এবং $15ab^3c$

১৬। $3x^3y^2$, $4xy^3z$, $5x^4y^2z^2$ এবং $12xy^4z^2$

১৭। x^2-4 , x^2+4x+4 এবং x^3-8

১৮। $6x^2-x-1$, $3x^2+7x+2$ এবং $2x^2+3x-2$

১৯। a^3+b^3 , $(a+b)^3$, $(a^2-b^2)^2$ এবং $(a^2-ab+b^2)^2$

২০। $3x-5y+3z$ এবং $3x+5y-z$ দুইটি বীজগাণিতিক রাশি।

ক) ১ম রাশিটির বর্গ নির্ণয় করো।

খ) রাশি দুইটির গুণফলকে দুইটি রাশির বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করো।

গ) ২য় রাশিটির মান শূন্য হলে প্রমাণ করো যে, $27x^3+125y^3+45xyz=z^3$

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। $-5-y$ এর বর্গ নিচের কোনটি?

ক) $y^2+10y+25$

খ) $y^2-10y+25$

গ) $25-10y+y^2$

ঘ) $y^2-10y-25$

২। x^2-2x-3 ও x^2+2x-3 এর গ.সা.গু কত?

ক) $x+1$

খ) $x-1$

গ) 1

ঘ) 0

ফর্ম-১০, গণিত-অষ্টম শ্রেণি

৩। $x^2 - 10x + 21$ ও $(x - 7)(x - 2)$ বীজগণিতীয় রাশি দুইটির—

i) গ.সা.গু. = $x - 7$

ii) ল.সা.গু. = $(x - 7)(x - 3)$

iii) গুণফল = $(x - 7)^2(x - 3)(x - 2)$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) i i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

$x + y = 5$ এবং $x - y = 3$ হলে

৪। xy এর মান কত ?

(ক) 10 (খ) 8 (গ) 6 (ঘ) 4

৫। $x^2 - y^2$ এর মান কত ?

(ক) 13 (খ) 14 (গ) 15 (ঘ) 16

সৃজনশীল প্রশ্ন

৬। $P = 3x^2 - 5x + 2$, $Q = 3x^2 - 16x - 12$ ও $R = 3x^2 - x - 2$ তিনটি বীজগণিতীয় রাশি।

ক) P কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

খ) $P = 0$ এবং $x \neq 0$ হলে, $9x^2 + \frac{4}{x^2}$ এর মান নির্ণয় করো।

গ) Q ও R এর ল.সা.গু. নির্ণয় করো।

৭। $a - \frac{1}{a} = 3$ হলে-

ক) $(a + \frac{1}{a})^2$ এর মান নির্ণয় করো।

খ) প্রমাণ কর যে, $a^4 = 119 - \frac{1}{a^4}$

গ) $a^5 - \frac{1}{a^5}$ এর মান নির্ণয় করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৮। ক) $a + b = 10$ এবং $a - b = 6$ হলে, $a^2 + b^2$ এর মান নির্ণয় করো।

খ) $x^2 + 6x + 8$ কে দুইটি রাশির বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করো।

গ) $a + \frac{1}{a} = 3$ হলে, $a^3 + \frac{1}{a^3}$ এর মান নির্ণয় করো।

ঘ) $2x^2 - 9x - 35$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

ঙ) $x^2 - 3x$ ও $x^2 - 9$ এর গ.সা.গু. নির্ণয় করো।

বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে একটি সম্পূর্ণ জিনিসের সাথে এর অংশও ব্যবহার করি। এই বিভিন্ন অংশ এক-একটি ভগ্নাংশ। সপ্তম শ্রেণিতে আমরা বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ কী তা জেনেছি এবং ভগ্নাংশের লঘুকরণ ও সাধারণ হ্রবিশিষ্টকরণ শিখেছি। ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ ও সরলীকরণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জেনেছি। এ অধ্যায়ে ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ সম্পর্কে পুনরালোচনা এবং ভগ্নাংশের গুণ, ভাগ ও সরলীকরণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা—

- বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করতে পারবে এবং এ-সংক্রান্ত সরল ও সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

৫.১ বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ (Algebraic Fraction)

যদি m ও n দুইটি বীজগণিতীয় রাশি হয়, তবে $\frac{m}{n}$ একটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ, যেখানে $n \neq 0$ । এখানে $\frac{m}{n}$ ভগ্নাংশটির m কে লব ও n কে হর বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, $\frac{a}{b}, \frac{x+y}{y}, \frac{x^2+a^2}{x+a}$ ইত্যাদি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ।

৫.২ ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠকরণ

কোনো বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের লব ও হরের সাধারণ গুণনীয়ক থাকলে, ভগ্নাংশটির লব ও হরের গ.সা.গু. দিয়ে লব ও হরকে ভাগ করলে, লব ও হরের ভাগফল দ্বারা গঠিত নতুন ভগ্নাংশটিই হবে প্রদত্ত ভগ্নাংশটির লঘিষ্ঠকরণ।

$$\begin{aligned} \text{যেমন, } \frac{a^3b^2 - a^2b^3}{a^3b - ab^3} &= \frac{a^2b^2(a-b)}{ab(a^2 - b^2)} \\ &= \frac{a^2b^2(a-b)}{ab(a+b)(a-b)} \\ &= \frac{ab}{a+b} \end{aligned}$$

এখানে লব ও হরের গ.সা.গু. $ab(a-b)$ দ্বারা লব ও হরকে ভাগ করে লঘিষ্ঠকরণ করা হয়েছে।

৫.৩ ভগ্নাংশকে সাধারণ হ্রবিশিষ্টকরণ

দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশকে সাধারণ হ্রবিশিষ্ট করতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

- ১। হরগুলোর ল.সা.গু. নির্ণয় করতে হবে।
- ২। ভগ্নাংশের হর দিয়ে ল.সা.গু. -কে ভাগ করতে হবে।
- ৩। হর দিয়ে ল.সা.গু.কে ভাগ করা হলে যে ভাগফল পাওয়া যাবে, সেই ভাগফল দ্বারা ঐ ভগ্নাংশের লব ও হরকে গুণ করতে হবে।

যেমন, $\frac{x}{y}, \frac{a}{b}, \frac{m}{n}$ তিনটি ভগ্নাংশ, এদের একই হরবিশিষ্ট করতে হবে।

এখানে তিনটি ভগ্নাংশের হর যথাক্রমে y, b ও n এদের ল.সা.গু. = ybn

১ম ভগ্নাংশ $\frac{x}{y}$ এর হর y , y দ্বারা ল.সা.গু. ybn কে ভাগ করলে ভাগফল bn , এখন bn দ্বারা $\frac{x}{y}$ ভগ্নাংশের

লব ও হরকে গুণ করতে হবে।

$$\therefore \frac{x}{y} = \frac{x \times bn}{y \times bn} = \frac{xbn}{ybn}$$

একইভাবে, ২য় ভগ্নাংশ $\frac{a}{b}$ এর হর b , b দ্বারা ল.সা.গু. ybn কে ভাগ করলে ভাগফল yn ।

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{a \times yn}{b \times yn} = \frac{ayn}{ybn}$$

৩য় ভগ্নাংশ $\frac{m}{n}$ এর হর n , n দ্বারা ল.সা.গু. ybn কে ভাগ করলে ভাগফল yb .

$$\therefore \frac{m}{n} = \frac{m \times yb}{n \times yb} = \frac{myb}{ybn}$$

অতএব, $\frac{x}{y}, \frac{a}{b}$ ও $\frac{m}{n}$ এর সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ যথাক্রমে $\frac{xbn}{ybn}, \frac{ayn}{ybn}$ ও $\frac{myb}{ybn}$

উদাহরণ ১। নিচের ভগ্নাংশ দুইটিকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো :

$$\text{ক) } \frac{16a^2b^3c^4y}{8a^3b^2c^5x} \quad \text{(খ) } \frac{a(a^2 + 2ab + b^2)(a^3 - b^3)}{(a^3 + b^3)(a^4b - b^5)}$$

$$\text{সমাধান : (ক) প্রদত্ত ভগ্নাংশ } \frac{16a^2b^3c^4y}{8a^3b^2c^5x}$$

এখানে, ১৬ ও ৮ এর গ.সা.গু. হলো ৮

$$a^2 \text{ ও } a^3 \text{ " " " } a^2$$

$$b^3 \text{ ও } b^2 \text{ " " " } b^2$$

$$c^4 \text{ ও } c^5 \text{ " " " } c^4$$

$$y \text{ ও } x \text{ " " " } 1$$

$\therefore 16a^2b^3c^4y$ ও $8a^3b^2c^5x$ এর গ.সা.গু. হলো $8a^2b^2c^4$

$$\frac{16a^2b^3c^4y}{8a^3b^2c^5x} \text{ এর লব ও হরকে } 8a^2b^2c^4 \text{ দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যায় } \frac{2by}{acx}$$

$$\therefore \frac{16a^2b^3c^4y}{8a^3b^2c^5x} \text{ এর লঘিষ্ঠ আকার হলো } \frac{2by}{acx}.$$

(খ) প্রদত্ত ভগ্নাংশটি $\frac{a(a^2 + 2ab + b^2)(a^3 - b^3)}{(a^3 + b^3)(a^4b - b^5)}$

এখানে, লব = $a(a^2 + 2ab + b^2)(a^3 - b^3)$

$$= a(a+b)^2(a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

হর = $(a^3 + b^3)(a^4b - b^5)$

$$= (a+b)(a^2 - ab + b^2)\{b(a^4 - b^4)\}$$

$$= b(a+b)(a^2 - ab + b^2)(a^2 - b^2)(a^2 + b^2)$$

$$= b(a+b)(a^2 - ab + b^2)(a+b)(a-b)(a^2 + b^2)$$

$$= b(a+b)^2(a-b)(a^2 + b^2)(a^2 - ab + b^2)$$

$\therefore$ লব ও হরের গ.সা.গু. = $(a+b)^2(a-b)$

প্রদত্ত ভগ্নাংশটির লব ও হরকে $(a+b)^2(a-b)$ দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যায় $\frac{a(a^2 + ab + b^2)}{b(a^2 + b^2)(a^2 - ab + b^2)}$

$\therefore$ ভগ্নাংশটির লঘিষ্ঠ রূপ $\frac{a(a^2 + ab + b^2)}{b(a^2 + b^2)(a^2 - ab + b^2)}$

উদাহরণ ২। $\frac{x}{x^3y - xy^3}, \frac{a}{xy(a^2 - b^2)}, \frac{m}{m^3n - mn^3}$ কে সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে পরিণত করো।

সমাধান : এখানে প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলো $\frac{x}{x^3y - xy^3}, \frac{a}{xy(a^2 - b^2)}, \frac{m}{m^3n - mn^3}$

এখানে, ১ম ভগ্নাংশের হর = $x^3y - xy^3$

$$= xy(x^2 - y^2)$$

২য় ভগ্নাংশের হর = $xy(a^2 - b^2)$

৩য় ভগ্নাংশের হর = $m^3n - mn^3$

$$= mn(m^2 - n^2)$$

$\therefore$ হরগুলোর ল.সা.গু. = $xy(x^2 - y^2)(a^2 - b^2)(m^2 - n^2)mn$

$$\text{অতএব, } \frac{x}{x^3y - xy^3} = \frac{x(a^2 - b^2)(m^2 - n^2)mn}{xy(x^3 - y^2)(a^2 - b^2)(m^2 - n^2)mn}$$

$$\frac{a}{xy(a^2 - b^2)} = \frac{a(x^2 - y^2)(m^2 - n^2)mn}{xy(x^2 - y^2)(a^2 - b^2)(m^2 - n^2)mn}$$

$$\text{এবং } \frac{m}{m^3n - mn^3} = \frac{xym(x^2 - y^2)(a^2 - b^2)}{xy(x^2 - y^2)(a^2 - b^2)(m^2 - n^2)mn}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ভগ্নাংশগুলো } \frac{x(a^2 - b^2)(m^2 - n^2)mn}{xy(x^2 - y^2)(a^2 - b^2)(m^2 - n^2)mn}, \frac{a(x^2 - y^2)(m^2 - n^2)mn}{xy(x^2 - y^2)(a^2 - b^2)(m^2 - n^2)mn}$$

$$\text{ও } \frac{xym(x^2 - y^2)(a^2 - b^2)}{xy(x^2 - y^2)(a^2 - b^2)(m^2 - n^2)mn}$$

কাজ : সমহরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো :

$$১। \frac{x^2 + xy}{x^2y} \text{ এবং } \frac{x^2 - xy}{xy^2} \quad ২। \frac{a - b}{a + 2b} \text{ এবং } \frac{2a + b}{a^2 - 4b}$$

৫.৪ ভগ্নাংশের যোগ

দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশের যোগ করতে হলে, ভগ্নাংশগুলোকে সাধারণ হরবিশিষ্ট করে যোগ করলে যোগফল হবে একটি নতুন ভগ্নাংশ, যার লব হবে সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশগুলোর লবের যোগফল এবং হর হবে ভগ্নাংশগুলোর হরের ল.সা.গু.।

$$\begin{aligned} \text{যেমন, } \frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{b}{z} \\ = \frac{ayz}{xyz} + \frac{bxz}{xyz} + \frac{bxy}{xyz} \\ = \frac{ayz + bxz + bxy}{xyz} \end{aligned}$$

$$\text{উদাহরণ ৩। ভগ্নাংশ তিনটি যোগ করো : } \frac{1}{x - y}, \frac{x}{x^2 + xy + y^2}, \frac{y^2}{x^3 - y^3}$$

$$\text{এখানে, } ১ম \text{ ভগ্নাংশ} = \frac{1}{x - y}$$

$$২য় \text{ ভগ্নাংশ} = \frac{x}{x^2 + xy + y^2}$$

$$৩য় \text{ ভগ্নাংশ} = \frac{y^2}{x^3 - y^3} = \frac{y^2}{(x - y)(x^2 + xy + y^2)}$$

$$\text{হরগুলোর ল.সা.গু.} = (x - y)(x^2 + xy + y^2) = (x^3 - y^3)$$

সুতরাং $\frac{1}{x-y}, \frac{x}{x^2+xy+y^2}, \frac{y^2}{x^3-y^3}$ এর যোগফল

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{x-y} + \frac{x}{x^2+xy+y^2} + \frac{y^2}{x^3-y^3} \\
&= \frac{x^2+xy+y^2}{(x-y)(x^2+xy+y^2)} + \frac{x(x-y)}{(x-y)(x^2+xy+y^2)} + \frac{y^2}{x^3-y^3} \\
&= \frac{x^2+xy+y^2}{x^3-y^3} + \frac{x^2-xy}{x^3-y^3} + \frac{y^2}{x^3-y^3} \\
&= \frac{x^2+xy+y^2+x^2-xy+y^2}{x^3-y^3} \\
&= \frac{2(x^2+y^2)}{x^3-y^3}
\end{aligned}$$

নির্ণেয় যোগফল $\frac{2(x^2+y^2)}{x^3-y^3}$

উদাহরণ ৪। যোগফল বের করো : $\frac{3a}{a^2+3a-4} + \frac{2a}{a^2-1} + \frac{a}{a^2+5a+4}$

সমাধান : প্রদত্ত রাশি, $\frac{3a}{a^2+3a-4} + \frac{2a}{a^2-1} + \frac{a}{a^2+5a+4}$

$$\begin{aligned}
&= \frac{3a}{a^2+4a-a-4} + \frac{2a}{(a+1)(a-1)} + \frac{a}{a^2+a+4a+4} \\
&= \frac{3a}{(a+4)(a-1)} + \frac{2a}{(a+1)(a-1)} + \frac{a}{(a+1)(a+4)} \\
&= \frac{3a(a+1)+2a(a+4)+a(a-1)}{(a+4)(a+1)(a-1)} \\
&= \frac{3a^2+3a+2a^2+8a+a^2-a}{(a+4)(a+1)(a-1)} \\
&= \frac{6a^2+10a}{(a+4)(a+1)(a-1)} \\
&= \frac{2a(3a+5)}{(a+4)(a^2-1)}
\end{aligned}$$

উদাহরণ ৫। যোগফল নির্ণয় করো :

$$(ক) \frac{a-b}{bc} + \frac{b-c}{ca} + \frac{c-a}{ab}$$

$$(খ) \frac{1}{a^2-5a+6} + \frac{1}{a^2-9} + \frac{1}{a^2+4a+3}$$

$$(গ) \frac{1}{a-2} + \frac{a+2}{a^2+2a+4}$$

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } (ক) \frac{a-b}{bc} + \frac{b-c}{ca} + \frac{c-a}{ab} \\ = \frac{a^2-ab+b^2-bc+c^2-ca}{abc} \\ = \frac{a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca}{abc} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (খ) \frac{1}{a^2-5a+6} + \frac{1}{a^2-9} + \frac{1}{a^2+4a+3} \\ = \frac{1}{a^2-2a-3a+6} + \frac{1}{(a+3)(a-3)} + \frac{1}{a^2+3a+a+3} \\ = \frac{1}{a(a-2)-3(a-2)} + \frac{1}{(a+3)(a-3)} + \frac{1}{a(a+3)+1(a+3)} \\ = \frac{1}{(a-2)(a-3)} + \frac{1}{(a+3)(a-3)} + \frac{1}{(a+3)(a+1)} \\ = \frac{(a+1)(a+3) + (a+1)(a-2) + (a-2)(a-3)}{(a+1)(a-2)(a+3)(a-3)} \\ = \frac{a^2+4a+3+a^2-a-2+a^2-5a+6}{(a+1)(a-2)(a+3)(a-3)} \end{aligned}$$

$$= \frac{3a^2-2a+7}{(a+1)(a-2)(a^2-9)}$$

$$\begin{aligned} (গ) \frac{1}{a-2} + \frac{a+2}{a^2+2a+4} \\ = \frac{a^2+2a+4+(a-2)(a+2)}{(a-2)(a^2+2a+4)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{a^2 + 2a + 4 + a^2 - 4}{a^3 - 8} \\
 &= \frac{2a^2 + 2a}{a^3 - 8} \\
 &= \frac{2a(a+1)}{a^3 - 8}
 \end{aligned}$$

কাজ : যোগ করো :

$$১। \frac{2a}{3x^2y}, \frac{3b}{2xy^2} \text{ ও } \frac{a+b}{xy} \quad ২। \frac{2}{x^2y - xy^2}, \frac{3}{xy(x^2 - y^2)} \text{ ও } \frac{1}{x^2 - y^2}$$

৫.৫ ভগ্নাংশের বিয়োগ

দুইটি ভগ্নাংশের বিয়োগ করতে হলে, ভগ্নাংশ দুইটিকে সাধারণ হরবিশিষ্ট করে বিয়োগ করলে বিয়োগফল হবে একটি নতুন ভগ্নাংশ, যার লব হবে সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ দুইটির লবের বিয়োগফল এবং হর হবে ভগ্নাংশ দুইটির হরের ল.সা.গু.।

$$\begin{aligned}
 \text{যেমন, } \frac{a}{xy} - \frac{b}{yz} \\
 &= \frac{az}{xyz} - \frac{bx}{xyz} \\
 &= \frac{az - bx}{xyz}
 \end{aligned}$$

উদাহরণ ৬। বিয়োগফল নির্ণয় করো :

$$\begin{aligned}
 (\text{ক}) \quad &\frac{x}{4a^2bc^2} - \frac{y}{9ab^2c^3} \\
 (\text{খ}) \quad &\frac{x}{(x-y)^2} - \frac{x+y}{x^2-y^2} \\
 (\text{গ}) \quad &\frac{a^2+9y^2}{a^2-9y^2} - \frac{a-3y}{a+3y}
 \end{aligned}$$

$$\text{সমাধান : (ক) } \frac{x}{4a^2bc^2} - \frac{y}{9ab^2c^3}$$

এখানে, হর $4a^2bc^2$ ও $9ab^2c^3$ এর ল.সা.গু. $36a^2b^2c^3$

$$\begin{aligned}
 \therefore \quad &\frac{x}{4a^2bc^2} - \frac{y}{9ab^2c^3} \\
 &= \frac{9xbc - 4ya}{36a^2b^2c^3}
 \end{aligned}$$

$$(খ) \frac{x}{(x-y)^2} - \frac{x+y}{x^2-y^2}$$

এখানে, হর $(x-y)^2$ ও x^2-y^2 এর ল.সা.গু. $(x-y)^2(x+y)$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{x}{(x-y)^2} - \frac{x+y}{x^2-y^2} &= \frac{x(x+y) - (x+y)(x-y)}{(x-y)^2(x+y)} \\ &= \frac{x^2 + xy - x^2 + y^2}{(x-y)^2(x+y)} \\ &= \frac{xy + y^2}{(x-y)^2(x+y)} \\ &= \frac{y(x+y)}{(x-y)^2(x+y)} \\ &= \frac{y}{(x-y)^2} \end{aligned}$$

$$(গ) \frac{a^2+9y^2}{a^2-9y^2} - \frac{a-3y}{a+3y}$$

এখানে, হর a^2-9y^2 ও $a+3y$ এর ল.সা.গু. a^2-9y^2

$$\begin{aligned} \frac{a^2+9y^2}{a^2-9y^2} - \frac{a-3y}{a+3y} &= \frac{a^2+9y^2 - (a-3y)(a+3y)}{a^2-9y^2} \\ &= \frac{a^2+9y^2 - (a^2-6ay+9y^2)}{a^2-9y^2} \\ &= \frac{a^2+9y^2 - a^2 + 6ay - 9y^2}{a^2-9y^2} \\ &= \frac{6ay}{a^2-9y^2} \end{aligned}$$

কাজ : বিয়োগ করো :

$$১। \frac{x}{x^2+xy+y^2} \text{ থেকে } \frac{xy}{x^3-y^3} \quad ২। \frac{1}{1+a+a^2} \text{ থেকে } \frac{2a}{1+a^2+a^4}$$

লক্ষণীয় : বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ করার সময় প্রয়োজন হলে প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলোকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করে নিতে হবে।

$$\begin{aligned}
 \text{যেমন, } & \frac{a^2bc}{ab^2c} + \frac{ab^2c}{abc^2} + \frac{abc^2}{a^2bc} \\
 &= \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \\
 &= \frac{a \times ca}{b \times ca} + \frac{b \times ab}{c \times ab} + \frac{c \times bc}{a \times bc} \quad [\text{হর } b, c, a \text{ এর ল.সা.গু. } abc] \\
 &= \frac{ca^2}{abc} + \frac{ab^2}{abc} + \frac{bc^2}{abc} \\
 &= \frac{ca^2 + ab^2 + bc^2}{abc}
 \end{aligned}$$

উদাহরণ ৭। সরল করো :

$$(ক) \frac{x-y}{(y+z)(z+x)} + \frac{y-z}{(x+y)(z+x)} + \frac{z-x}{(x+y)(y+z)}$$

$$(খ) \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} - \frac{4}{x^2+4}$$

$$(গ) \frac{1}{1-a+a^2} - \frac{1}{1+a+a^2} - \frac{2a}{1+a^2+a^4}$$

$$\text{সমাধান : (ক) } \frac{x-y}{(y+z)(z+x)} + \frac{y-z}{(x+y)(z+x)} + \frac{z-x}{(x+y)(y+z)}$$

এখানে হর, $(y+z)(z+x)$, $(x+y)(z+x)$ ও $(x+y)(y+z)$ এর ল.সা.গু. $(x+y)(y+z)(z+x)$

$$\begin{aligned}
 \therefore & \frac{x-y}{(y+z)(z+x)} + \frac{y-z}{(x+y)(z+x)} + \frac{z-x}{(x+y)(y+z)} \\
 &= \frac{(x-y)(x+y) + (y-z)(y+z) + (z-x)(z+x)}{(x+y)(y+z)(z+x)} \\
 &= \frac{x^2 - y^2 + y^2 - z^2 + z^2 - x^2}{(x+y)(y+z)(z+x)} \\
 &= \frac{0}{(x+y)(y+z)(z+x)} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(\text{খ}) \quad & \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} - \frac{4}{x^2+4} \\
&= \frac{x+2-x+2}{(x-2)(x+2)} - \frac{4}{x^2+4} \\
&= \frac{4}{x^2-4} - \frac{4}{x^2+4} \\
&= 4 \left[\frac{1}{x^2-4} - \frac{1}{x^2+4} \right] \\
&= 4 \left[\frac{x^2+4-x^2+4}{(x^2-4)(x^2+4)} \right] \\
&= \frac{4 \times 8}{(x^2-4)(x^2+4)} \\
&= \frac{32}{x^4-16}
\end{aligned}$$

$$(\text{গ}) \quad \frac{1}{1-a+a^2} - \frac{1}{1+a+a^2} - \frac{2a}{1+a^2+a^4}$$

$$\begin{aligned}
\text{এখানে, } 1+a^2+a^4 &= 1+2a^2+a^4-a^2 \\
&= (1+a^2)^2 - a^2 \\
&= (1+a^2+a)(1+a^2-a) \\
&= (a^2+a+1)(a^2-a+1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{এখানে হর } 1-a+a^2, 1+a+a^2 \text{ ও } 1+a^2+a^4 \text{ এর ল.সা.গু. } (1+a+a^2)(1-a+a^2) \\
= 1+a^2+a^4
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \quad & \frac{1}{1-a+a^2} - \frac{1}{1+a+a^2} - \frac{2a}{1+a^2+a^4} \\
&= \frac{1+a+a^2-1+a-a^2-2a}{1+a^2+a^4} \\
&= \frac{0}{1+a^2+a^4} \\
&= 0
\end{aligned}$$

অনুশীলনী ৫.১

১। লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো :

(ক) $\frac{4x^2y^3z^5}{9x^5y^2z^3}$

(খ) $\frac{16(2x)^4(3y)^5}{(3x)^3.(2y)^6}$

(গ) $\frac{x^3y + xy^3}{x^2y^3 + x^3y^2}$

(ঘ) $\frac{(a-b)(a+b)}{a^3 - b^3}$

(ঙ) $\frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 - 25}$

(চ) $\frac{x^2 - 7x + 12}{x^2 - 9x + 20}$

(ছ) $\frac{(x^3 - y^3)(x^2 - xy + y^2)}{(x^2 - y^2)(x^3 + y^3)}$

(জ) $\frac{a^2 - b^2 - 2bc - c^2}{a^2 + 2ab + b^2 - c^2}$

২। সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো :

(ক) $\frac{x^2}{xy}, \frac{y^2}{yz}, \frac{z^2}{zx}$

(খ) $\frac{x-y}{xy}, \frac{y-z}{yz}, \frac{z-x}{zx}$

(গ) $\frac{x}{x-y}, \frac{y}{x+y}, \frac{z}{x(x+y)}$

(ঘ) $\frac{x+y}{(x-y)^2}, \frac{x-y}{x^3+y^3}, \frac{y-z}{x^2-y^2}$

(ঙ) $\frac{a}{a^3+b^3}, \frac{b}{(a^2+ab+b^2)}, \frac{c}{a^3-b^3}$

(চ) $\frac{1}{x^2-5x+6}, \frac{1}{x^2-7x+12}, \frac{1}{x^2-9x+20}$

(ছ) $\frac{a-b}{a^2b^2}, \frac{b-c}{b^2c^2}, \frac{c-a}{c^2a^2}$

(জ) $\frac{x-y}{x+y}, \frac{y-z}{y+z}, \frac{z-x}{z+x}$

৩। যোগফল নির্ণয় করো :

(ক) $\frac{a-b}{a} + \frac{a+b}{b}$

(খ) $\frac{a}{bc} + \frac{b}{ca} + \frac{c}{ab}$

(গ) $\frac{x-y}{x} + \frac{y-z}{y} + \frac{z-x}{z}$

(ঘ) $\frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y}$

(ঙ) $\frac{1}{x^2-3x+2} + \frac{1}{x^2-4x+3} + \frac{1}{x^2-5x+4}$

$$(চ) \frac{1}{a^2 - b^2} + \frac{1}{a^2 + ab + b^2} + \frac{1}{a^2 - ab + b^2}$$

$$(ছ) \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2} + \frac{4}{x^2-4}$$

$$(জ) \frac{1}{x^2-1} + \frac{1}{x^4-1} + \frac{4}{x^8-1}$$

৪। বিয়োগফল নির্ণয় করো :

$$(ক) \frac{a}{x-3} - \frac{a^2}{x^2-9}$$

$$(খ) \frac{1}{y(x-y)} - \frac{1}{x(x+y)}$$

$$(গ) \frac{x+1}{1+x+x^2} - \frac{x-1}{1-x+x^2}$$

$$(ঘ) \frac{a^2+16b^2}{a^2-16b^2} - \frac{a-4b}{a+4b}$$

$$(ঙ) \frac{1}{x-y} - \frac{x^2-xy+y^2}{x^3+y^3}$$

৫। সরল করো :

$$(ক) \frac{x-y}{xy} + \frac{y-z}{yz} + \frac{z-x}{zx}$$

$$(খ) \frac{x-y}{(x+y)(y+z)} + \frac{y-z}{(y+z)(z+x)} + \frac{z-x}{(z+x)(x+y)}$$

$$(গ) \frac{y}{(x-y)(y-z)} + \frac{x}{(z-x)(x-y)} + \frac{z}{(y-z)(z-x)}$$

$$(ঘ) \frac{1}{x+3y} + \frac{1}{x-3y} - \frac{2x}{x^2-9y^2} \quad (ঙ) \frac{1}{x-y} - \frac{2}{2x+y} + \frac{1}{x+y} - \frac{2}{2x-y}$$

$$(চ) \frac{1}{x-2} - \frac{x-2}{x^2+2x+4} + \frac{6x}{x^3+8} \quad (ছ) \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} - \frac{2}{x^2+1} + \frac{4}{x^4+1}$$

$$(জ) \frac{x-y}{(y-z)(z-x)} + \frac{y-z}{(z-x)(x-y)} + \frac{z-x}{(x-y)(y-z)}$$

$$(ঝ) \frac{1}{a-b-c} + \frac{1}{a-b+c} + \frac{a}{a^2+b^2-c^2-2ab}$$

$$(ঞ) \frac{1}{a^2+b^2-c^2+2ab} + \frac{1}{b^2+c^2-a^2+2bc} + \frac{1}{c^2+a^2-b^2+2ca}$$

৫.৬ ভগ্নাংশের গুণ

দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশ গুণ করে একটি ভগ্নাংশ পাওয়া যায় যার লব হবে ভগ্নাংশগুলোর লবের গুণফলের সমান এবং হর হবে ভগ্নাংশগুলোর হরের গুণফলের সমান। এরূপ ভগ্নাংশকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করা হলে লব ও হর পরিবর্তিত হয়।

যেমন, $\frac{x}{y}$ ও $\frac{a}{b}$ দুইটি ভগ্নাংশ।

এই দুইটি ভগ্নাংশের গুণফল হলো

$$\begin{aligned} & \frac{x}{y} \times \frac{a}{b} \\ &= \frac{x \times a}{y \times b} \\ &= \frac{xa}{yb} \end{aligned}$$

এখানে xa হলো ভগ্নাংশটির লব যা প্রদত্ত ভগ্নাংশ দুইটির লবের গুণফল এবং হর হলো yb যা প্রদত্ত ভগ্নাংশ দুইটির হরের গুণফল। আবার, $\frac{x}{by}, \frac{ya}{z}$ ও $\frac{z}{x}$ তিনটি ভগ্নাংশের গুণফল হলো

$$\begin{aligned} & \frac{x}{by} \times \frac{ya}{z} \times \frac{z}{x} \\ &= \frac{xyza}{xyzb} \\ &= \frac{a}{b} \quad [\text{লঘিষ্ঠকরণ করে}] \end{aligned}$$

এখানে, গুণফল লঘিষ্ঠকরণ করার ফলে লব ও হর পরিবর্তিত হলো।

উদাহরণ ৮। গুণ করো :

(ক) $\frac{a^2b^2}{cd}$ কে $\frac{ab}{c^2d^2}$ দ্বারা

(খ) $\frac{x^2y^3}{xy^2}$ কে $\frac{x^3b}{ay^3}$ দ্বারা

(গ) $\frac{10x^5b^4z^3}{3x^2b^2z}$ কে $\frac{15y^5b^2z^2}{2y^2a^2x}$ দ্বারা

(ঘ) $\frac{x^2 - y^2}{x^3 + y^3}$ কে $\frac{x^2 - xy + y^2}{x^3 - y^3}$ দ্বারা

(ঙ) $\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 9x + 20}$ কে $\frac{x - 5}{x - 3}$ দ্বারা

সমাধান :

(ক)
$$\begin{aligned} & \frac{a^2b^2}{cd} \times \frac{ab}{c^2d^2} \\ &= \frac{a^2b^2 \times ab}{cd \times c^2d^2} \end{aligned}$$

২০৮

$\therefore$ নির্ণেয় গুণফল $= \frac{a^3b^3}{c^3d^3}$

$$\begin{aligned}
 (খ) \quad & \frac{x^2 y^3}{xy^2} \times \frac{x^3 b}{ay^3} \\
 &= \frac{x^2 y^3 \times x^3 b}{xy^2 \times ay^3} \\
 &= \frac{x^5 y^3 b}{xy^5 a}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় গুণফল} = \frac{x^4 b}{y^2 a}$$

$$\begin{aligned}
 (গ) \quad & \frac{10x^5 b^4 z^3}{3x^2 b^2 z} \times \frac{15y^5 b^2 z^2}{2y^2 a^2 x} \\
 &= \frac{10x^5 b^4 z^3 \times 15y^5 b^2 z^2}{3x^2 b^2 z \times 2y^2 a^2 x} \\
 &= \frac{25x^5 y^5 z^5 b^6}{x^3 y^2 z a^2 b^2}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় গুণফল} = \frac{25b^4 x^2 y^3 z^4}{a^2}$$

$$\begin{aligned}
 (ঘ) \quad & \frac{x^2 - y^2}{x^3 + y^3} \times \frac{x^2 - xy + y^2}{x^3 - y^3} \\
 &= \frac{(x+y)(x-y) \times (x^2 - xy + y^2)}{(x+y)(x^2 - xy + y^2)(x-y)(x^2 + xy + y^2)}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় গুণফল} = \frac{1}{x^2 + xy + y^2}$$

$$\begin{aligned}
 (ঙ) \quad & \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 9x + 20} \times \frac{x - 5}{x - 3} \\
 &= \frac{x^2 - 2x - 3x + 6}{x^2 - 4x - 5x + 20} \times \frac{x - 5}{x - 3} \\
 &= \frac{x(x - 2) - 3(x - 2)}{x(x - 4) - 5(x - 4)} \times \frac{x - 5}{x - 3} \\
 &= \frac{(x - 2)(x - 3)}{(x - 4)(x - 5)} \times \frac{x - 5}{x - 3} \\
 &= \frac{(x - 2)(x - 3)(x - 5)}{(x - 4)(x - 5)(x - 3)}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় গুণফল} = \frac{x - 2}{x - 4}$$

কাজ : গুণ করো :

$$১। \frac{7a^2b}{36a^3b^2} \text{ কে } \frac{24ab^2}{35a^4b^5} \text{ দ্বারা} \quad ২। \frac{x^2+3x-4}{x^2-7x+12} \text{ কে } \frac{x^2-9}{x^2-16} \text{ দ্বারা}$$

৫.৭ ভগ্নাংশের ভাগ

একটি ভগ্নাংশকে অপর একটি ভগ্নাংশ দ্বারা ভাগ করার অর্থ প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির গুণাত্মক বিপরীত ভগ্নাংশ দ্বারা গুণ করা।

উদাহরণস্বরূপ, $\frac{x}{y}$ কে $\frac{z}{y}$ দ্বারা ভাগ করতে হবে,

$$\begin{aligned} \text{তাহলে } \frac{x}{y} \div \frac{z}{y} \\ &= \frac{x}{y} \times \frac{y}{z} \quad [\text{এখানে } \frac{y}{z} \text{ হলো } \frac{z}{y} \text{ এর গুণাত্মক বিপরীত ভগ্নাংশ}] \\ &= \frac{x}{z} \end{aligned}$$

উদাহরণ ৯। ভাগ করো :

(ক) $\frac{a^3b^2}{c^2d}$ কে $\frac{a^2b^3}{cd^3}$ দ্বারা

(খ) $\frac{12a^4x^3y^2}{10x^4y^3z^2}$ কে $\frac{6a^3b^2c}{5x^2y^2z^2}$ দ্বারা

(গ) $\frac{a^2-b^2}{a^2+ab+b^2}$ কে $\frac{a+b}{a^3-b^3}$ দ্বারা

(ঘ) $\frac{x^3-27}{x^2-7x+6}$ কে $\frac{x^2-9}{x^2-36}$ দ্বারা

(ঙ) $\frac{x^3-y^3}{x^3+y^3}$ কে $\frac{x^2-y^2}{(x+y)^2}$ দ্বারা

সমাধান :

(ক) ১ম ভগ্নাংশ = $\frac{a^3b^2}{c^2d}$

২য় " = $\frac{a^2b^3}{cd^3}$

২য় ভগ্নাংশের গুণাত্মক বিপরীত হলো $\frac{cd^3}{a^2b^3}$

$$\begin{aligned} & \frac{a^3b^2}{c^2d} \div \frac{a^2b^3}{cd^3} \\ &= \frac{a^3b^2}{c^2d} \times \frac{cd^3}{a^2b^3} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ভাগফল} = \frac{a^3b^2cd^3}{a^2b^3c^2d} = \frac{ad^2}{bc}$$

$$\begin{aligned} (\text{খ}) \quad & \frac{12a^4x^3y^2}{10x^4y^3z^2} \div \frac{6a^3b^2c}{5x^2y^2z^2} \\ &= \frac{12a^4x^3y^2}{10x^4y^3z^2} \times \frac{5x^2y^2z^2}{6a^3b^2c} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ভাগফল} = \frac{axy}{b^2c}$$

$$\begin{aligned} (\text{গ}) \quad & \frac{a^2 - b^2}{a^2 + ab + b^2} \div \frac{a + b}{a^3 - b^3} \\ &= \frac{(a + b)(a - b)}{(a^2 + ab + b^2)} \times \frac{(a - b)(a^2 + ab + b^2)}{a + b} \\ &= (a - b)(a - b) \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ভাগফল} = (a - b)^2$$

$$\begin{aligned} (\text{ঘ}) \quad & \frac{x^3 - 27}{x^2 - 7x + 6} \div \frac{x^2 - 9}{x^2 - 36} \\ &= \frac{x^3 - 3^3}{x^2 - 6x - x + 6} \times \frac{x^2 - 6^2}{x^2 - 3^2} \\ &= \frac{(x - 3)(x^2 + 3x + 3^2)}{(x - 6)(x - 1)} \times \frac{(x + 6)(x - 6)}{(x + 3)(x - 3)} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ভাগফল} = \frac{(x^2 + 3x + 9)(x + 6)}{(x - 1)(x + 3)}$$

$$\begin{aligned} (\text{ঙ}) \quad & \frac{x^3 - y^3}{x^3 + y^3} \div \frac{x^2 - y^2}{(x + y)^2} \\ &= \frac{(x - y)(x^2 + xy + y^2)}{(x + y)(x^2 - xy + y^2)} \times \frac{(x + y)^2}{(x + y)(x - y)} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ভাগফল} = \frac{x^2 + xy + y^2}{x^2 - xy + y^2}$$

কাজ : ভাগ করো :

$$১। \frac{16a^2b^2}{21z^2} \text{ কে } \frac{28ab^4}{35xyz} \text{ দ্বারা} \quad ২। \frac{x^4 - y^4}{x^2 - 2xy + y^2} \text{ কে } \frac{x^3 + y^3}{x - y} \text{ দ্বারা}$$

উদাহরণ ১০। সরল করো :

$$(ক) \left(1 + \frac{1}{x}\right) \div \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)$$

$$(খ) \left(\frac{x}{x+y} + \frac{y}{x-y}\right) \div \left(\frac{x}{x-y} - \frac{y}{x+y}\right)$$

$$(গ) \frac{a^3 + b^3}{(a-b)^2 + 3ab} \div \frac{(a+b)^2 - 3ab}{a^3 - b^3} \times \frac{a+b}{a-b}$$

$$(ঘ) \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 - 7x + 12} \div \frac{x^2 - 16}{x^2 - 9} \times \frac{(x-4)^2}{(x-1)^2}$$

$$(ঙ) \frac{x^3 + y^3 + 3xy(x+y)}{(x+y)^2 - 4xy} \div \frac{(x-y)^2 + 4xy}{x^3 - y^3 - 3xy(x-y)}$$

সমাধান : (ক) $\left(1 + \frac{1}{x}\right) \div \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)$

$$= \frac{(x+1)}{x} \div \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

$$= \frac{(x+1)}{x} \times \frac{x^2}{(x+1)(x-1)}$$

$$= \frac{x}{x-1}$$

$$(খ) \left(\frac{x}{x+y} + \frac{y}{x-y}\right) \div \left(\frac{x}{x-y} - \frac{y}{x+y}\right)$$

$$= \frac{x^2 - xy + xy + y^2}{(x+y)(x-y)} \div \frac{x^2 + xy - xy + y^2}{(x-y)(x+y)}$$

$$= \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} \div \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$$

$$= \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} \times \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

$$= 1$$

$$\begin{aligned}
 (\text{গ}) \quad & \frac{a^3 + b^3}{(a-b)^2 + 3ab} \div \frac{(a+b)^2 - 3ab}{a^3 - b^3} \times \frac{a+b}{a-b} \\
 &= \frac{(a+b)(a^2 - ab + b^2)}{a^2 - 2ab + b^2 + 3ab} \div \frac{a^2 + 2ab + b^2 - 3ab}{(a-b)(a^2 + ab + b^2)} \times \frac{a+b}{a-b} \\
 &= \frac{(a+b)(a^2 - ab + b^2)}{(a^2 + ab + b^2)} \times \frac{(a-b)(a^2 + ab + b^2)}{(a^2 - ab + b^2)} \times \frac{a+b}{a-b} \\
 &= (a+b)(a+b) \\
 &= (a+b)^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\text{ঘ}) \quad & \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 - 7x + 12} \div \frac{x^2 - 16}{x^2 - 9} \times \frac{(x-4)^2}{(x-1)^2} \\
 &= \frac{x^2 + 4x - x - 4}{x^2 - 3x - 4x + 12} \times \frac{x^2 - 3^2}{x^2 - 4^2} \times \frac{(x-4)^2}{(x-1)^2} \\
 &= \frac{(x+4)(x-1)}{(x-3)(x-4)} \times \frac{(x+3)(x-3)}{(x+4)(x-4)} \times \frac{(x-4)^2}{(x-1)^2} \\
 &= \frac{x+3}{x-1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\text{ঙ}) \quad & \frac{x^3 + y^3 + 3xy(x+y)}{(x+y)^2 - 4xy} \div \frac{(x-y)^2 + 4xy}{x^3 - y^3 - 3xy(x-y)} \\
 &= \frac{(x+y)^3}{(x-y)^2} \div \frac{(x+y)^2}{(x-y)^3} \\
 &= \frac{(x+y)^3}{(x-y)^2} \times \frac{(x-y)^3}{(x+y)^2} \\
 &= (x+y)(x-y) \\
 &= x^2 - y^2
 \end{aligned}$$

অনুশীলনী ৫.২

১। $\frac{a}{x}, \frac{b}{y}, \frac{c}{z}, \frac{p}{q}$ কে সাধারণ হ্রস্বীকৃত করলে নিচের কোনটি সঠিক?

$$\text{ক) } \frac{ayzq}{xyzq}, \frac{bxzq}{xyzq}, \frac{cxyq}{xyzq}, \frac{pxyz}{xyzq} \quad \text{খ) } \frac{axy}{xyzq}, \frac{byz}{xyzq}, \frac{czx}{xyzq}, \frac{pxy}{xyzq}$$

গ) $\frac{a}{xyzq}, \frac{b}{xyzq}, \frac{c}{xyzq}, \frac{p}{xyzq}$ ঘ) $\frac{axyzq}{xyzq}, \frac{bxyzq}{xyzq}, \frac{cxyzq}{xyzq}, \frac{pxyzq}{xyzq}$

২। $\frac{x^2y^2}{ab}$ ও $\frac{c^3d^2}{x^5y^3}$ এর গুণফল কত হবে?

ক) $\frac{x^2y^2c^3d^2}{abx^3y^2}$ খ) $\frac{c^3d^2}{abx^3y}$ গ) $\frac{x^2y^2c^3}{x^3y}$ ঘ) $\frac{xyd^2}{ab}$

৩। $\frac{p+x}{p-x} \div \frac{(p+x)^2}{p^2-x^2}$ এর মান কোনটি?

ক) 1 খ) $p-x$ গ) $p+x$ ঘ) $\frac{p-x}{p+x}$

৪। $\frac{x+y}{x-y}$ ও $\frac{x-y}{x+y}$ কে সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি হবে?

ক) $\frac{(x+y)^2}{x^2-y^2}, \frac{(x-y)^2}{x^2-y^2}$ খ) $\frac{(x+y)^2}{x-y}, \frac{(x-y)^2}{x+y}$ গ) $\frac{(x+y)^2}{x^2+y^2}, \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}$ ঘ) $\frac{x-y}{(x+y)^2}, \frac{x+y}{(x-y)^2}$

৫। $\frac{x^2+2x-3}{x^2+x-2}$ ও $\frac{x^2+x-6}{x^2-4}$ এর ভাগফল নিচের কোনটি?

ক) $\frac{x+3}{x+2}$ খ) $\frac{x-1}{x+3}$ গ) 1 ঘ) 0

৬। $\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} - \frac{4}{x^2-4}$ এর সরল মান নিচের কোনটি?

ক) $\frac{8}{x^2-4}$ খ) $\frac{2x}{x^2-4}$ গ) 1 ঘ) 0

৭। গুণ করো :

(ক) $\frac{9x^2y^2}{7y^2z^2}, \frac{5b^2c^2}{3z^2x^2}$ এবং $\frac{7c^2a^2}{x^2y^2}$ (খ) $\frac{16a^2b^2}{21z^2}, \frac{28z^4}{9x^3y^4}$ এবং $\frac{3y^7z}{10x}$

(গ) $\frac{yz}{x^2}, \frac{zx}{y^2}$ এবং $\frac{xy}{z^2}$ (ঘ) $\frac{x-1}{x+1}, \frac{(x-1)^2}{x^2+x}$ এবং $\frac{x^2}{x^2-4x+5}$

(ঙ) $\frac{x^4-y^4}{x^2-2xy+y^2}, \frac{x-y}{x^3+y^3}$ এবং $\frac{x+y}{x^3+y^3}$

(চ) $\frac{1-b^2}{1+x}, \frac{1-x^2}{b+b^2}$ এবং $\left(1+\frac{1-x}{x}\right)$

(ছ) $\frac{x^2-3x+2}{x^2-4x+3}, \frac{x^2-5x+6}{x^2-7x+12}$ এবং $\frac{x^2-16}{x^2-9}$

$$(জ) \frac{x^3 + y^3}{a^2b + ab^2 + b^3}, \frac{a^3 - b^3}{x^2 - xy + y^2} \text{ এবং } \frac{ab}{x + y}$$

$$(ঝ) \frac{x^3 + y^3 + 3xy(x + y)}{(a + b)^3}, \frac{a^3 + b^3 + 3ab(a + b)}{x^2 - y^2} \text{ এবং } \frac{(x - y)^2}{(x + y)^2}$$

৮। ভাগ করো : (১ম রাশিকে ২য় রাশি দ্বারা)

$$(ক) \frac{3x^2}{2a}, \frac{4y^2}{15zx}$$

$$(খ) \frac{9a^2b^2}{4c^2}, \frac{16a^3b}{3c^3}$$

$$(গ) \frac{21a^4b^4c^4}{4x^3y^3z^3}, \frac{7a^2b^2c^2}{12xyz}$$

$$(ঘ) \frac{x}{y}, \frac{x + y}{y}$$

$$(ঙ) \frac{(a + b)^2}{(a - b)^2}, \frac{a^2 - b^2}{a + b}$$

$$(চ) \frac{x^3 - y^3}{x + y}, \frac{x^2 + xy + y^2}{x^2 - y^2}$$

$$(ছ) \frac{a^3 + b^3}{a - b}, \frac{a^2 - ab + b^2}{a^2 - b^2} \quad (জ) \frac{x^2 - 7x + 12}{x^2 - 4}, \frac{x^2 - 16}{x^2 - 3x + 2}$$

$$(ঝ) \frac{x^2 - x - 30}{x^2 - 36}, \frac{x^2 + 13x + 40}{x^2 + x - 56}$$

৯। সরল করো :

$$(ক) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \times \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right)$$

$$(খ) \left(\frac{1}{1+x} + \frac{2x}{1-x^2} \right) \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right)$$

$$(গ) \left(1 - \frac{c}{a+b} \right) \left(\frac{a}{a+b+c} - \frac{a}{a+b-c} \right)$$

$$(ঘ) \left(\frac{1}{1+a} + \frac{a}{1-a} \right) \left(\frac{1}{1+a^2} - \frac{1}{1+a+a^2} \right)$$

$$(ঙ) \left(\frac{x}{2x-y} + \frac{x}{2x+y} \right) \left(4 + \frac{3y^2}{x^2 - y^2} \right)$$

$$(চ) \left(\frac{2x+y}{x+y} - 1 \right) \div \left(1 - \frac{y}{x+y} \right)$$

$$(ছ) \left(\frac{a}{a+b} + \frac{b}{a-b} \right) \div \left(\frac{a}{a-b} - \frac{b}{a+b} \right) \quad (জ) \left(\frac{a^2 + b^2}{2ab} - 1 \right) \div \left(\frac{a^3 - b^3}{a-b} - 3ab \right)$$

$$(ঝ) \frac{(x+y)^2 - 4xy}{(a+b)^2 - 4ab} \div \frac{x^3 - y^3 - 3xy(x-y)}{a^3 - b^3 - 3ab(a-b)} \quad (ঞ) \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + 1 \right) \div \left(\frac{a^2}{b^2} + \frac{a}{b} + 1 \right)$$

১০। সরল করো :

$$(ক) \frac{x^2 + 2x - 15}{x^2 + x - 12} \div \frac{x^2 - 25}{x^2 - x - 20} \times \frac{x - 2}{x^2 - 5x + 6}$$

$$(খ) \left(\frac{x}{x-y} - \frac{x}{x+y} \right) \div \left(\frac{y}{x-y} - \frac{y}{x+y} \right) + \left(\frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y} \right) \div \left(\frac{x+y}{x-y} - \frac{x-y}{x+y} \right)$$

$$(গ) \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + x - 2} \div \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$$

$$(ঘ) \frac{a^4 - b^4}{a^2 + b^2 - 2ab} \times \frac{(a+b)^2 - 4ab}{a^3 - b^3} \div \frac{a+b}{a^2 + ab + b^2}$$

১১। $\frac{a^4 - b^4}{a^2 - 2ab + b^2}$, $\frac{a-b}{a^3 + b^3}$, $\frac{a+b}{a^3 + b^3}$ তিনটি বীজগাণিতিক রাশি।

ক) ১ম রাশিকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।

খ) দেখাও যে, রাশি তিনটির গুণফল $\frac{a^2 + b^2}{(a^2 - ab + b^2)^2}$

গ) ১ম রাশিকে $\frac{a^3 + a^2b + ab^2 + b^3}{(a+b)^2 - 4ab}$ দ্বারা ভাগ করে ভাগফলের সাথে $\frac{a^2}{a+b}$ যোগ করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। $\frac{a-b}{a} - \frac{a+b}{b}$ এর সরল মান নিচের কোনটি?

ক) $\frac{a^2 - 2ab - b^2}{ab}$

খ) $\frac{a^2 - 2ab + b^2}{ab}$

গ) $\frac{-a^2 - b^2}{ab}$

ঘ) $\frac{a^2 - b^2}{ab}$

২। $\frac{x^2 - 2x + 1}{a^2 - 2a + 1}$ কে $\frac{x-1}{a-1}$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল কত হবে?

ক) $\frac{x+1}{a-1}$

খ) $\frac{x-1}{a-1}$

গ) $\frac{x-1}{a+1}$

ঘ) $\frac{a-1}{x-1}$

৩। $\frac{a}{a+b}$ ও $\frac{a}{a-b}$ ভগ্নাংশ দুইটির-

i. হরদ্বয়ের গুণফল $a^2 - b^2$

ii. গুণফল $\frac{a^2}{a^2 - b^2}$

iii. ভাগফল $\frac{1}{a^2-b^2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) i i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

$\frac{x^2+4x-21}{x^2+5x-14}$ একটি বীজগাণিতিক ভগ্নাংশ।

৪। লবের উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ কোনটি?

- ক) $(x+7)(x-3)$ খ) $(x-1)(x+21)$ গ) $(x-3)(x-7)$ ঘ) $(x+3)(x-7)$

৫। ভগ্নাংশটির লঘিষ্ঠ মান নিচের কোনটি?

- ক) $\frac{x-7}{x+7}$ খ) $\frac{x-3}{x+2}$ গ) $\frac{x+7}{x-2}$ ঘ) $\frac{x-3}{x-2}$

সৃজনশীল প্রশ্ন

৬। $A = \frac{1}{1-x+x^2}$, $B = \frac{1}{1+x+x^2}$ ও $C = \frac{1}{1+x^2+x^4}$ তিনটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ।

ক) $(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + 1) \div (\frac{a^2}{b^2} + \frac{a}{b} + 1) =$ কত?

খ) প্রমাণ করো যে, $\frac{1}{A} - \frac{1}{B} - \frac{2x}{C} = 0$

গ) A, B, C ভগ্নাংশ তিনটিকে সমহরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো।

৭। $A = \frac{x^2+3x-4}{x^2+7x+12}$, $B = \frac{x+3}{x+7}$ ও $C = \frac{x^2+12x+35}{x^2+4x-5}$ তিনটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ।

ক) $\frac{a^4-b^4}{a^2-2ab+b^2}$ কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।

খ) $A + B$ কে সরল কর।

গ) দেখাও যে, $B \times C \div \frac{x^2-9}{x-1} = \frac{1}{x-3}$

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৮। ক) $\frac{x^2+2x}{x^2-4}$ কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।

খ) $\frac{x}{x+2} + \frac{3}{x+2} - \frac{1}{x+2}$ এর সরলফল নির্ণয় করো।

গ) $\frac{x^2+5x}{x+4}$ কে $\frac{x+5}{x^2-25}$ দ্বারা ভাগ করো।

ঘ) $(1 + \frac{x}{1+x})$ কে $(1 - \frac{x}{1+x})$ দ্বারা গুণ করো।

ঙ) $\frac{x^2-y^2}{x^3+y^3} \times \frac{x^2-xy+y^2}{x^3-y^3}$ এর সরলফল নির্ণয় করো।

ষষ্ঠ অধ্যায় সরল সহসমীকরণ

গাণিতিক সমস্যা সমাধানে সমীকরণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে এক চলকবিশিষ্ট সরল সমীকরণ ও এ-সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যার সমীকরণ গঠন করে তা সমাধান করতে শিখেছি। সপ্তম শ্রেণিতে সমীকরণের পক্ষান্তর বিধি, বর্জন বিধি, আড়গুণন বিধি ও প্রতিসাম্য বিধি সম্পর্কে জেনেছি। এ ছাড়াও লেখচিত্রের সাহায্যে কীভাবে সমীকরণের সমাধান করতে হয় তা জেনেছি। এ অধ্যায়ে দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতিতে সমাধান ও লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা—

- সমীকরণের প্রতিস্থাপন পদ্ধতি ও অপনয়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণের সমাধান করতে পারবে।
- গাণিতিক সমস্যার সরল সহসমীকরণ গঠন করে সমাধান করতে পারবে।
- সরল সহসমীকরণের সমাধান লেখচিত্রে দেখাতে পারবে।
- লেখচিত্রের সাহায্যে সরল সহসমীকরণের সমাধান করতে পারবে।

৬.১ সরল সহসমীকরণ (Simple Simultaneous Equation)

$x + y = 5$ একটি সমীকরণ। এখানে, x ও y দুইটি অজানা রাশি বা চলক। এই চলক দুইটি একঘাতবিশিষ্ট। একরূপ সমীকরণ সরল সমীকরণ।

এখানে, যে সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল ৫ সেই সংখ্যা দ্বারাই সমীকরণটি সিদ্ধ হবে। যেমন, $x = 4$, $y = 1$; বা, $x = 3$, $y = 2$; বা, $x = 2$, $y = 3$; বা, $x = 1$, $y = 4$, ইত্যাদি, একরূপ অসংখ্য সংখ্যাযুগল দ্বারা সমীকরণটি সিদ্ধ হবে।

আবার, $x - y = 3$ এই সমীকরণটি বিবেচনা করলে দেখতে পাই, সমীকরণটি $x = 4$, $y = 1$ বা $x = 5$, $y = 2$ বা $x = 6$, $y = 3$ বা $x = 7$, $y = 4$ বা $x = 8$, $y = 5$ বা $x = 2$, $y = -1$ বা $x = 1$, $y = -2$, $x = 0$, $y = -3$... ইত্যাদি অসংখ্য সংখ্যাযুগল দ্বারা সিদ্ধ হয়।

এখানে, $x + y = 5$ এবং $x - y = 3$ সমীকরণ দুইটি একত্রে বিবেচনা করলে উভয় সমীকরণ হতে প্রাপ্ত সংখ্যাযুগলের মধ্যে $x = 4$, $y = 1$ দ্বারা উভয় সমীকরণ যুগপৎ সিদ্ধ হয়।

চলকের মান দ্বারা একাধিক সমীকরণ সিদ্ধ হলে, সমীকরণসমূহকে একত্রে সহসমীকরণ বলা হয় এবং চলক একঘাতবিশিষ্ট হলে সহসমীকরণকে সরল সহসমীকরণ বলে।

ফর্ম-১৩, গণিত-অষ্টম শ্রেণি

চলকদ্বয়ের যে মান দ্বারা সহসমীকরণ যুগপৎ সিদ্ধ হয়, এদেরকে সহসমীকরণের মূল বা সমাধান বলা হয়। এখানে $x + y = 5$ এবং $x - y = 3$ সমীকরণ দুইটি সহসমীকরণ। এদের একমাত্র সমাধান $x = 4, y = 1$ যা $(x, y) = (4, 1)$ দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

৬.২ দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণের সমাধান

দুই চলকবিশিষ্ট দুইটি সরল সমীকরণের সমাধানের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নিচের পদ্ধতি দুইটি আলোচনা করা হলো :

- (১) প্রতিস্থাপন পদ্ধতি (Method of Substitution)
- (২) অপনয়ন পদ্ধতি (Method of Elimination)

(১) প্রতিস্থাপন পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে আমরা নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে সমাধান করতে পারি :

- (ক) যেকোনো সমীকরণ থেকে চলক দুইটির একটির মান অপরটির মাধ্যমে প্রকাশ করা।
- (খ) অপর সমীকরণে প্রাপ্ত চলকের মানটি স্থাপন করে এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান করা।
- (গ) নির্ণীত সমাধান প্রদত্ত সমীকরণ দুইটির যেকোনো একটিতে বসিয়ে অপর চলকের মান নির্ণয় করা।

উদাহরণ ১। সমাধান করো :

$$\begin{aligned}x + y &= 7 \\x - y &= 3\end{aligned}$$

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ

$$\begin{aligned}x + y &= 7 \dots\dots\dots(1) \\x - y &= 3 \dots\dots\dots(2)\end{aligned}$$

সমীকরণ (২) থেকে পক্ষান্তর করে পাই,

$$x = y + 3 \dots\dots\dots(3)$$

সমীকরণ (৩) হতে x এর মানটি সমীকরণ (১) থেকে -এ বসিয়ে পাই,

$$\begin{aligned}y + 3 + y &= 7 \\ \text{বা, } 2y &= 7 - 3 \\ \text{বা, } 2y &= 4 \\ \therefore y &= 2\end{aligned}$$

এখন সমীকরণ (৩) এ $y = 2$ বসিয়ে পাই,

$$\begin{aligned}x &= 2 + 3 \\ \therefore x &= 5\end{aligned}$$

নির্ণেয় সমাধান $(x, y) = (5, 2)$

[শুদ্ধি পরীক্ষা : সমীকরণ দুইটিতে $x = 5$ ও $y = 2$ বসালে সমীকরণ (1)-এর বামপক্ষ $= 5 + 2 = 7$
 $=$ ডানপক্ষ এবং সমীকরণ (2)-এর বামপক্ষ $= 5 - 2 = 3 =$ ডানপক্ষ ।]

উদাহরণ ২। সমাধান করো :

$$x + 2y = 9$$

$$2x - y = 3$$

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ

$$x + 2y = 9 \dots\dots\dots(1)$$

$$2x - y = 3 \dots\dots\dots(2)$$

সমীকরণ (2) থেকে পাই, $y = 2x - 3 \dots\dots\dots (3)$

সমীকরণ (1) এ y -এর মান বসিয়ে পাই, $x + 2(2x - 3) = 9$

$$\text{বা, } x + 4x - 6 = 9$$

$$\text{বা, } 5x = 6 + 9$$

$$\text{বা, } 5x = 15$$

$$\text{বা, } x = \frac{15}{5}$$

$$\therefore x = 3$$

এখন x এর মান সমীকরণ (3)-এ বসিয়ে পাই,

$$y = 2 \times 3 - 3$$

$$= 6 - 3$$

$$= 3$$

নির্ণেয় সমাধান $(x, y) = (3, 3)$

উদাহরণ ৩। সমাধান করো :

$$2y + 5z = 16$$

$$y - 2z = -1$$

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ

$$2y + 5z = 16 \dots\dots\dots(1)$$

$$y - 2z = -1 \dots\dots\dots(2)$$

সমীকরণ (2) থেকে পাই, $y = 2z - 1 \dots\dots\dots(3)$

সমীকরণ (1) এ y -এর মান বসিয়ে পাই,

$$2(2z - 1) + 5z = 16$$

$$\text{বা, } 4z - 2 + 5z = 16$$

$$\text{বা, } 9z = 16 + 2$$

$$\text{বা, } 9z = 18$$

$$\text{বা, } z = \frac{18}{9}$$

$$\therefore z = 2$$

এখন z -এর মান সমীকরণ (3)-এ বসিয়ে পাই,

$$y = 2 \times 2 - 1$$

$$= 4 - 1$$

$$\therefore y = 3$$

নির্ণেয় সমাধান $(y, z) = (3, 2)$

উদাহরণ ৪। সমাধান করো :

$$\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 1$$

$$\frac{4}{x} - \frac{9}{y} = -1$$

সমাধান :

প্রদত্ত সমীকরণ

$$\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 1 \dots\dots\dots (1)$$

$$\frac{4}{x} - \frac{9}{y} = -1 \dots\dots\dots (2)$$

$\frac{1}{x} = u$ এবং $\frac{1}{y} = v$ ধরে (1) ও (2) নম্বর

সমীকরণ থেকে পাই

$$2u + v = 3 \dots\dots\dots (3)$$

$$4u - 9v = -1 \dots\dots\dots (4)$$

(3) নম্বর সমীকরণ থেকে পাই

$$v = 3 - 2u \dots\dots\dots (5)$$

(4) নম্বর সমীকরণে v -এর মান বসিয়ে পাই,

$$4u - 9(3 - 2u) = -1$$

$$\text{বা, } 4u - 9 + 18u = -1$$

$$\text{বা, } 22u = 9 - 1$$

$$\therefore u = \frac{8}{22} = \frac{4}{11}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{x} = \frac{4}{11}$$

$$\therefore x = \frac{11}{4}$$

এখন, u -এর মান (5) নম্বর সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$v = 1 - 2 \times \frac{4}{11} = \frac{11-8}{11}$$

$$\therefore v = \frac{3}{11}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{y} = \frac{3}{11}$$

$$\therefore y = \frac{11}{3}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান } (x, y) = \left(\frac{11}{4}, \frac{11}{3}\right)$$

(২) অপনয়ন পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে সমাধান করা যায় :

(ক) প্রদত্ত উভয় সমীকরণকে এমন দুইটি সংখ্যা বা রাশি দ্বারা পৃথকভাবে গুণ করতে হবে যেন যেকোনো

একটি চলকের সহগের সাংখ্যিক মান সমান হয়।

(খ) উক্ত একটি চলকের সহগ একই চিহ্নবিশিষ্ট হলে সমীকরণ পরস্পর বিয়োগ, অন্যথায় যোগ করতে হবে।

বিয়োগফলকৃত (বা যোগফলকৃত) সমীকরণটি একটি এক চলকবিশিষ্ট সরল সমীকরণ হবে।

(গ) সরল সমীকরণ সমাধানের নিয়মে চলকটির মান নির্ণয় করা।

(ঘ) প্রাপ্ত চলকের মান প্রদত্ত যেকোনো একটি সমীকরণে বসিয়ে অপর চলকের মান নির্ণয় করা।

উদাহরণ ৫। সমাধান করো :

$$5x - 4y = 6$$

$$x + 2y = 4$$

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ

$$5x - 4y = 6 \dots\dots\dots(1)$$

$$x + 2y = 4 \dots\dots\dots(2)$$

এখানে সমীকরণ (1) কে 1 দ্বারা এবং সমীকরণ (2) কে 2 দ্বারা গুণ করে পাই,

$$5x - 4y = 6 \dots\dots\dots(3)$$

$$2x + 4y = 8 \dots\dots\dots(4)$$

(3) ও (4) সমীকরণ যোগ করে পাই,

$$7x = 14$$

$$\text{বা, } x = \frac{14}{7} \dots\dots\dots(4)$$

$$\therefore x = 2$$

সমীকরণ (2) এ x -এর মান বসিয়ে পাই,

$$2 + 2y = 4$$

$$\text{বা, } 2y = 4 - 2$$

$$\text{বা, } y = \frac{2}{2}$$

$$\therefore y = 1$$

নির্ণেয় সমাধান $(x, y) = (2, 1)$

উদাহরণ ৬। সমাধান করো :

$$x + 4y = 14$$

$$7x - 3y = 5$$

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ

$$x + 4y = 14 \dots\dots\dots(1)$$

$$7x - 3y = 5 \dots\dots\dots(2)$$

সমীকরণ (1) কে 3 দ্বারা এবং সমীকরণ (2) কে 4 দ্বারা গুণ করে পাই,

$$3x + 12y = 42 \dots\dots\dots(3)$$

$$28x - 12y = 20 \dots\dots\dots(4)$$

$$31x = 62 \quad \text{[যোগ করে]}$$

$$\text{বা, } x = \frac{62}{31}$$

$$\therefore x = 2$$

এখন x -এর মান সমীকরণ (1) -এ বসিয়ে পাই,

$$2 + 4y = 14$$

$$\text{বা, } 4y = 14 - 2$$

$$\text{বা, } 4y = 12$$

$$\text{বা, } y = \frac{12}{4}$$

$$\therefore y = 3$$

$$\therefore (x, y) = (2, 3)$$

উদাহরণ ৭। সমাধান করো :

$$5x - 3y = 9$$

$$3x - 5y = -1$$

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ

$$5x - 3y = 9 \dots\dots\dots(1)$$

$$3x - 5y = -1 \dots\dots\dots(2)$$

সমীকরণ (1) কে 5 দ্বারা এবং সমীকরণ (2) কে 3 দ্বারা গুণ করে পাই

$$25x - 15y = 45 \dots\dots\dots(3)$$

$$9x - 15y = -3 \dots\dots\dots(4)$$

$$\begin{array}{r} (-) \quad (+) \quad (+) \\ \hline \end{array}$$

$$16x = 48 \text{ [বিয়োগ করে]}$$

$$\text{বা, } x = \frac{48}{16}$$

$$\therefore x = 3$$

সমীকরণ (1) -এ x -এর মান বসিয়ে পাই,

$$5 \times 3 - 3y = 9$$

$$\text{বা, } 15 - 3y = 9$$

$$\text{বা, } -3y = 9 - 15$$

$$\text{বা, } -3y = -6$$

$$\text{বা, } y = \frac{-6}{-3}$$

$$\therefore y = 2$$

$$\therefore (x, y) = (3, 2)$$

উদাহরণ ৮।

$$\frac{x}{5} + \frac{3}{y} = 3$$

$$\frac{x}{2} - \frac{6}{y} = 2$$

সমাধান:

প্রদত্ত সমীকরণ

$$\frac{x}{5} + \frac{3}{y} = 3 \dots\dots\dots(1)$$

$$\frac{x}{2} - \frac{6}{y} = 2 \dots\dots\dots(2)$$

(1) সমীকরণকে (2) দ্বারা গুণ করে (2) নম্বর সমীকরণের সাথে যোগ করে পাই,

$$\frac{2x}{5} + \frac{6}{y} = 6 \dots\dots\dots (3)$$

$$\frac{x}{2} - \frac{6}{y} = 2 \dots\dots\dots (4)$$

$$\frac{2x}{5} + \frac{x}{2} = 8$$

$$\text{বা, } \frac{4x + 5x}{10} = 8$$

$$\text{বা, } 9x = 8 \times 10$$

$$\text{বা, } x = \frac{80}{9}$$

(1) নম্বর সমীকরণে x -এর মান বসিয়ে পাই,

$$\frac{1}{5} \times \frac{80}{9} + \frac{3}{y} = 3$$

$$\text{বা, } \frac{16}{9} + \frac{3}{y} = 3$$

$$\text{বা, } \frac{3}{y} = 3 - \frac{16}{9}$$

$$\text{বা, } \frac{3}{y} = \frac{11}{9}$$

$$\text{বা, } \frac{3}{y} = \frac{11}{9}$$

$$\text{বা, } y = \frac{27}{11}$$

$$\therefore \text{ নির্ণেয় সমাধান } (x, y) = \left(\frac{80}{9}, \frac{27}{11} \right)$$

অনুশীলনী ৬.১

(ক) প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করো (১-১২) :

$$১। \begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

$$২। \begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$৩। \begin{cases} 3x + 2y = 10 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

$$৪। \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \\ \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \end{cases}$$

$$৫। \begin{cases} 3x - 2y = 0 \\ 17x - 7y = 13 \end{cases}$$

$$৬। \begin{cases} x - y = 2a \\ ax + by = a^2 + b^2 \end{cases}$$

$$৭। \begin{cases} ax + by = ab \\ bx + ay = ab \end{cases}$$

$$৮। \begin{cases} ax - by = ab \\ bx - ay = ab \end{cases}$$

$$৯। \begin{cases} ax - by = a - b \\ ax + by = a + b \end{cases}$$

$$১০। \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{6} \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{6} \end{cases}$$

$$১১। \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = \frac{2}{a} + \frac{1}{b} \\ \frac{x}{b} - \frac{y}{a} = \frac{2}{b} - \frac{1}{a} \end{cases}$$

$$১২। \begin{cases} \frac{a}{x} + \frac{b}{y} = \frac{a}{2} + \frac{b}{3} \\ \frac{a}{x} - \frac{b}{y} = \frac{a}{2} - \frac{b}{3} \end{cases}$$

(খ) অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করো (১৩-২৬) :

$$১৩। \begin{cases} x - y = 4 \\ x + y = 6 \end{cases}$$

$$১৪। \begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 6x - 7y = 5 \end{cases}$$

$$১৫। \begin{cases} 4x + 3y = 15 \\ 5x + 4y = 19 \end{cases}$$

$$১৬। \begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$$

$$১৭। \begin{cases} 4x - 3y = -1 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$$

$$১৮। \begin{cases} 3x - 5y = -9 \\ 5x - 3y = 1 \end{cases}$$

$$১৯। \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = 3 \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{2} = 1 \end{cases}$$

$$২০। \begin{cases} x + ay = b \\ ax - by = c \end{cases}$$

$$২১। \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 3 \\ x - \frac{y}{3} = 3 \end{cases}$$

$$২২। \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{2}{y} = 1 \\ \frac{x}{4} - \frac{3}{y} = 3 \end{cases}$$

$$২৩। \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = \frac{2}{a} + \frac{1}{b} \\ \frac{x}{b} - \frac{y}{a} = \frac{2}{b} - \frac{1}{a} \end{cases}$$

$$২৪। \begin{cases} \frac{a}{x} + \frac{b}{y} = \frac{a}{2} + \frac{b}{3} \\ \frac{a}{x} - \frac{b}{y} = \frac{a}{2} - \frac{b}{3} \end{cases}$$

$$২৫। \begin{cases} \frac{x}{6} + \frac{2}{y} = 2 \\ \frac{x}{4} - \frac{1}{y} = 1 \end{cases}$$

$$২৬। \begin{cases} x + y = a - b \\ ax - by = a^2 + b^2 \end{cases}$$

৬.৩ বাস্তবভিত্তিক সমস্যার সহসমীকরণ গঠন ও সমাধান

সরল সহসমীকরণের ধারণা থেকে বাস্তব জীবনের বহু সমস্যা সমাধান করা যায়। অনেক সমস্যায় একাধিক চলক আসে। প্রত্যেক চলকের জন্য আলাদা প্রতীক ব্যবহার করে সমীকরণ গঠন করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে যতগুলো প্রতীক ব্যবহার করা হয়, ততগুলো সমীকরণ গঠন করতে হয়। অতঃপর সমীকরণগুলো সমাধান করে চলকের মান নির্ণয় করা যায়।

উদাহরণ ১। দুইটি সংখ্যার যোগফল 60 এবং বিয়োগফল 20 হলে, সংখ্যা দুইটি নির্ণয় করো।

সমাধান : মনে করি, সংখ্যা দুইটি x ও y , যেখানে $x > y$

১ম শর্তানুসারে, $x + y = 60$(1)

২য় শর্তানুসারে, $x - y = 20$(2)

সমীকরণ (1) ও (2) যোগ করে পাই,

$$\begin{aligned} 2x &= 80 \\ \text{বা } x &= \frac{80}{2} = 40 \end{aligned}$$

আবার, সমীকরণ (1) থেকে সমীকরণ (2) বিয়োগ করে পাই,

$$\begin{aligned} 2y &= 40 \\ \therefore y &= \frac{40}{2} = 20 \end{aligned}$$

নির্ণেয় সংখ্যা দুইটি 40 ও 20।

উদাহরণ ২। ফাইয়াজ ও আয়াজের কতকগুলো আপেল-কুল ছিল। ফাইয়াজের আপেল-কুল থেকে আয়াজকে 10টি আপেল-কুল দিলে আয়াজের আপেল-কুলের সংখ্যা ফাইয়াজের আপেল-কুলের সংখ্যার তিনগুণ হতো।

আর আয়াজের আপেল-কুল থেকে ফাইয়াজকে 20টি দিলে ফাইয়াজের আপেল-কুলের সংখ্যা আয়াজের সংখ্যার দ্বিগুণ হতো। কার কতগুলো আপেল-কুল ছিল ?

সমাধান : মনে করি, ফাইয়াজের আপেল-কুলের সংখ্যা x
এবং আয়াজের আপেল-কুলের সংখ্যা y

১ম শর্তানুসারে, $y + 10 = 3(x - 10)$

$$\text{বা, } y + 10 = 3x - 30$$

$$\text{বা, } 3x - y = 10 + 30$$

$$\text{বা, } 3x - y = 40 \text{.....(1)}$$

২য় শর্তানুসারে, $x + 20 = 2(y - 20)$

$$\text{বা, } x + 20 = 2y - 40$$

$$\text{বা, } x - 2y = -40 - 20$$

$$\text{বা, } x - 2y = -60 \dots \dots \dots (2)$$

সমীকরণ (1) কে 2 দ্বারা গুণ করে তা থেকে সমীকরণ (2) বিয়োগ করে পাই,

$$\begin{array}{r} 6x - 2y = 80 \\ -x - 2y = -60 \\ \hline 5x = 140 \\ \therefore x = \frac{140}{5} = 28 \end{array}$$

x এর মান সমীকরণ (1) এ বসিয়ে পাই,

$$3 \times 28 - y = 40$$

$$\text{বা, } -y = 40 - 84$$

$$\text{বা, } -y = -44$$

$$\therefore y = 44$$

$\therefore$ ফাইয়াজের আপেল-কুলের সংখ্যা 28টি

আয়াজের আপেল-কুলের সংখ্যা 44টি

উদাহরণ ৩। 10 বছর পূর্বে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ছিল 4 : 1। 10 বছর পরে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত হবে 2 : 1। পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স নির্ণয় করো।

সমাধান : মনে করি, বর্তমানে পিতার বয়স x বছর

এবং পুত্রের বয়স y বছর

১ম শর্তানুসারে, $(x - 10) : (y - 10) = 4 : 1$

$$\text{বা, } \frac{x - 10}{y - 10} = \frac{4}{1}$$

$$\text{বা, } x - 10 = 4y - 40$$

$$\text{বা, } x - 4y = 10 - 40$$

$$\therefore x - 4y = -30 \dots \dots \dots (1)$$

২য় শর্তানুসারে, $(x + 10) : (y + 10) = 2 : 1$

$$\text{বা, } \frac{x + 10}{y + 10} = \frac{2}{1}$$

$$\text{বা, } x + 10 = 2y + 20$$

$$\text{বা, } x - 2y = 20 - 10$$

$$\therefore x - 2y = 10 \dots \dots \dots (2)$$

সমীকরণ (1) ও (2) থেকে পাই,

$$x - 4y = -30$$

$$x - 2y = 10$$

$$\begin{array}{r} - \quad + \quad - \\ \hline -2y = -40 \quad [\text{বিয়োগ করে}] \end{array}$$

$$\therefore y = \frac{-40}{-2} = 20$$

y -এর মান সমীকরণ (2) -এ বসিয়ে পাই,

$$x - 2 \times 20 = 10$$

$$\text{বা, } x = 10 + 40$$

$$\therefore x = 50$$

$\therefore$ বর্তমানে পিতার বয়স 50 বছর এবং পুত্রের বয়স 20 বছর।

উদাহরণ 8। দুই অঙ্কবিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টির সাথে 7 যোগ করলে যোগফল দশক স্থানীয় অঙ্কটির তিনগুণ হয়। কিন্তু সংখ্যাটি থেকে 18 বাদ দিলে অঙ্কদ্বয় স্থান পরিবর্তন করে। সংখ্যাটি নির্ণয় করো।

সমাধান : মনে করি, দুই অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যাটির একক স্থানীয় অঙ্ক x এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক y ।

$$\therefore \text{সংখ্যাটি} = x + 10y \text{ এবং অঙ্কদ্বয় স্থান পরিবর্তন করলে প্রাপ্ত সংখ্যা} = y + 10x$$

১ম শর্তানুসারে, $x + y + 7 = 3y$

$$\text{বা, } x + y - 3y = -7$$

$$\text{বা, } x - 2y = -7 \dots\dots\dots(1)$$

২য় শর্তানুসারে, $x + 10y - 18 = y + 10x$

$$\text{বা, } x + 10y - y - 10x = 18$$

$$\text{বা, } 9y - 9x = 18$$

$$\text{বা, } 9(y - x) = 18$$

$$\text{বা, } y - x = \frac{18}{9} = 2$$

$$\therefore y - x = 2 \dots\dots\dots(2)$$

(1) ও (2) নম্বর যোগ করে পাই, $-y = -5$

$$\therefore y = 5$$

y -এর মান (1) নম্বরে বসিয়ে পাই,

$$x - 2 \times 5 = -7$$

$$\therefore x = 3$$

$$\text{নির্ণেয় সংখ্যাটি} = 3 + 10 \times 5 = 3 + 50 = 53$$

উদাহরণ ৫। কোনো ভগ্নাংশের লবের সাথে ৭ যোগ করলে ভগ্নাংশটির মান ২ হয় এবং হর থেকে ২ বাদ দিলে ভগ্নাংশটির মান ১ হয়। ভগ্নাংশটি নির্ণয় করো।

সমাধান : মনে করি, ভগ্নাংশটি $\frac{x}{y}$, $y \neq 0$

১ম শর্তানুসারে, $\frac{x+7}{y} = 2$

$$\text{বা, } x+7 = 2y$$

$$\text{বা, } x-2y = -7 \dots\dots\dots (1)$$

২য় শর্তানুসারে, $\frac{x}{y-2} = 1$

$$\text{বা, } x = y-2$$

$$\text{বা, } x-y = -2 \dots\dots\dots (2)$$

সমীকরণ (1) ও (2) হতে পাই,

$$x-2y = -7$$

$$x-y = -2$$

$$\begin{array}{r} - \quad + \quad + \\ \hline \end{array}$$

$$-y = -5 \quad [\text{বিয়োগ করে}]$$

$$\therefore y = 5$$

আবার, $y = 5$ সমীকরণ (2)-এ বসিয়ে পাই,

$$x-5 = -2$$

$$\therefore x = 5-2 = 3$$

নির্ণেয় ভগ্নাংশ $\frac{3}{5}$

৬.৪ লেখচিত্রের সাহায্যে সরল সহসমীকরণের সমাধান

দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণে দুইটি সরল সমীকরণ থাকে। দুইটি সরল সমীকরণের জন্য লেখ অঙ্কন করলে দুইটি সরলরেখা পাওয়া যায়। এদের ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক উভয় সরলরেখায় অবস্থিত। এই ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক অর্থাৎ (x, y) প্রদত্ত সরল সহসমীকরণের মূল হবে। x ও y -এর প্রাপ্ত মান দ্বারা সমীকরণ দুইটি যুগপৎ সিদ্ধ হবে। অতএব, সরল সহসমীকরণ যুগলের একমাত্র সমাধান, যা ছেদবিন্দুটির ভূজ ও কোটি।

মন্তব্য : সরলরেখা দুইটি সমান্তরাল হলে, প্রদত্ত সহসমীকরণের কোনো সমাধান নেই।

উদাহরণ ৬। লেখের সাহায্যে সমাধান করো :

$$x + y = 7 \dots\dots\dots(i)$$

$$x - y = 1 \dots\dots\dots(ii)$$

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ (i) থেকে পাই,

$$y = 7 - x \dots\dots\dots(iii)$$

x -এর বিভিন্ন মানের জন্য y -এর মান বের করে নিচের ছকটি তৈরি করি :

x	-2	-1	0	1	2	3	4
y	9	8	7	6	5	4	3

ছক-১

আবার, সমীকরণ (ii) থেকে পাই,

$$y = x - 1 \dots\dots\dots(iv)$$

x -এর বিভিন্ন মানের জন্য y -এর মান বের করে নিচের ছকটি তৈরি করি :

x	-2	-1	0	1	2	3	4
y	-3	-2	-1	0	1	2	3

ছক-২

মনে করি, XOX' ও YOY' সরলরেখা যথাক্রমে x -অক্ষ ও y -অক্ষ এবং O মূলবিন্দু।

উভয় অক্ষের ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্যকে একক ধরি।


ছক-১ এ $(-2, 9), (-1, 8), (0, 7), (1, 6), (2, 5),$

$(3, 4)$ ও $(4, 3)$ বিন্দুগুলোকে ছক কাগজে স্থাপন

করি। এই বিন্দুগুলো যোগ করে উভয় দিকে বর্ধিত

করে সমীকরণ (i) দ্বারা নির্দেশিত সরলরেখাটির

লেখ পাই।



লেখচিত্র

আবার, ছক-২ এর $(-2, -3), (-1, -2), (0, -1), (1, 0), (2, 1), (3, 2)$ ও $(4, 3)$ বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করি। এই বিন্দুগুলো যোগ করে (ii) নম্বর সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত সরলরেখাটির লেখ পাই।

এই সরলরেখাটি পূর্বোক্ত সরলরেখাকে A বিন্দুতে ছেদ করে। A বিন্দু উভয় সরলরেখার সাধারণ বিন্দু।

এর স্থানান্তর উভয় সমীকরণকে সিদ্ধ করে। লেখ থেকে দেখা যায়, A বিন্দুর ভূজ ৪ এবং কোটি ৩।

নির্ণেয় সমাধান $(x, y) = (4, 3)$

উদাহরণ ৭। লেখের সাহায্যে সমাধান করো :

$$3x + 4y = 10 \dots\dots\dots(i)$$

$$x - y = 1 \dots\dots\dots(ii)$$

সমীকরণ (i) থেকে পাই,

$$4y = 10 - 3x$$

$$y = \frac{10 - 3x}{4}$$

x -এর বিভিন্ন মানের জন্য y -এর মান বের করে নিচের ছকটি তৈরি করি :

x	-2	0	2	4	6
y	4	$\frac{5}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	-2

ছক-১

(ii) এর সমীকরণ থেকে পাই,

$$y = x - 1$$

x -এর বিভিন্ন মানের জন্য y -এর মান বের করে নিচের ছকটি তৈরি করি :

x	-2	0	2	4	6
y	-3	-1	1	3	5


ছক-২

মনে করি, XOX' ও YOY' সরলরেখা যথাক্রমে x -অক্ষ ও y -অক্ষ এবং O মূলবিন্দু।

উভয় অক্ষের ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্যকে একক ধরি। ছক-১ এর $(-2, 4), (0, \frac{5}{2}), (2, 1), (4, -\frac{1}{2})$ ও $(6, -2)$

বিন্দুগুলোকে লেখ কাগজে স্থাপন করি। এই বিন্দুগুলো যোগ করে উভয় দিকে বর্ধিত করে একটি সরলরেখা পাওয়া গেল। যা (i) নম্বর সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত সরলরেখার লেখচিত্র।

আবার, ছক-২ এর $(-2, -3), (0, -1), (2, 1), (4, 3)$ ও $(6, 5)$ বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করি। এই বিন্দুগুলো যোগ করে উভয় দিকে বর্ধিত করে একটি সরলরেখা পাওয়া গেল যা, (ii) নম্বর সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত সরলরেখার লেখচিত্র।



লেখচিত্র

এই সরলরেখাটি পূর্বোক্ত সরলরেখাকে A বিন্দুতে ছেদ করে। A বিন্দু উভয় সরলরেখার সাধারণ বিন্দু।

এর স্থানাঙ্ক উভয় সমীকরণকে সিদ্ধ করে। লেখ থেকে দেখা যায় যে, A বিন্দুর ভূজ ২ এবং কোটি ১।

নির্ণেয় সমাধান $(x, y) = (2, 1)$

অনুশীলনী ৬.২

- ১। নিচের কোনটি সরলরেখার সমীকরণ নির্দেশ করে না?
- ক) $3x - 3y = 0$ খ) $x + y = 5$ গ) $x = \frac{1}{y}$ ঘ) $4x + 5y = 9$
- ২। $x - 2y = 8$ ও $3x - 2y = 4$ সমীকরণ জোড়ের x -এর মান কত?
- ক) -5 খ) -2 গ) 2 ঘ) 5
- ৩। $4x + 5y = 9$ সমীকরণটিতে কয়টি চলক আছে?
- ক) 0 খ) 1 গ) 2 ঘ) 3
- ৪। মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি?
- ক) $(0, 0)$ খ) $(0, 1)$ গ) $(1, 0)$ ঘ) $(1, 1)$
- ৫। দুইটি সংখ্যার যোগফল 100 এবং বিয়োগফল 20 হলে, সংখ্যা দুইটি নির্ণয় করো।
- ৬। দুইটি সংখ্যার যোগফল 160 এবং একটি অপরটির তিনগুণ হলে, সংখ্যা দুইটি নির্ণয় করো।
- ৭। দুইটি সংখ্যার প্রথমটির তিনগুণের সাথে দ্বিতীয়টির দুইগুণ যোগ করলে 59 হয়। আবার, প্রথমটির দুইগুণ থেকে দ্বিতীয়টি বিয়োগ করলে 9 হয়। সংখ্যা দুই নির্ণয় করো।
- ৮। 5 বছর পূর্বে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ছিল 3 : 1 এবং 15 বছর পর পিতা-পুত্রের বয়সের অনুপাত হবে 2 : 1। পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স নির্ণয় করো।
- ৯। কোনো ভগ্নাংশের লবের সাথে 5 যোগ করলে এর মান 2 হয়। আবার, হর থেকে 1 বিয়োগ করলে এর মান 1 হয়। ভগ্নাংশটি নির্ণয় করো।
- ১০। কোনো প্রকৃত ভগ্নাংশের লব ও হরের যোগফল 14 এবং বিয়োগফল 8 হলে, ভগ্নাংশটি নির্ণয় করো।
- ১১। দুই অঙ্কবিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের যোগফল 10 এবং বিয়োগফল 4 হলে, সংখ্যাটি নির্ণয় করো।
- ১২। একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা 25 মিটার বেশি। আয়তাকার ক্ষেত্রটির পরিসীমা 150 মিটার হলে, ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো।
- ১৩। একজন বালক দোকান থেকে 15টি খাতা ও 10টি পেন্সিল 300 টাকা দিয়ে ক্রয় করল। আবার অন্য একজন বালক একই দোকান থেকে একই ধরনের 10টি খাতা ও 15টি পেন্সিল 250 টাকায় ক্রয় করলো। প্রতিটি খাতা ও পেন্সিলের মূল্য নির্ণয় করো।
- ১৪। একজন লোকের নিকট 5000 টাকা আছে। তিনি উক্ত টাকা দুই জনের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দিলেন যেন, প্রথম জনের টাকা দ্বিতীয় জনের টাকার 4 গুণ হয়। প্রত্যেকের টাকার পরিমাণ নির্ণয় করো।

১৫। লেখের সাহায্যে সমাধান করো :

ক. $x + y = 6$	খ. $x + 4y = 11$
$x - y = 2$	$4x - y = 10$
গ. $3x + 2y = 21$	ঘ. $x + 2y = 1$
$2x - 3y = 1$	$x - y = 7$
ঙ. $x - y = 0$	চ. $4x + 3y = 11$
$x + 2y = -15$	$3x - 4y = 2$

১৬। কোনো ভগ্নাংশের লবের সাথে 11 যোগ করলে ভগ্নাংশটির মান 2 হয়। আবার হর থেকে 2 বিয়োগ করলে ভগ্নাংশটির মান 1 হয়।

ক) ভগ্নাংশটি $\frac{x}{y}$ ধরে সমীকরণ জোট গঠন করো।

খ) সমীকরণ জোটটি অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করে (x, y) নির্ণয় করো।

গ) সমীকরণ জোটটির লেখ অঙ্কন করে ছেদ বিন্দুর ভূজ ও কোটি নির্ণয় করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। $x + y = 5$, $x - y = 3$ হলে (x, y) -এর মান নিচের কোনটি?

ক) (4, 1) খ) (1, 4) গ) (2, 3) ঘ) (3, 2)

২। $(-3, -5)$ বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?

ক) প্রথম খ) দ্বিতীয় গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

৩। $x + 2y = 30$ সমীকরণের লেখচিত্রের ওপর অবস্থিত বিন্দু

i. (10, 10)

ii. (0, 15)

iii. (10, 20)

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি লক্ষ করে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

x ও y সংখ্যা দুইটির বিয়োগফলের অর্ধেক ৪। বড় সংখ্যাটির সাথে ছোট সংখ্যাটির তিনগুণ যোগ করলে যোগফল ২০ হয়; যেখানে $x > y$ ।

৪। প্রথম শর্ত কোনটি?

ক) $x - y = 4$

খ) $x - y = 8$

গ) $y - x = 4$

ঘ) $y - x = 8$

৫। (x, y) এর মান নিচের কোনটি?

ক) $(3, 11)$

খ) $(7, 3)$

গ) $(11, 7)$

ঘ) $(11, 3)$

সৃজনশীল প্রশ্ন

৬। ২০০ মিটার পরিসীমাবিশিষ্ট দুইটি আয়তাকার বাগানের ১মটির দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড়গুণ এবং ২য়টির দৈর্ঘ্য প্রস্থের দিগুণ অপেক্ষা ১০ মিটার বেশি।

ক) $2x - y = 5$ রেখাটি Y অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে।

খ) ১ম বাগানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো।

গ) সমীকরণ জোট গঠন করে লেখচিত্রের সাহায্যে ২য় বাগানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো।

৭। $7x - 3y = 31$ ও $9x - 5y = 41$ দুইটি সরল সমীকরণ জোট।

ক) $(4, -1)$ বিন্দুটি কোন সমীকরণকে সিদ্ধ করে তা নির্ণয় করো।

খ) প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করো।

গ) লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৮। ক) কোন সংখ্যার তিন গুণের সাথে দুই গুণ যোগ করলে যোগফল ৪৫ হয়?

খ) $2x + y = 9$ ও $x + 2y = 9$ সমীকরণদ্বয়ের সমাধান নির্ণয় করো।

গ) $3x + 2y = 13$ ও $2x - y = 4$ সরল সহসমীকরণ সমাধান করে x এর মান নির্ণয় করো।

ঘ) পিতার বয়স পুত্রের বয়সের চারগুণ। ৪ বছর পূর্বে পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৫২ বছর ছিল। পিতার বর্তমান বয়স নির্ণয় করো।

ঙ) $3x + 2y = 12$ সরলরেখাটি X ও Y অক্ষকে কোন কোন বিন্দুতে ছেদ করে।

সপ্তম অধ্যায়

সেট

সেট শব্দটি আমাদের সুপরিচিত। যেমন : টিসেট, সোফাসেট, ডিনারসেট, এক সেট বই ইত্যাদি। জার্মান গণিতবিদ জর্জ ক্যান্টর (১৮৪৫-১৯১৮) সেট সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা করেন। সেট সংক্রান্ত তাঁর ব্যাখ্যা গণিত শাস্ত্রে সেটতত্ত্ব (Set Theory) হিসেবে পরিচিত। সেটের প্রাথমিক ধারণা থেকে প্রতীক ও চিত্রের মাধ্যমে সেট সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যিক। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সেট, সেট প্রক্রিয়া ও সেটের ধর্মাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা—

- সেট ও সেট গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সসীম সেট, সার্বিক সেট, পূরক সেট, ফাঁকা সেট, নিশ্চেষ্ট সেট বর্ণনা করতে পারবে এবং এদের গঠন প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারবে।
- একাধিক সেটের সংযোগ সেট, ছেদ সেট গঠন ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ভেনচিত্র ও উদাহরণের সাহায্যে সেট প্রক্রিয়ার সহজ ধর্মাবলি যাচাই ও প্রমাণ করতে পারবে।
- সেটের ধর্মাবলি প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

৭.১ সেট (Set)

বাস্তব বা চিন্তাজগতের সু-সংজ্ঞায়িত বস্তুর সমাবেশ বা সংগ্রহকে সেট বলে। ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম পাঁচটি বর্ণ, এশিয়া মহাদেশের দেশসমূহ, স্বাভাবিক সংখ্যা ইত্যাদির সেট সু-সংজ্ঞায়িত সেটের উদাহরণ। কোন বস্তু বিবেচনাধীন সেটের অন্তর্ভুক্ত আর কোনটি নয় তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হতে হবে। সেটের বস্তুর কোনো পুনরাবৃত্তি ও ক্রম নেই।

সেটের প্রত্যেক বস্তুকে সেটের উপাদান (element) বলা হয়। সেটকে সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার বড় হাতের অক্ষর $A, B, C, \dots, X, Y, Z$ দ্বারা এবং উপাদানকে ছোট হাতের অক্ষর $a, b, c, \dots, x, y, z$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

সেটের উপাদানগুলোকে $\{ \}$ এই প্রতীকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে সেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন : a, b, c -এর সেট $\{a, b, c\}$; তিস্তা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদ-নদীর সেট $\{তিস্তা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র\}$, প্রথম দুইটি জোড় স্বাভাবিক সংখ্যার সেট $\{2, 4\}$; 6 এর গুণনীয়কসমূহের সেট $\{1, 2, 3, 6\}$ ইত্যাদি। মনে করি, সেট A -এর একটি উপাদান x । একে গাণিতিকভাবে $x \in A$ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $x \in A$ কে পড়তে হয়, x , A সেটের উপাদান (x belongs to A)। যেমন, $B = \{m, n\}$ হলে, $m \in B$ এবং $n \in B$ ।

৯৯

উদাহরণ ১। প্রথম পাঁচটি বিজোড় সংখ্যার সেট A হলে, $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

কাজ :

১. সার্কভুক্ত দেশগুলোর নামের সেট লেখ।
২. 1 থেকে 20 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাসমূহের সেট লেখ।
৩. 300 ও 400 এর মধ্যে অবস্থিত 3 দ্বারা বিভাজ্য যেকোনো চারটি সংখ্যার সেট লেখ।

৭.২ সেট প্রকাশের পদ্ধতি

সেট প্রধানত দুই পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়। যথা: (১) তালিকা পদ্ধতি (*Tabular Method*)

(২) সেট গঠন পদ্ধতি (*Set Builder Method*)

(১) তালিকা পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে সেটের সকল উপাদান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে দ্বিতীয় বন্ধনী $\{ \}$ এর মধ্যে আবদ্ধ করা হয় এবং একাধিক উপাদান থাকলে ‘কমা’ ব্যবহার করে উপাদানগুলোকে পৃথক করা হয়। যেমন : $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x, y, z\}$, $C = \{100\}$, $D = \{\text{গোলাপ, রজনীগন্ধা}\}$, $E = \{\text{রহিম, সুমন, শুভ্র, চাংপাই}\}$ ইত্যাদি।

(২) সেট গঠন পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে সেটের সকল উপাদান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে উপাদান নির্ধারণের জন্য শর্ত দেওয়া থাকে। যেমন : 10 -এর চেয়ে ছোট স্বাভাবিক জোড় সংখ্যার সেট A হলে,

$$A = \{x : x \text{ স্বাভাবিক জোড় সংখ্যা, } x < 10\}$$

এখানে, ‘:’ দ্বারা ‘এরূপ যেন’ বা সংক্ষেপে ‘যেন’ বোঝায়।

সেট গঠন পদ্ধতিতে $\{ \}$ -এর ভেতরে ‘:’ চিহ্নের আগে একটি অজানা রাশি বা চলক ধরে নিতে হয় এবং পরে চলকের ওপর প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করতে হয়। যেমন: $\{3, 6, 9, 12\}$ সেটটিকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে চাই। লক্ষ করি, 3, 6, 9, 12, সংখ্যাগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা, 3 দ্বারা বিভাজ্য এবং 12 এর বড় নয়। এক্ষেত্রে সেটের উপাদানকে ‘ y ’ চলক বিবেচনা করলে ‘ y ’ এর ওপর শর্ত হবে y স্বাভাবিক সংখ্যা, 3 -এর গুণিতক এবং 12 এর চেয়ে বড় নয় ($y \leq 12$)।

সুতরাং সেট গঠন পদ্ধতিতে হবে $\{y : y \text{ স্বাভাবিক সংখ্যা, 3-এর গুণিতক এবং } y \leq 12\}$ ।

উদাহরণ ২। $P = \{4, 8, 12, 16, 20\}$ সেটটিকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

সমাধান : P সেটের উপাদানসমূহ 4, 8, 12, 16, 20

এখানে, প্রত্যেকটি উপাদান জোড় সংখ্যা, 4 এর গুণিতক এবং 20 এর বড় নয়।

$$\therefore P = \{x : x \text{ জোড় সংখ্যা, 4 এর গুণিতক এবং } x \leq 20\}$$

উদাহরণ ৩। $Q = \{x : x, 42 \text{ এর সকল গুণনীয়ক}\}$ সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

সমাধান : Q সেটটি 42 এর গুণনীয়কসমূহের সেট।

$$\text{এখানে, } 42 = 1 \times 42 = 2 \times 21 = 3 \times 14 = 6 \times 7$$

$$\therefore 42 \text{ এর গুণনীয়কসমূহ } 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42$$

$$\text{নির্ণেয় সেট } Q = \{1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42\}$$

কাজ :

১। $A = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$ সেটটিকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

২। $B = \{x : x, 24 \text{ এর গুণনীয়ক}\}$ সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

৭.৩ সেটের প্রকারভেদ

সসীম সেট (Finite set)

যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করে নির্ধারণ করা যায়, একে সসীম সেট বলে। যেমন : $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{5, 10, 15, \dots, 100\}$ ইত্যাদি সসীম সেট। এখানে A সেটে ৪টি উপাদান এবং B সেটে ২০টি উপাদান আছে।

অসীম সেট (Infinite set)

যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করে নির্ধারণ করা যায় না, একে অসীম সেট বলে। অসীম সেটের একটি উদাহরণ হলো স্বাভাবিক সংখ্যার সেট, $N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ । এখানে, N সেটের উপাদান সংখ্যা অসংখ্য যা গণনা করে নির্ধারণ করা যায় না। এই শ্রেণিতে শুধু সসীম সেট নিয়ে আলোচনা করা হবে।


ফাঁকা সেট (Empty set)

যে সেটের কোনো উপাদান নেই একে ফাঁকা সেট বলে। ফাঁকা সেটকে $\emptyset$ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

সুতরাং $\emptyset = \{ \}$ ।

৭.৪ ভেনচিত্র (Venn-diagram)

জন ভেন (১৮৩৪-১৮৮৩) চিত্রের সাহায্যে সেট প্রকাশ করার রীতি প্রবর্তন করেন। এই চিত্রগুলো তাঁর নামানুসারে ভেনচিত্র নামে পরিচিত। ভেনচিত্রে সাধারণত আয়তাকার ও বৃত্তাকার ক্ষেত্র ব্যবহার করা হয়। নিচে কয়েকটি সেটের ভেনচিত্র প্রদর্শন করা হলো :



ভেনচিত্র ব্যবহার করে অতি সহজে সেট ও সেট প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যাচাই করা যায়।

৭.৫ উপসেট (Subset)

মনে করি, $A = \{a, b\}$ একটি সেট। A সেটের উপাদান নিয়ে আমরা $\{a, b\}, \{a\}, \{b\}$ সেটগুলো গঠন করতে পারি। গঠিত $\{a, b\}, \{a\}, \{b\}$ সেটগুলো A সেটের উপসেট।

কোনো সেটের উপাদান থেকে যতগুলো সেট গঠন করা যায় এদের প্রত্যেকটি প্রদত্ত সেটের উপসেট।

ফাঁকা সেট যেকোনো সেটের উপসেট।

যেমন : $P = \{2, 3, 4, 5\}$ এবং $Q = \{3, 5\}$ হলে, Q সেটটি P সেটের উপসেট। অর্থাৎ $Q \subseteq P$ । কারণ Q সেটের ৩ এবং ৫ উপাদানসমূহ P সেটে বিদ্যমান। ‘ $\subseteq$ ’ প্রতীক দ্বারা উপসেটকে সূচিত করা হয়।


উদাহরণ ৪। $A = \{1, 2, 3\}$ এর উপসেটসমূহ লেখো।

সমাধান : A সেটের উপসেটসমূহ নিম্নরূপ :

$\{1, 2, 3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \emptyset$

সার্বিক সেট (Universal Set)

আলোচনায় সংশ্লিষ্ট সকল সেট যদি একটি নির্দিষ্ট সেটের উপসেট হয় তবে ঐ নির্দিষ্ট সেটকে এর উপসেটগুলোর সাপেক্ষে সার্বিক সেট বলে। সার্বিক সেটকে U প্রতীক দ্বারা সূচিত করা হয়। যেমন : কোনো বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর সেট হলো সার্বিক সেট এবং অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সেট উক্ত সার্বিক সেটের উপসেট।



সকল সেট সার্বিক সেটের উপসেট।

উদাহরণ ৫। $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{3, 4, 5, 6\}$ হলে, সার্বিক সেট নির্ণয় করো।


সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{3, 4, 5, 6\}$

এখানে, B সেটের উপাদান 1, 3, 5 এবং C সেটের উপাদান 3, 4, 5, 6 যা A সেটে বিদ্যমান।

$\therefore B$ এবং C সেটের সাপেক্ষে সার্বিক সেট A

পূরক সেট (Complement of a set)

যদি U সার্বিক সেট এবং A সেটটি U এর উপসেট হয় তবে, A সেটের বহির্ভূত সকল উপাদান নিয়ে যে সেট গঠন করা হয়, একে A সেটের পূরক সেট বলে। A এর পূরক সেটকে A^c বা A' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



মনে করি, অষ্টম শ্রেণির 60 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 9 জন অনুপস্থিত। অষ্টম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে সার্বিক সেট বিবেচনা করলে উপস্থিত $(60 - 9)$ বা 51 জনের সেটের পূরক সেট হবে অনুপস্থিত 9 জনের সেট।

উদাহরণ ৬। $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ এবং $A = \{2, 4, 6\}$ হলে A^c নির্ণয় করো।


সমাধান : দেওয়া আছে, $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ এবং $A = \{2, 4, 6\}$

$\therefore A^c = A$ এর পূরক সেট

$= A$ এর বহির্ভূত উপাদানসমূহের সেট

$= \{1, 3, 5\}$

নির্ণেয় সেট $A^c = \{1, 3, 5\}$




কাজ :

$A = \{a, b, c\}$ হলে, A -এর উপসেটসমূহ নির্ণয় কর এবং যেকোনো তিনটি উপসেট লিখে এদের পূরক সেট নির্ণয় করো।

৭.৬ সেট প্রক্রিয়া

সংযোগ সেট (Union of sets)

মনে করি, $P = \{2, 3, 4\}$ এবং $Q = \{4, 5, 6\}$. এখানে P এবং Q সেটের অন্তর্ভুক্ত উপাদানসমূহ ২, ৩, ৪, ৫, ৬. P ও Q সেটের সকল উপাদান নিয়ে গঠিত সেট $\{2, 3, 4, 5, 6\}$ যা P ও Q সেটদ্বয়ের সংযোগ সেট।



দুই বা ততোধিক সেটের সকল উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে সংযোগ সেট বলা হয়।

ধরি, A ও B দুইটি সেট। A ও B -এর সংযোগ সেটকে $A \cup B$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং পড়া হয় A সংযোগ B অথবা ' A union B '.

সেট গঠন পদ্ধতিতে $A \cup B = \{x : x \in A \text{ অথবা } x \in B\}$

উদাহরণ ৭। $C = \{\text{রাজ্জাক, সাকিব, অলোক}\}$ এবং $D = \{\text{অলোক, মুশফিক}\}$ হলে, $C \cup D$ নির্ণয় করো।

সমাধান : দেওয়া আছে, $C = \{\text{রাজ্জাক, সাকিব, অলোক}\}$ এবং $D = \{\text{অলোক, মুশফিক}\}$

$$\begin{aligned} \therefore C \cup D &= \{\text{রাজ্জাক, সাকিব, অলোক}\} \cup \{\text{অলোক, মুশফিক}\} \\ &= \{\text{রাজ্জাক, সাকিব, অলোক, মুশফিক}\} \end{aligned}$$

উদাহরণ ৮। $R = \{x : x, 6\text{-এর গুণনীয়কসমূহ}\}$ এবং $S = \{x : x, 8\text{-এর গুণনীয়কসমূহ}\}$ হলে, $R \cup S$ নির্ণয় করো।


সমাধান : দেওয়া আছে, $R = \{x : x, 6\text{-এর গুণনীয়কসমূহ}\}$

$$= \{1, 2, 3, 6\}$$

এবং $S = \{x : x, 8\text{ এর গুণনীয়কসমূহ}\}$

$$= \{1, 2, 4, 8\}$$

$$\begin{aligned} \therefore R \cup S &= \{1, 2, 3, 6\} \cup \{1, 2, 4, 8\} \\ &= \{1, 2, 3, 4, 6, 8\} \end{aligned}$$



ছেদ সেট (Intersection of sets)

মনে করি, রিনা বাংলা ও আরবি ভাষা পড়তে ও লিখতে পারে এবং জয়া বাংলা ও হিন্দি ভাষা পড়তে ও লিখতে পারে। রিনা যে ভাষা পড়তে ও লিখতে পারে এদের সেট $\{\text{বাংলা, আরবি}\}$ এবং জয়া যে ভাষা পড়তে ও লিখতে পারে এদের সেট $\{\text{বাংলা, হিন্দি}\}$ । লক্ষ করি, রিনা ও জয়া প্রত্যেকে যে ভাষা পড়তে ও লিখতে পারে তা হচ্ছে বাংলা এবং এর সেট $\{\text{বাংলা}\}$ । এখানে $\{\text{বাংলা}\}$ সেটটি ছেদ সেট।


দুই বা ততোধিক সেটের সাধারণ (Common) উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে ছেদ সেট বলা হয়।

ধরি, A ও B দুইটি সেট। A ও B এর ছেদ সেটকে $A \cap B$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং পড়া হয় A ছেদ B । সেট গঠন পদ্ধতিতে $A \cap B = \{x : x \in A \text{ এবং } x \in B\}$

উদাহরণ ৯। $A = \{1, 3, 5\}$ এবং $B = \{5, 7\}$ হলে, $A \cap B$ নির্ণয় করো।

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \{1, 3, 5\}$ এবং $B = \{5, 7\}$

$$\therefore A \cap B = \{1, 3, 5\} \cap \{5, 7\} = \{5\}$$



উদাহরণ ১০। $P = \{x : x, 2 \text{ এর গুণিতক এবং } x \leq 8\}$ এবং $Q = \{x : x, 4 \text{ এর গুণিতক এবং } x \leq 12\}$ হলে, $P \cap Q$ নির্ণয় করো।

সমাধান : দেওয়া আছে, $P = \{x : x, 2 \text{ এর গুণিতক এবং } x \leq 8\}$

$$= \{2, 4, 6, 8\}$$

$$\text{এবং } Q = \{x : x, 4 \text{ এর গুণিতক } x \leq 12\}$$

$$= \{4, 8, 12\}$$


$$\therefore P \cap Q = \{2, 4, 6, 8\} \cap \{4, 8, 12\} = \{4, 8\}$$

কাজ : $U = \{1, 2, 3, 4\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{1, 3\}$

$U \cap A$, $C \cap A$, এবং $B \cup C$ সেটগুলোকে ভেনচিত্রে প্রদর্শন করো।

নিষ্পন্ন সেট (Disjoint sets)

মনে করি, বাংলাদেশের পাশাপাশি দুইটি গ্রাম। একটি গ্রামের কৃষকগণ জমিতে ধান ও পাট চাষ করেন এবং অপর গ্রামের কৃষকগণ জমিতে আলু ও সবজি চাষ করেন। চাষকৃত ফসলের সেট দুইটি বিবেচনা করলে পাই $\{\text{ধান, পাট}\}$ এবং $\{\text{আলু, সবজি}\}$ । উক্ত সেট দুইটিতে ফসলের কোনো মিল নেই। অর্থাৎ, দুই গ্রামের কৃষকগণ একই জাতীয় ফসল চাষ করেন না। এখানে সেট দুইটি পরস্পর নিষ্পন্ন সেট।



যদি দুইটি সেটের উপাদানগুলোর মধ্যে কোনো সাধারণ উপাদান না থাকে, তবে সেট দুইটি পরস্পর নিষ্পন্ন সেট।

ধরি, A ও B দুইটি সেট। A ও B পরস্পর নিষ্পন্ন সেট হবে যদি $A \cap B = \emptyset$ হয়।

দুইটি সেটের ছেদ সেট ফাঁকা সেট হলে সেটদ্বয় পরস্পর নিষ্পন্ন সেট।

উদাহরণ ১১। $A = \{x : x, \text{ বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যা এবং } 1 < x < 7\}$ এবং

$B = \{x : x, 8 \text{ এর গুণনীয়কসমূহ}\}$ হলে, দেখাও যে, A ও B সেটদ্বয় পরস্পর নিষ্পন্ন সেট।

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \{x : x, \text{বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যা এবং } 1 < x < 7\}$

$$= \{3, 5\}$$

এবং $B = \{x : x, 8 \text{ এর গুণনীয়কসমূহ}\}$

$$= \{1, 2, 4, 8\}$$

$$\therefore A \cap B = \{3, 5\} \cap \{1, 2, 4, 8\}$$

$$= \emptyset$$


$\therefore A$ ও B সেটদ্বয় পরস্পর নিষ্পন্ন সেট।

উদাহরণ ১২। $C = \{3, 4, 5\}$ এবং $D = \{4, 5, 6\}$ হলে, $C \cup D$ এবং $C \cap D$ নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, $C = \{3, 4, 5\}$ এবং $D = \{4, 5, 6\}$

$$\therefore C \cup D = \{3, 4, 5\} \cup \{4, 5, 6\} = \{3, 4, 5, 6\}$$

$$\text{এবং } C \cap D = \{3, 4, 5\} \cap \{4, 5, 6\} = \{4, 5\}$$



কাজ

$P = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ এবং $Q = \{4, 6, 8\}$ হলে,

১. $P \cup Q$ এবং $P \cap Q$ নির্ণয় করো।

২. $P \cup Q$ এবং $P \cap Q$ কে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

উদাহরণ ১৩। $E = \{x : x, \text{মৌলিক সংখ্যা এবং } x < 30\}$ সেটটি তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

সমাধান : নির্ণেয় সেটটি হবে 30 অপেক্ষা ছোট মৌলিক সংখ্যাসমূহের সেট।

এখানে, 30 অপেক্ষা ছোট মৌলিক সংখ্যাসমূহ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

নির্ণেয় সেট = $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$

উদাহরণ ১৪। A ও B যথাক্রমে 42 ও 70 এর সকল গুণনীয়কের সেট হলে, $A \cap B$ নির্ণয় করো।

সমাধান :

এখানে, $42 = 1 \times 42 = 2 \times 21 = 3 \times 14 = 6 \times 7$

42 এর গুণনীয়কসমূহ 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42

$$\therefore A = \{1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42\}$$

আবার, $70 = 1 \times 70 = 2 \times 35 = 5 \times 14 = 7 \times 10$

70 এর গুণনীয়কসমূহ 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70

$$\therefore B = \{1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70\}$$

$$\therefore A \cap B = \{1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42\} \cap \{1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70\} = \{1, 2, 7, 14\}$$

ফর্ম-১৬, গণিত-অষ্টম শ্রেণি

অনুশীলনী ৭

১। নিচের কোনটি যে কোনো সেটের উপসেট?

ক) $\{0\}$ খ) $\{\emptyset\}$ গ) $\emptyset$ ঘ) $(\emptyset)$

পাশের ভেনচিত্রটির আলোকে ২ থেকে ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

২। সার্বিক সেট কোনটি ?

(ক) A (খ) B (গ) $A \cup B$ (ঘ) U

৩। কোনটি B^c সেট?

(ক) $\{5, 6, 7, 8\}$ (খ) $\{2, 3, 5, 6\}$ (গ) $\{1, 4, 7, 8\}$ (ঘ) $\{3, 6\}$

৪। কোনটি $A \cap B$ সেট ?

(ক) $\{2, 3\}$ (খ) $\{2, 3, 5, 6\}$ (গ) $\{3, 4, 6, 7\}$ (ঘ) $\{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

৫। কোনটি $A \cup B$ সেট ?

(ক) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (খ) $\{5, 6, 7\}$ (গ) $\{8\}$ (ঘ) $\{3\}$

৬। নিচের সেটগুলোকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো :

(ক) $\{x : x, \text{বিজোড় সংখ্যা এবং } 3 < x < 15\}$

(খ) $\{x : x, 48 \text{ এর মৌলিক গুণনীয়কসমূহ}\}$

(গ) $\{x : x, 3 \text{ এর গুণিতক এবং } x < 36\}$

(ঘ) $\{x : x, \text{পূর্ণসংখ্যা এবং } x^2 < 10\}$

৭। নিচের সেটগুলোকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো :

(ক) $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (খ) $\{4, 8, 12, 16, 20, 24\}$ (গ) $\{7, 11, 13, 17\}$

৮। $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, a\}$ এবং $C = \{a, b\}$ হলে, নিচের সেটগুলো নির্ণয় করো :

(ক) $A \cup B$ (খ) $B \cap C$

(গ) $A \cap (B \cup C)$ (ঘ) $(A \cup B) \cup C$

(ঙ) $(A \cap B) \cup (B \cap C)$

৯। যদি $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{1, 2, 5\}$, $B = \{2, 4, 7\}$ এবং


$C = \{4, 5, 6\}$ হয়, তবে নিম্নলিখিত সম্পর্কগুলোর সত্যতা যাচাই করো :

(ক) $A \cap B = B \cap A$


(খ) $(A \cap B)' = A' \cup B'$

(গ) $(A \cup C)' = A' \cap C'$

১০। P এবং Q যথাক্রমে ২১ ও ৩৫ এর সকল গুণনীয়কের সেট হলে, $P \cup Q$ নির্ণয় করো।



১১।



- ক) A সেটটি সেট গঠন পদ্ধতিতে লেখো।
 খ) A, B ও C কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো এবং $A \cap C$ ও $A \cup B$ নির্ণয় করো।
 গ) প্রমাণ করো যে, $(A \cup B)' = A' \cap B'$
- ১২। যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা 346 ও 556 কে ভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রে 31 অবশিষ্ট থাকে তাদের সেট যথাক্রমে A ও B
 ক) A সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।
 খ) $A \cap B$ নির্ণয় করো।
 গ) $A \cap B$ ভেনচিত্রে দেখাও এবং $A \cap B$ এর উপসেটগুলো লেখো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সেট প্রকাশের পদ্ধতি কয়টি?

- ক) 1টি খ) 2টি গ) 3টি ঘ) 4টি

২। $S = \{x : x \text{ জোড় সংখ্যা এবং } 1 \leq x \leq 7\}$ সেটটি তালিকা পদ্ধতিতে নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) $\{2, 3, 4\}$ খ) $\{2, 4, 6\}$ গ) $\{1, 3, 5\}$ ঘ) $\{3, 5, 7\}$

৩। $A = \{2, 3, 5\}$ হলে—

- i. $A = \{x \in \mathbb{N} : 1 < x < 6 \text{ এবং } x \text{ মৌলিক সংখ্যা}\}$
 ii. $A = \{x \in \mathbb{N} : 2 \leq x < 7 \text{ এবং } x \text{ মৌলিক সংখ্যা}\}$
 iii. $A = \{x \in \mathbb{N} : 2 \leq x \leq 5 \text{ এবং } x \text{ মৌলিক সংখ্যা}\}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$U = \{2, 3, 5, 7\}, A = \{2, 5\}, B = \{3, 5, 7\}$$

৪। A^C কোনটি?

- ক) $\{2, 5\}$ খ) $\{3, 5\}$ গ) $\{3, 7\}$ ঘ) $\{2, 7\}$

৫। $A \cap B^C$ কোনটি?

- ক) $\{2\}$ খ) $\{5\}$ গ) $\{2, 5\}$ ঘ) $\{3, 7\}$

সৃজনশীল প্রশ্ন

৬। কোনো ছাত্রাবাসের 65% ছাত্র মাছ পছন্দ করে, 55% ছাত্র মাংস পছন্দ করে এবং 40% ছাত্র উভয় খাদ্য পছন্দ করে।

(ক) $A = \{x: x, \text{ জোড় স্বাভাবিক সংখ্যা এবং } x^2 \leq 16\}$ এর উপসেটগুলো লেখো।

(খ) উভয় খাদ্য পছন্দ করে না তাদের সংখ্যা নির্ণয় করো।

(গ) যারা শুধু একটি খাদ্য পছন্দ করে তাদের সংখ্যার গুণনীয়ক সেটের ছেদ সেট নির্ণয় করো।

৭। সার্বিক সেট $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ এর তিনটি উপসেট

$$A = \{x: x^2 - 6x + 8 = 0\}$$

$$B = \{x: x, \text{ বিজোড় সংখ্যা এবং } 1 \leq x \leq 5\}$$

$$C = \{x: x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 2 \leq x \leq 6\}$$

ক) $P = \{3, 5, 7, 11\}$ কে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

খ) A সেটের সকল উপসেটগুলো লেখো।

গ) $(B \cup C)^C$ নির্ণয় করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৮। ক) $A = \{x \in \mathbb{N}: x \text{ জোড় সংখ্যা, } 1 \leq x \leq 6\}$ হলে, এর প্রকৃত উপসেটগুলো লেখো।

খ) $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ এবং $B = \{2, 4, 6\}$ হলে, B^C নির্ণয় করো।

গ) $B = \{x \in \mathbb{N}: x, 24 \text{ এর মৌলিক গুণনীয়ক}\}$ কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো।

ঘ) $P = \{x: x, 6 \text{ এর গুণনীয়কসমূহ}\}$ এবং $Q = \{x: x, 8 \text{ এর গুণনীয়কসমূহ}\}$ হলে, $P \cup Q$ নির্ণয় করো।

অষ্টম অধ্যায়

চতুর্ভুজ

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আমরা ত্রিভুজ অঙ্কন করতে গিয়ে দেখেছি যে, একটি সুনির্দিষ্ট ত্রিভুজ আঁকতে তিনটি পরিমাপের প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে একটি চতুর্ভুজ আঁকতে চারটি পরিমাপ যথেষ্ট কি না। বর্তমান অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার চতুর্ভুজ যেমন সামান্তরিক, আয়ত, বর্গ, রম্বসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার চতুর্ভুজের এ সকল বৈশিষ্ট্য ও চতুর্ভুজ অঙ্কন বিষয়ে আলোচনা থাকবে।


অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা —

- চতুর্ভুজের ধর্মাবলি যাচাই ও যুক্তিমূলক প্রমাণ করতে পারবে।
- প্রদত্ত উপাত্ত হতে চতুর্ভুজ আঁকতে পারবে।
- ত্রিভুজ সূত্রের সাহায্যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করতে পারবে।
- আয়তাকার ঘনবস্তুর চিত্র আঁকতে পারবে।
- আয়তাকার ঘনবস্তু ও ঘনকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করতে পারবে।

৮.১ চতুর্ভুজ (Quadrilateral)

চারটি রেখাংশ দ্বারা আবদ্ধ চিত্র একটি চতুর্ভুজ। চিত্র দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রটি একটি চতুর্ভুজক্ষেত্র।

চতুর্ভুজের চারটি বাহু আছে। যে চারটি রেখাংশ দ্বারা ক্ষেত্রটি আবদ্ধ হয়, এ চারটি রেখাংশই চতুর্ভুজের বাহু।



A , B , C ও D বিন্দু চারটির যেকোনো তিনটি সমরেখ নয়। AB , BC , CD ও DA রেখাংশ চারটি সংযোগে $ABCD$ চতুর্ভুজ গঠিত হয়েছে। AB , BC , CD ও DA চতুর্ভুজটির চারটি বাহু। A , B , C ও D চারটি কোণিক বিন্দু বা শীর্ষবিন্দু। $\angle ABC$, $\angle BCD$, $\angle CDA$ ও $\angle DAB$ চতুর্ভুজের চারটি কোণ। A ও B শীর্ষবিন্দু যথাক্রমে C ও D শীর্ষের বিপরীত শীর্ষবিন্দু। AB ও CD পরস্পর বিপরীত বাহু এবং AD ও BC পরস্পর বিপরীত বাহু। এক শীর্ষবিন্দুতে যে দুইটি বাহু মিলিত হয়, এরা সন্নিহিত বাহু। যেমন, AB ও BC বাহু দুইটি সন্নিহিত বাহু। AC ও BD রেখাংশদ্বয় $ABCD$ চতুর্ভুজের দুইটি কর্ণ। চতুর্ভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্যের সমষ্টিতে এর পরিসীমা বলে। $ABCD$ চতুর্ভুজের পরিসীমা $(AB + BC + CD + DA)$ এর দৈর্ঘ্যের সমান। চতুর্ভুজকে অনেক সময় ‘□’ প্রতীক দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

৮.২ চতুর্ভুজের প্রকারভেদ (Types of Quadrilaterals)

সামান্তরিক : যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান্তরাল, তা সামান্তরিক। সামান্তরিকের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে সামান্তরিক ক্ষেত্র বলে।

আয়ত : যে সামান্তরিকের একটি কোণ সমকোণ, তাই আয়ত। আয়তের চারটি কোণ সমকোণ। আয়তের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে আয়তক্ষেত্র বলে।




সামান্তরিক



আয়ত

রম্বস : রম্বস এমন একটি সামান্তরিক যার সন্নিহিত বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য সমান। অর্থাৎ, রম্বসের বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল এবং চারটি বাহু সমান। রম্বসের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে রম্বসক্ষেত্র বলে।

বর্গ : বর্গ এমন একটি আয়ত যার সন্নিহিত বাহুগুলো সমান। অর্থাৎ, বর্গ এমন একটি সামান্তরিক যার প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ এবং বাহুগুলো সমান। বর্গের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে বর্গক্ষেত্র বলে।




রম্বস



বর্গ


ট্রাপিজিয়াম : যে চতুর্ভুজের এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল, একে ট্রাপিজিয়াম বলা হয়।

ট্রাপিজিয়ামের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্র বলে।



ট্রাপিজিয়াম

ঘুড়ি : যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান, একে ঘুড়ি বলা হয়।



ঘুড়ি

কাজ :

- ১। তোমার আশেপাশের বিভিন্ন বস্তুর ধারকে সরলরেখা ধরে সামান্তরিক, আয়ত, বর্গ ও রম্বস চিহ্নিত করো।
- ২। উক্তিগুলো সঠিক কিনা যাচাই করো :
 - (ক) বর্গ একটি আয়ত, আবার বর্গ একটি রম্বসও।
 - (খ) ট্রাপিজিয়াম একটি সামান্তরিক।
 - (গ) সামান্তরিক একটি ট্রাপিজিয়াম।
 - (ঘ) আয়ত বা রম্বস বর্গ নয়।
- ৩। বর্গের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে বর্গ এমন একটি আয়ত যার বাহুগুলো সমান। রম্বসের মাধ্যমে বর্গের সংজ্ঞা দেওয়া যায় কি ?

৮.৩ চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্য (Theorems related to Quadrilaterals)


বিভিন্ন প্রকারের চতুর্ভুজের কিছু সাধারণ ধর্ম রয়েছে। এ ধর্মগুলো উপপাদ্য আকারে প্রমাণ করা হলো।

উপপাদ্য ১

চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি চার সমকোণ।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, $ABCD$ একটি চতুর্ভুজ।

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 4$ সমকোণ।



অঙ্কন: A ও C যোগ করি। AC কর্ণটি চতুর্ভুজটিকে $\triangle ABC$ ও $\triangle ADC$ দুইটি ত্রিভুজে বিভক্ত করেছে।

প্রমাণ:

ধাপ	যথার্থতা
(১) $\triangle ABC$ এ $\angle BAC + \angle ACB + \angle B = 2$ সমকোণ।	[ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ২ সমকোণ]
(২) অনুরূপভাবে, $\triangle DAC$ এ $\angle DAC + \angle ACD + \angle D = 2$ সমকোণ।	[ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ২ সমকোণ]
(৩) অতএব, $\angle DAC + \angle ACD + \angle D + \angle BAC + \angle ACB + \angle B = (2+2)$ সমকোণ।	[(১) ও (২) থেকে]
(৪) $\angle DAC + \angle BAC = \angle A$ এবং $\angle ACD + \angle ACB = \angle C$	[সন্নিহিত কোণের যোগফল] [সন্নিহিত কোণের যোগফল]
সুতরাং $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 4$ সমকোণ (প্রমাণিত)	[(৩) থেকে]

উপপাদ্য ২


সামান্তরিকের বিপরীত বাহু ও কোণগুলো পরস্পর সমান।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, $ABCD$ একটি সামান্তরিক এবং

AC ও BD তার দুইটি কর্ণ। প্রমাণ করতে হবে যে,

(ক) AB বাহু $= CD$ বাহু, AD বাহু $= BC$ বাহু

(খ) $\angle BAD = \angle BCD$, $\angle ABC = \angle ADC$




প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
(১) $AB \parallel DC$ এবং AC তাদের ছেদক, সুতরাং $\angle BAC = \angle ACD$	[একান্তর কোণ সমান]
(২) আবার, $BC \parallel AD$ এবং AC তাদের ছেদক, সুতরাং $\angle ACB = \angle DAC$	[একান্তর কোণ সমান]
(৩) এখন $\triangle ABC$ ও $\triangle ADC$ এ $\angle BAC = \angle ACD$, $\angle ACB = \angle DAC$ এবং AC বাহু সাধারণ। $\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADC$ অতএব, $AB = CD, BC = AD$ ও $\angle ABC = \angle ADC$ অনুরূপভাবে, প্রমাণ করা যায় যে, $\triangle BAD \cong \triangle BCD$ সুতরাং $\angle BAD = \angle BCD$ [প্রমাণিত]	[ত্রিভুজের কোণ-বাহু-কোণ উপপাদ্য]

কাজ:

১। প্রমাণ কর যে, চতুর্ভুজের এক জোড়া বিপরীত বাহু পরস্পর সমান ও সমান্তরাল হলে, তা একটি সামান্তরিক।


২। দেওয়া আছে, $ABCD$ চতুর্ভুজে $AB = CD$ এবং $\angle ABD = \angle BDC$ ।প্রমাণ করো যে, $ABCD$ একটি সামান্তরিক।

উপপাদ্য ৩

সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, $ABCD$ সামান্তরিকের
 AC ও BD কর্ণদ্বয় পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করে।প্রমাণ করতে হবে যে, $AO = CO, BO = DO$

প্রমাণ :



ধাপ	যথার্থতা
(১) AB ও DC রেখাদ্বয় সমান্তরাল এবং AC এদের ছেদক। অতএব, $\angle BAC =$ একান্তর $\angle ACD$	[একান্তর কোণ সমান]
(২) AB ও DC রেখাদ্বয় সমান্তরাল এবং BD এদের ছেদক। সুতরাং $\angle BDC =$ একান্তর $\angle ABD$	[একান্তর কোণ সমান]
(৩) এখন, $\triangle AOB$ ও $\triangle COD$ এ $\angle OAB = \angle OCD, \angle OBA = \angle ODC$ এবং $AB = DC$ সুতরাং $\triangle AOB \cong \triangle COD$ অতএব, $AO = CO$ এবং $BO = DO$ (প্রমাণিত)	$\therefore \angle BAC = \angle ACD; \angle BDC = \angle ABD$ [ত্রিভুজের কোণ-বাহু-কোণ উপপাদ্য]


কাজ : ১। প্রমাণ করো যে, চতুর্ভুজের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে তা একটি সামান্তরিক।

উপপাদ্য ৪

আয়তের কর্ণদ্বয় সমান ও পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, $ABCD$ আয়তের AC ও BD কর্ণদ্বয় পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ করতে হবে যে,

- (i) $AC = BD$
(ii) $AO = CO, BO = DO$



প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
(১) আয়ত একটি সামান্তরিক। সুতরাং, $AO = CO, BO = DO$	[সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে]
(২) এখন $\triangle ABD$ ও $\triangle ACD$ এ $AB = DC$ এবং $AD = AD$ অন্তর্ভুক্ত $\angle DAB =$ অন্তর্ভুক্ত $\angle ADC$ সুতরাং, $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ অতএব, $AC = BD$ (প্রমাণিত)	[সামান্তরিকের বিপরীত বাহু পরস্পর সমান] [সাধারণ বাহু] [প্রত্যেকে সমকোণ] [ত্রিভুজের বাহু-কোণ-বাহু - উপপাদ্য]

কাজ:

১। প্রমাণ করো যে, আয়তের প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ।

উপপাদ্য ৫


রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, $ABCD$ রম্বসের

AC ও BD কর্ণদ্বয় পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করে।

প্রমাণ করতে হবে যে,

- (i) $\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = \angle DOA = 1$ সমকোণ
(ii) $AO = CO, BO = DO$



প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
(১) রম্বস একটি সামান্তরিক। সুতরাং, $AO = CO, BO = DO$	[সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে]
(২) এখন $\triangle AOB$ ও $\triangle BOC$ এ $AB = BC$ $AO = CO$ এবং $OB = OB$ অতএব, $\triangle AOB \cong \triangle BOC$	[রম্বসের বাহুগুলো সমান] [(১) থেকে] [সাধারণ বাহু] [ত্রিভুজের বাহু-বাহু-বাহু উপপাদ্য]

সুতরাং $\angle AOB = \angle BOC$.

$\angle AOB + \angle BOC = 1$ সরলকোণ $= 2$ সমকোণ।

$\angle AOB = \angle BOC = 1$ সমকোণ।

অনুরূপভাবে, প্রমাণ করা যায় যে,

$\angle COD = \angle DOA = 1$ সমকোণ (প্রমাণিত)

কাজ:

- ১। দেখাও যে, বর্গের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান এবং পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।
- ২। একজন রাজমিস্ত্রি একটি আয়তাকার কংক্রিট স্ল্যাব তৈরি করেছেন। তিনি কত ভিন্নভাবে নিশ্চিত হতে পারেন যে তাঁর তৈরি স্ল্যাবটি সত্যিই আয়তাকার?

৮.৪ চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল (Area of Quadrilaterals)

একটি চতুর্ভুজের একটি কর্ণ দ্বারা চতুর্ভুজ ক্ষেত্রটি দুইটি ত্রিভুজক্ষেত্রে বিভক্ত হয়। অতএব, চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের যোগফলের সমান। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা বর্গক্ষেত্র ও আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে শিখেছি। আবার আয়ত ও সামান্তরিকের ভূমি ও উচ্চতা একই হলেও উল্লিখিত ক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফল সমান। নিচে রম্বস ও ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হবে।

(ক) ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল:


$ABCD$ একটি ট্রাপিজিয়াম যেখানে $AB \parallel CD$, $AB = a$, $CD = b$ এবং AB ও CD এর লম্ব দূরত্ব $= h$
 C বিন্দু দিয়ে $DA \parallel CE$ আঁকি।

$\therefore AECD$ একটি সামান্তরিক। চিত্র থেকে

$ABCD$ ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= AECD$ সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $+ CEB$ ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$$= b \times h + \frac{1}{2}(a-b) \times h$$

$$= \frac{1}{2}(a+b) \times h$$



ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $=$ সামান্তরাল বাহুদ্বয়ের গড় $\times$ উচ্চতা

কাজ :

- ১। বিকল্প পদ্ধতিতে ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

(খ) রম্বস ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে। তাই রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য জানা থাকলে সহজেই রম্বস ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায়।


মনে করি, $ABCD$ রম্বসের AC ও BD কর্ণদ্বয় পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করে। কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্যকে যথাক্রমে a ও b দ্বারা নির্দেশ করি।

রম্বস ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = DAC ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল + BAC ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \cdot a \times \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}a \times \frac{1}{2}b$$

$$= \frac{1}{2}a \times b$$


রম্বস ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = কর্ণদ্বয়ের গুণফলের অর্ধেক



৮.৫ ঘনবস্তু (Solid)


বই, বাক্স, ইট, ফুটবল ইত্যাদি ঘনবস্তু। ঘনবস্তু আয়তাকার, বর্গাকার, গোলাকার ও অন্যান্য আকারের হতে পারে। ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে।

চিত্র-১ এর বস্তুটি আয়তাকার ঘনবস্তু। এর মোট ছয়টি আয়তাকার পৃষ্ঠ বা তল আছে যাদের প্রত্যেকটি একটি আয়তক্ষেত্র। পরস্পর বিপরীত পাশের পৃষ্ঠদ্বয় সমান ও সমান্তরাল। কাজেই পরস্পর বিপরীত পাশের দুইটি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সমান।



চিত্র-১


চিত্র-২ এর বস্তুটি বর্গাকার ঘনবস্তু। এর মোট ছয়টি পরস্পর সমান বর্গাকার পৃষ্ঠ বা তল আছে যাদের প্রত্যেকটি একটি বর্গক্ষেত্র। এক্ষেত্রেও পরস্পর বিপরীত পৃষ্ঠদ্বয় সমান্তরাল। বর্গাকার ঘনবস্তুকে ঘনক (cube) বলা হয়। পরস্পর দুইটি করে পৃষ্ঠের ছেদ-রেখাংশকে ঘনকের ধার বা বাহু বলা হয়। ঘনকের সকল ধার বা বাহু পরস্পর সমান। কাজেই ঘনকের সকল পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পরস্পর সমান।



চিত্র-২

ঘনবস্তুর পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় :

(ক) আয়তাকার ঘনবস্তু : একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য a একক, প্রস্থ b একক এবং উচ্চতা c একক হলে, চিত্রানুসারে, ঘনবস্তুটির সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = $\{(ab + ab) + (bc + bc) + (ac + ac)\}$ বর্গএকক = $2(ab + bc + ac)$ বর্গএকক



(খ) ঘনক : একটি ঘনকের ধার a একক হলে, এর ছয়টি পৃষ্ঠের প্রতিটির ক্ষেত্রফল = $a \times a$ বর্গ একক = a^2 বর্গ একক। অতএব, ঘনকটির সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = $6a^2$ বর্গ একক।

উদাহরণ। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য ৭.৫ সে.মি., প্রস্থ ৬ সে.মি ও উচ্চতা ৪ সে.মি। ঘনবস্তুটির সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

সমাধান: আমরা জানি, কোনো আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য a একক, প্রস্থ b একক ও উচ্চতা c একক হলে, বস্তুটির সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = $2(ab + bc + ac)$ বর্গ একক।

এখানে, $a = 7.5$ সে.মি., $b = 6$ সে.মি. এবং $c = 4$ সে.মি.

$\therefore$ প্রদত্ত আয়তাকার ঘনবস্তুটির সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল

$$= 2(7.5 \times 6 + 6 \times 4 + 7.5 \times 4) \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 2(45 + 24 + 30) \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 2 \times 99 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 198 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

অনুশীলনী ৮.১

১। সামান্তরিকের জন্য নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. বিপরীত বাহুগুলো অসমান্তরাল

খ. একটি কোণ সমকোণ হলে, তা আয়ত

গ. বিপরীত বাহুদ্বয় অসমান

ঘ. কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান

২। নিচের কোনটি রম্বসের বৈশিষ্ট্য ?

ক. কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান

খ. কোণগুলো সমকোণ

গ. বিপরীত কোণদ্বয় অসমান

ঘ. বাহুগুলো পরস্পর সমান

৩। i. চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি চার সমকোণ।

ii. আয়তের দুইটি সন্নিহিত বাহু সমান হলে তা একটি বর্গ।

iii. রম্বস একটি সামান্তরিক।

উপরের তথ্য অনুসারে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪। $PAQC$ চতুর্ভুজের $PA = CQ$ এবং $PA \parallel CQ$

$\angle A$ ও $\angle C$ এর সমদ্বিখণ্ডক যথাক্রমে AB ও CD হলে


$ABCD$ ক্ষেত্রটির নাম কী ?

ক. সামান্তরিক

খ. রম্বস

গ. আয়ত


ঘ. বর্গ



৫। চিত্রে, $\triangle ABC$ এর মধ্যমা BO কে D পর্যন্ত

এমনভাবে বর্ধিত করি যেন, $BO = OD$ হয়।

প্রমাণ করো যে, $ABCD$ একটি সামান্তরিক।



৬। প্রমাণ করো যে, সামান্তরিকের একটি কর্ণ ঐকে দুইটি সর্বসম ত্রিভুজে বিভক্ত করে।

৭। প্রমাণ করো যে, চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল হলে, তা একটি সামান্তরিক।

৮। প্রমাণ করো যে, সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান হলে, তা একটি আয়ত।

৯। প্রমাণ করো যে, চতুর্ভুজের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান হলে এবং পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করলে, তা একটি বর্গ।

১০। প্রমাণ করো যে, আয়তের সন্নিহিত বাহুর মধ্যবিন্দুসমূহের সংযোগে যে চতুর্ভুজ হয়, তা একটি রম্বস।

১১। প্রমাণ করো যে, সামান্তরিকের যেকোনো দুইটি বিপরীত কোণের সমদ্বিখণ্ডক পরস্পর সমান্তরাল।

১২। প্রমাণ করো যে, সামান্তরিকের যেকোনো দুইটি সন্নিহিত কোণের সমদ্বিখণ্ডক পরস্পর লম্ব।


১৩। চিত্রে, ABC একটি সমবাহু ত্রিভুজ। D , E ও F

যথাক্রমে AB , BC ও AC এর মধ্যবিন্দু।


ক. প্রমাণ করো যে,

$$\angle BDF + \angle DFE + \angle FEB + \angle EBD = \text{চার সমকোণ}।$$


খ. প্রমাণ করো যে, $DF \parallel BC$ এবং $DF = \frac{1}{2}BC$



১৪। চিত্রে, $ABCD$ সামান্তরিকের AM ও CN , DB এর উপর লম্ব। প্রমাণ করো যে, $ANCM$ একটি সামান্তরিক।



১৫। চিত্রে, $AB = CD$ এবং $AB \parallel CD$
ক. AB ভূমিবিশিষ্ট দুইটি ত্রিভুজের নাম লেখো।
খ. প্রমাণ করো যে, AD ও BC পরস্পর সমান ও সমান্তরাল।
গ. দেখাও যে, $OA = OC$ এবং $OB = OD$



১৬। $ABCD$ একটি সামান্তরিক। AC ও BD কর্ণদ্বয় পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করে।

ক) $\angle BAD = 70^\circ$ হলে $\angle ABC$ এর মান নির্ণয় করো।

খ) $AC = BD$ হলে প্রমাণ করো যে, $ABCD$ একটি আয়ত।

গ) $AB = AD$ হলে প্রমাণ করো যে, AC ও BD পরস্পরকে O বিন্দুতে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

১৭। $ABCD$ চতুর্ভুজে AC ও BD কর্ণদ্বয় অসমান এবং যেকোনো দুটি সন্নিহিত কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ।

ক) চিত্রসহ ঘুড়ির সংজ্ঞা দাও।

খ) প্রমাণ করো যে, $AB = CD$ এবং $AD = BC$ ।

গ) B ও D বিন্দু থেকে AC -এর উপর BP এবং DQ লম্ব আঁকা হলে প্রমাণ কর যে, $BPDQ$ একটি সামান্তরিক।

১৮। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ১০ সে.মি., ৮ সে.মি. এবং ৫ সে.মি.। ঘনবস্তুটির সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

১৯। একটি ঘনকাকৃতি বাস্তুর ধার ৬.৫ সে.মি. হলে, বাস্তুর সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

সম্পাদ্য (Construction)

৮.৬ চতুর্ভুজ অঙ্কন (Construction of Quadrilaterals)

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা জেনেছি, ত্রিভুজের তিনটি বাহু দেওয়া থাকলে নির্দিষ্ট ত্রিভুজ আঁকা যায়। কিন্তু চতুর্ভুজের চারটি বাহু দেওয়া থাকলে নির্দিষ্ট কোনো চতুর্ভুজ আঁকা যায় না। চতুর্ভুজ অঙ্কনের জন্য আরও উপাত্তের প্রয়োজন। চতুর্ভুজের চারটি বাহু, চারটি কোণ ও দুইটি কর্ণ, এই মোট দশটি উপাত্ত আছে। একটি চতুর্ভুজ আঁকতে পাঁচটি অনন্য নিরপেক্ষ উপাত্তের প্রয়োজন। যেমন, কোনো চতুর্ভুজের চারটি বাহু ও একটি নির্দিষ্ট কোণ দেওয়া থাকলে, চতুর্ভুজটি আঁকা যাবে।

নিম্নোক্ত পাঁচটি উপাত্ত জানা থাকলে, নির্দিষ্ট চতুর্ভুজটি আঁকা যায়।

(ক) চারটি বাহু ও একটি কোণ

(খ) চারটি বাহু ও একটি কর্ণ

(গ) তিনটি বাহু ও দুইটি কর্ণ

(ঘ) তিনটি বাহু ও এদের অন্তর্ভুক্ত দুইটি কোণ

(ঙ) দুইটি সন্নিহিত বাহু ও তিনটি কোণ।


অনেক সময় কম উপাত্ত দেওয়া থাকলেও বিশেষ চতুর্ভুজ আঁকা যায়। এক্ষেত্রে যুক্তি দ্বারা পাঁচটি উপাত্ত পাওয়া যায়।

- একটি বাহু দেওয়া থাকলে, বর্গ আঁকা যায়। এখানে চারটি বাহুই সমান এবং একটি কোণ সমকোণ।
- দুইটি সন্নিহিত বাহু দেওয়া থাকলে, আয়ত আঁকা যায়। এখানে বিপরীত বাহু দুইটি পরস্পর সমান এবং একটি কোণ সমকোণ।
- একটি বাহু এবং একটি কোণ দেওয়া থাকলে, রম্বস আঁকা যায়। এখানে চারটি বাহুই সমান।
- দুইটি সন্নিহিত বাহু এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ দেওয়া থাকলে, সামান্তরিক আঁকা যায়। এখানে বিপরীত বাহু দুইটি পরস্পর সমান ও সমান্তরাল।

সম্পাদ্য ১

কোনো চতুর্ভুজের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য ও একটি কোণ দেওয়া আছে। চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে।

মনে করি, একটি চতুর্ভুজের চার বাহুর দৈর্ঘ্য a, b, c, d এবং a ও b বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle x$ দেওয়া আছে। চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে।




অঙ্কনের বিবরণ :

(১) যেকোনো রশ্মি BE থেকে $BC = a$ নিই। B বিন্দুতে $\angle EBF = \angle x$ আঁকি।

(২) BF থেকে $BA = b$ নিই। A ও C কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে c ও d এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে $\angle ABC$ এর অভ্যন্তরে দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি। এরা পরস্পর D বিন্দুতে ছেদ করে।

(৩) A ও D এবং C ও D যোগ করি।

তাহলে, $ABCD$ ই উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ।



প্রমাণ : অঙ্কন অনুসারে,

$$AB = b, BC = a, AD = c, DC = d \text{ এবং } \angle ABC = \angle x$$

$\therefore ABCD$ ই নির্ণেয় চতুর্ভুজ।


কাজ :

- ১। একটি চতুর্ভুজ আঁকতে চারটি বাহু ও একটি কোণের পরিমাপের প্রয়োজন। এই পাঁচটি যেকোনো পরিমাপের হলে কি চতুর্ভুজটি আঁকা যাবে?

সম্পাদ্য ২

কোনো চতুর্ভুজের চারটি বাহু ও একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে।

মনে করি, একটি চতুর্ভুজের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য a, b, c, d এবং একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য e দেওয়া আছে, যেখানে $a + b > e$ এবং $c + d > e$ চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে।



অঙ্কনের বিবরণ :



(১) যেকোনো রশ্মি BE থেকে $BD = e$ নিই। B ও D কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে a ও b এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে BD এর একই পাশে দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি। বৃত্তচাপদ্বয় A বিন্দুতে ছেদ করে।

(২) আবার, B ও D কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে d ও c -এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে BD এর যেদিকে A আছে তার বিপরীত দিকে আরও দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি। এই বৃত্তচাপদ্বয় পরস্পর C বিন্দুতে ছেদ করে।

(৩) A ও B , A ও D , B ও C এবং C ও D যোগ করি। তাহলে, $ABCD$ ই উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ।

প্রমাণ : অঙ্কন অনুসারে, $AB = a$, $AD = b$, $BC = d$, $CD = c$ এবং কর্ণ $BD = e$

সুতরাং, $ABCD$ ই নির্ণেয় চতুর্ভুজ।



কাজ :

- একটি চতুর্ভুজ আঁকতে চারটি বাহু ও একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য পরিমাপের প্রয়োজন। এই পাঁচটি যেকোনো পরিমাপের হলে কি চতুর্ভুজটি আঁকা যাবে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।
- একজন শিক্ষার্থী একটি চতুর্ভুজ $PLAY$ আঁকতে চেষ্টা করল, যার $PL = 3$ সে.মি., $LA = 4$ সে.মি., $AY = 4.5$ সে.মি., $PY = 2$ সে.মি., $LY = 6$ সে.মি.। সে চতুর্ভুজটি আঁকতে পারল না। কেন?

সম্পাদ্য ৩

কোনো চতুর্ভুজের তিনটি বাহু ও দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে।



মনে করি, একটি চতুর্ভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য a, b, c এবং দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য d, e দেওয়া আছে, যেখানে $a + b > e$ । চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে।

a _____
b _____
c _____
d _____
e _____

অঙ্কনের বিবরণ :

(১) যেকোনো রশ্মি BE থেকে $BD = e$ নিই। B ও D কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে a ও b -এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে BD -এর একই পাশে দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি। বৃত্তচাপদ্বয় A বিন্দুতে ছেদ করে।

(২) আবার, D ও A কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে c ও d এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে BD -এর যেদিকে A রয়েছে এর বিপরীত দিকে আরও দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি। এই বৃত্তচাপদ্বয় পরস্পরকে C বিন্দুতে ছেদ করে।




(৩) A ও B , A ও D , B ও C এবং C ও D যোগ করি।

তাহলে, $ABCD$ ই উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ।

প্রমাণ : অঙ্কন অনুসারে, $AB = a$, $AD = b$, $CD = c$

এবং কর্ণ $BD = e$ ও $AC = d$

সুতরাং, $ABCD$ ই নির্ণেয় চতুর্ভুজ।




সম্পাদ্য ৪

কোনো চতুর্ভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য ও দুইটি অন্তর্ভুক্ত কোণ দেওয়া আছে। চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে।

মনে করি, একটি চতুর্ভুজের তিনটি বাহু a, b, c এবং a ও b

বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle x$ এবং a ও c বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোণ

$\angle y$ দেওয়া আছে। চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে।



অঙ্কনের বিবরণ : যেকোনো রশ্মি BE থেকে $BC = a$ নিই।

B ও C বিন্দুতে $\angle x$ ও $\angle y$ এর সমান করে যথাক্রমে

$\angle CBF$ ও $\angle BCG$ অঙ্কন করি। BF থেকে $BA = b$ এবং



CG থেকে $CD = c$ নিই। A, D যোগ করি।

তাহলে, $ABCD$ ই উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ।

প্রমাণ : অঙ্কন অনুসারে, $AB = b$, $BC = a$, $CD = c$,

$\angle ABC = \angle x$ ও $\angle BCD = \angle y$

সুতরাং $ABCD$ ই নির্ণেয় চতুর্ভুজ।



সম্পাদ্য ৫

কোনো চতুর্ভুজের দুইটি সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য ও তিনটি কোণ দেওয়া আছে। চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে।

মনে করি, একটি চতুর্ভুজের দুইটি সন্নিহিত বাহু a, b এবং

তিনটি কোণ $\angle x, \angle y, \angle z$ দেওয়া আছে। চতুর্ভুজটি

আঁকতে হবে।

অঙ্কনের বিবরণ : যেকোনো রশ্মি BE থেকে $BC = a$ নিই।



B ও C বিন্দুতে $\angle x$ ও $\angle y$ এর সমান করে যথাক্রমে

$\angle CBF$ ও $\angle BCG$ অঙ্কন করি। BF থেকে $BA = b$ নিই।


A বিন্দুতে $\angle z$ এর সমান করে $\angle BAH$ অঙ্কন করি। AH ও

CG পরস্পরকে D বিন্দুতে ছেদ করে।

তাহলে, $ABCD$ ই উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ।



প্রমাণ : অঙ্কন অনুসারে, $AB = b$, $BC = a$,
 $\angle ABC = \angle x$ $\angle DCB = \angle y$ ও $\angle BAD = \angle z$
 সুতরাং $ABCD$ ই নির্ণেয় চতুর্ভুজ।



কাজ :

- ১। একটি চতুর্ভুজের সন্নিহিত নয় এরূপ দুই বাহুর দৈর্ঘ্য ও তিনটি কোণ দেওয়া আছে। চতুর্ভুজটি কি আঁকা যাবে ?
- ২। একজন শিক্ষার্থী একটি চতুর্ভুজ $STOP$ আঁকতে চাইল যার $ST = 5$ সে.মি., $TO = 4$ সে.মি., $\angle S = 20^\circ$, $\angle T = 30^\circ$, $\angle O = 40^\circ$ । সে চতুর্ভুজটি কেন আঁকতে পারল না?


সম্পাদ্য ৬

কোনো সামান্তরিকের সন্নিহিত দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য এবং বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ দেওয়া আছে।

সামান্তরিকটি আঁকতে হবে।

মনে করি, একটি সামান্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহু a ও b এবং


এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle x$ দেওয়া আছে। সামান্তরিকটি আঁকতে হবে।



অঙ্কনের বিবরণ : যেকোনো রশ্মি BE থেকে $BC = a$ নিই।

B বিন্দুতে $\angle EBF = \angle x$ অঙ্কন করি। BF থেকে b এর সমান BA নিই। A ও C বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে a ও b এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে $\angle ABC$ এর অভ্যন্তরে দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি। এরা পরস্পরকে D বিন্দুতে ছেদ করে।

A, D ও C, D যোগ করি। তাহলে, $ABCD$ ই উদ্দিষ্ট সামান্তরিক।



প্রমাণ : A, C যোগ করি। $\triangle ABC$ ও $\triangle ADC$ এ

$AB = CD = b$,

$AD = BC = a$ এবং AC বাহু সাধারণ।

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADC$

অতএব, $\angle BAC = \angle DCA$ । কিন্তু কোণ দুইটি একান্তর কোণ।



$\therefore AB \parallel CD$

অনুরূপভাবে, প্রমাণ করা যায় যে, $BC \parallel AD$

সুতরাং $ABCD$ একটি সামান্তরিক।

আবার অঙ্কন অনুসারে $\angle ABC = \angle x$

অতএব, $ABCD$ ই নির্ণেয় সামান্তরিক।



লক্ষ করি : শুধু একটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলেই বর্গ আঁকা সম্ভব। বর্গের বাহুগুলো সমান আর কোণগুলো প্রত্যেকটি সমকোণ। তাই বর্গ অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় পাঁচটি শর্ত সহজেই পূরণ করা যায়।

সম্পাদ্য ৭

কোনো বর্গের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে, বর্গটি আঁকতে হবে।

মনে করি, a কোনো বর্গের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য। বর্গটি আঁকতে হবে।

অঙ্কনের বিবরণ : যেকোনো রশ্মি BE থেকে $BC = a$ নিই।

B বিন্দুতে $BF \perp BC$ আঁকি।

BF থেকে $BA = a$ নিই। A ও C কে কেন্দ্র করে a এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে $\angle ABC$ -এর অভ্যন্তরে দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি। বৃত্তচাপদ্বয় পরস্পরকে D বিন্দুতে ছেদ করে। A ও D এবং C ও D যোগ করি।


তাহলে, $ABCD$ -ই উদ্দিষ্ট বর্গ।

প্রমাণ : $ABCD$ চতুর্ভুজের $AB = BC = CD = DA = a$

এবং $\angle ABC =$ এক সমকোণ।

সুতরাং এটি একটি বর্গ।

অতএব, $ABCD$ ই নির্ণেয় বর্গ।



অনুশীলনী ৮.২

১। নিচের কোন ক্ষেত্রে কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে?

- ক) বর্গ ও আয়ত খ) রম্বস ও সামান্তরিক গ) আয়ত ও ঘূড়ি ঘ) রম্বস ও ঘূড়ি

২। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ৬ সে.মি. এবং ৮ সে.মি. হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

- ক) ৪.৯ সে.মি. (প্রায়) খ) ৫ সে.মি. গ) ৬.৯ সে.মি. (প্রায়) ঘ) ৭ সে.মি.

৩। একটি ঘূড়ির পরিসীমা ২৪ সে.মি. এবং অসমান বাহুদ্বয়ের অনুপাত ২:১ হলে এর ক্ষুদ্রতর বাহুর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.?

- ক) ৪ খ) ৬ গ) ৪ ঘ) ৩

৪। একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দূরত্ব ৩ সে.মি. এবং ক্ষেত্রফল ৪৮ বর্গ সে.মি.। এর সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের গড় কত সে.মি.?

- ক) ৪ খ) ১৬ গ) ২৪ ঘ) ৩২

৫। সকল সামান্তরিকের—

- i. বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল
ii. বিপরীত কোণদ্বয়ের সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল

iii. ক্ষেত্রফল = সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের গুণফল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

৬। নিম্নে প্রদত্ত উপাত্ত নিয়ে চতুর্ভুজ অঙ্কন কর :

ক. চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য 3 সে.মি., 3.5 সে.মি., 2.8 সে.মি. ও 3 সে.মি. এবং একটি কোণ 45° ।

খ. চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সে.মি., 3 সে.মি., 3.5 সে.মি., 4.5 সে.মি. এবং একটি কোণ 60° ।

গ. চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য 3.2 সে.মি., 3.5 সে.মি., 2.5 সে.মি. ও 2.8 সে.মি. এবং একটি কর্ণ 5 সে.মি.।

ঘ. চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য 3.2 সে.মি., 3 সে.মি., 3.5 সে.মি. ও 2.8 সে.মি. এবং একটি কর্ণ 5 সে.মি.।

ঙ. তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য 3 সে.মি., 3.5 সে.মি., 2.5 সে.মি. এবং কোণ এদের অন্তর্ভুক্ত 60° ও 45° ।

চ. তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য 3 সে.মি., 4 সে.মি., 4.5 সে.মি. এবং দুইটি কর্ণ 5.2 সে.মি. ও 6 সে.মি.।

৭। একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সে.মি.; বর্গটি আঁকো।

৮। রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 3.5 সে.মি. ও একটি কোণ 75° ; রম্বসটি আঁকো।

৯। আয়তের দুইটি সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 3 সে.মি. ও 4 সে.মি.; আয়তটি আঁকো।

১০। $ABCD$ চতুর্ভুজের কর্ণ দুইটি AC ও BD , O বিন্দুতে এমনভাবে ছেদ করে যেন $OA = 4.2$ সে.মি. $OB = 5.8$ সে.মি., $OC = 3.7$ সে.মি., $OD = 4.5$ সে.মি. ও $\angle AOB = 100^\circ$ হয়। চতুর্ভুজটি আঁকো।

১১। দুইটি সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। আয়তটি আঁকো।

১২। কর্ণ এবং একটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। আয়তটি আঁকতে হবে।

১৩। একটি বাহু এবং দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। সামান্তরিকটি আঁকতে হবে।

১৪। একটি বাহু এবং একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। রম্বসটি আঁকো।

১৫। দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। রম্বসটি আঁকো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। একটি চতুর্ভুজ আঁকতে কয়টি অনন্য নিরপেক্ষ উপাত্তের প্রয়োজন?

ক. 3 টি

খ. 4 টি

গ. 5 টি

ঘ. 6 টি

২। একটি আয়তের সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 4 সে.মি. এবং 3 সে.মি. হলে এর

i. অর্ধ পরিসীমা 7 সে.মি.

ii. কর্ণের দৈর্ঘ্য 5 সে.মি.

iii. ক্ষেত্রফল 12 বর্গ সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?


ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩। $BD =$ কত সে.মি.?

ক) 7

খ) 8

গ) 10

ঘ) 12

৪। চতুর্ভুজ ABED এর পরিসীমা কত সে.মি.?

ক) 24

খ) 26

গ) 30

ঘ) 36

সৃজনশীল প্রশ্ন

৫। একটি সামান্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহু 4 সে.মি. ও 3 সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 60°

ক. প্রদত্ত তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করো।

খ. অঙ্কনের বিবরণসহ সামান্তরিকটি আঁকো।

গ. উদ্দীপকের সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের সমষ্টির সমান কর্ণবিশিষ্ট একটি বর্গ আঁকো।

৬। দুইটি নির্দিষ্ট রেখাংশ $a = 6$ সে.মি., $b = 4.5$ সে.মি. এবং দুইটি কোণ $\angle x = 75^\circ$ ও $\angle y = 85^\circ$ ।

ক) পেন্সিল কম্পাসে $\angle x$ আঁকো।

খ) রেখাংশ দু'টিকে সন্নিহিত বাহু বিবেচনা করে একটি আয়ত আঁকো। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

গ) a ও b কে সমান্তরাল বাহু এবং প্রদত্ত কোণ দুটিকে a বাহু সংলগ্ন কোণ বিবেচনা করে ট্রাপিজিয়াম আঁকো। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৭। ক) চতুর্ভুজের বাহু চারটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 2 সে.মি., 3 সে.মি., 3.5 সে.মি. ও 4.5 সে.মি. হলে, এর পরিসীমা নির্ণয় করো।

খ) ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুর দৈর্ঘ্য 7 সে.মি. ও 5 সে.মি. এবং তাদের মধ্যে লম্ব দূরত্ব 4 সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

গ) একটি ঘনকের ধার 3 সে.মি. হলে, এর সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত?

ঘ) রম্বসের একটি কোণ 75° হলে, সন্নিহিত অপর কোণটি নির্ণয় করো।

নবম অধ্যায়

পিথাগোরাসের উপপাদ্য


খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রিক দার্শনিক পিথাগোরাস সমকোণী ত্রিভুজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেন। সমকোণী ত্রিভুজের এ বৈশিষ্ট্য পিথাগোরাসের বৈশিষ্ট্য বলে পরিচিত। বলা হয় পিথাগোরাসের জন্মের আগে মিশরীয় ও বাবিলনীয় যুগেও সমকোণী ত্রিভুজের এ বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার ছিল। এ অধ্যায়ে আমরা সমকোণী ত্রিভুজের এ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলো বিশেষ নামে পরিচিত। সমকোণের বিপরীত বাহু অতিভুজ (Hypotenuse) এবং সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় যথাক্রমে ভূমি (Base) ও উন্নতি (Height)। বর্তমান অধ্যায়ে এ তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা—

- পিথাগোরাসের উপপাদ্য যাচাই ও প্রমাণ করতে পারবে।
- ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে ত্রিভুজটি সমকোণী কি না যাচাই করতে পারবে।
- পিথাগোরাসের সূত্র ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

৯.১ সমকোণী ত্রিভুজ

চিত্রে, ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ, যার $\angle ACB$ কোণটি সমকোণ।
সুতরাং AB ত্রিভুজটির অতিভুজ। চিত্রে ত্রিভুজটির বাহুগুলো a, b, c দ্বারা নির্দেশ করি।



কাজ :

১। একটি সমকোণ আঁকো এবং এর বাহু দুইটির উপর যথাক্রমে ৩ সে.মি. ও ৪ সে.মি. দূরত্বে দুইটি বিন্দু চিহ্নিত করো। বিন্দু দুইটি যোগ করে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকো। ত্রিভুজটির অতিভুজের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করো। দৈর্ঘ্য ৫ সে.মি. হয়েছে কি ?

লক্ষ কর, $3^2 + 4^2 = 5^2$ অর্থাৎ দুই বাহুর দৈর্ঘ্য পরিমাপের বর্গের যোগফল অতিভুজের পরিমাপের বর্গের সমান।

সুতরাং a, b, c বাহু দ্বারা নির্দেশিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রে $c^2 = a^2 + b^2$ হবে। এটা পিথাগোরাসের উপপাদ্যের মূল প্রতিপাদ্য। এই উপপাদ্যটি বিভিন্নভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি সহজ প্রমাণ দেওয়া হলো।

৯.২ পিথাগোরাসের উপপাদ্য

একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান।


(দুইটি সমকোণী ত্রিভুজের সাহায্যে)

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ABC সমকোণী ত্রিভুজের $\angle B = 90^\circ$

অতিভুজ $AC = b$, $AB = c$ ও $BC = a$

প্রমাণ করতে হবে যে, $AC^2 = AB^2 + BC^2$

অর্থাৎ $b^2 = c^2 + a^2$



অঙ্কন : BC কে D পর্যন্ত বর্ধিত করি, যেন $CD = AB = c$ হয়।

D বিন্দুতে বর্ধিত BC এর উপর DE লম্ব আঁকি, যেন

$DE = BC = a$ হয়। C, E ও A, E যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
(১) $\triangle ABC$ ও $\triangle CDE$ এ $AB = CD = c$, $BC = DE = a$ এবং অন্তর্ভুক্ত $\angle ABC =$ অন্তর্ভুক্ত $\angle CDE$ সুতরাং $\triangle ABC \cong \triangle CDE$ $\therefore AC = CE = b$ এবং $\angle BAC = \angle ECD$	[প্রত্যেকে সমকোণ] [বাহু-কোণ-বাহু উপপাদ্য]
(২) আবার, $AB \perp BD$ এবং $ED \perp BD$ বলে $AB \parallel ED$ সুতরাং $ABDE$ একটি ট্রাপিজিয়াম।	
(৩) তদুপরি, $\angle ACB + \angle BAC = \angle ACB + \angle ECD =$ এক সমকোণ। $\therefore \angle ACE =$ এক সমকোণ। $\therefore \triangle ACE$ সমকোণী ত্রিভুজ। এখন, $ABDE$ ট্রাপিজিয়ামক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= (\triangle ক্ষেত্র ABC + \triangle ক্ষেত্র CDE + \triangle ক্ষেত্র ACE)$ বা, $\frac{1}{2} BD(AB + DE) = \frac{1}{2} ac + \frac{1}{2} ac + \frac{1}{2} b^2$ বা, $\frac{1}{2} (BC + CD) (AB + DE) = \frac{1}{2} [2ac + b^2]$ বা, $(a + c)(a + c) = 2ac + b^2$ [২ দ্বারা গুণ করে] বা, $a^2 + 2ac + c^2 = 2ac + b^2$ $\therefore b^2 = c^2 + a^2$ (প্রমাণিত)	$\therefore \angle BAC = \angle ECD$ [$\therefore \angle ACB + \angle ACE + \angle ECD = 2$ সমকোণ] [ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}$ সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল $\times$ সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব]

পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিকল্প প্রমাণ


(সদৃশকোণী ত্রিভুজের সাহায্যে)

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ABC সমকোণী ত্রিভুজের

$\angle C = 90^\circ$ এবং অতিভুজ $AB = c$, $BC = a$,

$AC = b$ প্রমাণ করতে হবে যে, $AB^2 = AC^2 + BC^2$,

অর্থাৎ $c^2 = a^2 + b^2$



অঙ্কন : C বিন্দু থেকে অতিভুজ AB এর উপর লম্ব CH অঙ্কন করি। AB অতিভুজ H বিন্দুতে d ও e অংশে বিভক্ত হলো।

প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
$\triangle BCH$ ও $\triangle ABC$ এ $\angle BHC = \angle ACB$ এবং $\angle CBH = \angle ABC$ (১) $\therefore \triangle CBH$ ও $\triangle ABC$ সদৃশ। $\therefore \frac{BC}{AB} = \frac{BH}{BC}$ $\therefore \frac{a}{c} = \frac{e}{a} \dots \dots (1)$ (২) অনুরূপভাবে, $\triangle ACH$ ও $\triangle ABC$ সদৃশ। $\therefore \frac{b}{c} = \frac{d}{b} \dots \dots (2)$ (৩) অনুপাত দুইটি থেকে পাই, $a^2 = c \times e$, $b^2 = c \times d$ অতএব, $a^2 + b^2 = c \times e + c \times d$ $= c(e + d) = c \times c = c^2$ $\therefore c^2 = a^2 + b^2$ [প্রমাণিত]	প্রত্যেকেই সমকোণ সাধারণ কোণ [সদৃশ ত্রিভুজদ্বয়ের অনুরূপ বাহুগুলো সমানুপাতিক] [(i) উভয় ত্রিভুজ সমকোণী (ii) $\angle A$ কোণ সাধারণ] $\therefore c = e + d$

পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিকল্প প্রমাণ

(বীজগণিতের সাহায্যে)

পিথাগোরাসের উপপাদ্য বীজগণিতের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যায়।


বিশেষ নির্বচন : মনে করি, একটি সমকোণী ত্রিভুজের

অতিভুজ c এবং a, b যথাক্রমে অন্য দুই বাহু।

প্রমাণ করতে হবে, $c^2 = a^2 + b^2$

অঙ্কন : প্রদত্ত ত্রিভুজটির সমান করে চারটি ত্রিভুজ চিত্রে

প্রদর্শিত উপায়ে আঁকি।



প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
(১) অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রটি বর্গক্ষেত্র। এর ক্ষেত্রফল $(a+b)^2$	[বাহুগুলোর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য $a+b$ এবং কোণগুলো সমকোণ]
(২) ছোট চতুর্ভুজ ক্ষেত্রটি বর্গক্ষেত্র। এর ক্ষেত্রফল c^2	[বাহুগুলোর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য c]
(৩) অঙ্কনানুসারে, বড় বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল চারটি ত্রিভুজক্ষেত্র ও ছোট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান। অর্থাৎ, $(a+b)^2 = 4 \times \frac{1}{2} \times a \times b + c^2$ বা, $a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$ $\therefore c^2 = a^2 + b^2$ (প্রমাণিত)	

কাজ : ১। $(a-b)^2$ এর বিস্তৃতির সাহায্যে পিথাগোরাসের উপপাদ্যটি প্রমাণ করো।


৯.৩ পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্য

যদি কোনো ত্রিভুজের একটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান হয়, তবে শেষোক্ত বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণটি সমকোণ হবে।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, $\triangle ABC$ এর $AB^2 = AC^2 + BC^2$

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle C =$ এক সমকোণ।

অঙ্কন : এমন একটি ত্রিভুজ DEF আঁকি, যেন $\angle F$ এক সমকোণ,
 $EF = BC$ এবং $DF = AC$ হয়।




প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
(১) $DE^2 = EF^2 + DF^2$ $= BC^2 + AC^2 = AB^2$ $\therefore DE = AB$ এখন $\triangle ABC$ ও $\triangle DEF$ এ $BC = EF$, $AC = DF$ এবং $AB = DE$. $\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF \therefore \angle C = \angle F$ $\therefore \angle C =$ এক সমকোণ। [প্রমাণিত]	[কারণ $\triangle DEF$ এ $\angle F$ এক সমকোণ] [অঙ্কন অনুসারে] [কল্পনা] [বাহু-বাহু-বাহু সর্বসমতা] [$\therefore \angle F$ এক সমকোণ]

অনুশীলনী ৯

- ১। সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের পার্থক্য 5° হলে ক্ষুদ্রতম কোণটির মান কত?
ক) 40° খ) 42.5° গ) 47.5° ঘ) 50°
- ২। সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ x একক এবং অপর বাহুদ্বয়ের একটি y একক হলে ওয় বাহুটির দৈর্ঘ্য কত একক?
ক) $x^2 + y^2$ খ) $\sqrt{x^2 + y^2}$ গ) $\sqrt{x^2 - y^2}$ ঘ) $x^2 - y^2$
- ৩। নিচের কোন পরিমাপগুলোর জন্য একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব?
ক) 4, 4, 5 খ) 5, 12, 13 গ) 8, 10, 12 ঘ) 2, 3, 4


$ABCDE$ বহুভুজে $AE \parallel BC$, $CF \perp AE$ এবং
 $DQ \perp CF$. $ED = 10$ মি.মি., $EF = 2$ মি.মি.
 $BC = 8$ মি.মি. $AB = 12$ মি.মি.



উপরের তথ্যের ভিত্তিতে নিচের (৪-৬) নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

- ৪। $ABCF$ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ মি.মি. ?
ক. 64 খ. 96 গ. 100 ঘ. 144
- ৫। নিচের কোনটি FPC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্দেশ করে ?
ক. 32 বর্গ মি.মি. খ. 48 বর্গ মি.মি. গ. 72 বর্গ মি.মি. ঘ. 60 বর্গ মি.মি.
- ৬। CD এর দৈর্ঘ্য নিচের কোনটিতে প্রকাশ পায়?
ক. $2\sqrt{2}$ মি.মি. খ. 4 মি.মি. গ. $4\sqrt{2}$ মি.মি. ঘ. 8 মি.মি.
- ৭। ABC একটি সমবাহু ত্রিভুজ। AD , BC -এর উপর লম্ব।
প্রমাণ করো যে, $AB^2 + BC^2 + CA^2 = 4AD^2$
- ৮। $ABCD$ চতুর্ভুজের কর্ণ দুইটি পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করে।
প্রমাণ করো যে, $AB^2 + CD^2 = BC^2 + AD^2$
- ৯। ABC ত্রিভুজের $\angle A$ সমকোণ এবং CD একটি মধ্যমা।
প্রমাণ করো যে, $BC^2 = CD^2 + 3AD^2$
- ১০। ABC ত্রিভুজের $\angle A$ সমকোণ BP ও CQ দুইটি মধ্যমা।
প্রমাণ করো যে, $5BC^2 = 4(BP^2 + CQ^2)$

১১।



চিত্রে $OB = 4$ সে.মি হলে BD এবং AC এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

১২। প্রমাণ করো যে, কোনো বর্গক্ষেত্র এর কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের অর্ধেক।

১৩। ABC ত্রিভুজের $\angle A =$ এক সমকোণ। D , AC এর উপরস্থ একটি বিন্দু।

প্রমাণ করো যে, $BC^2 + AD^2 = BD^2 + AC^2$

১৪। ABC ত্রিভুজের $\angle A =$ এক সমকোণ D ও E যথাক্রমে AB ও AC এর মধ্যবিন্দু হলে,

প্রমাণ করো যে, $DE^2 = CE^2 + BD^2$

১৫। $\triangle ABC$ এ BC এর উপর লম্ব AD এবং $AB > AC$

প্রমাণ করো যে, $AB^2 - AC^2 = BD^2 - CD^2$

১৬। $\triangle ABC$ এ BC এর উপর AD লম্ব এবং AD এর উপর P যেকোনো বিন্দু ও $AB > AC$

প্রমাণ করো যে, $PB^2 - PC^2 = AB^2 - AC^2$

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত $1 : 1 : \sqrt{2}$ হলে এর বৃহত্তম কোণটির মান কত?

ক) 80°

খ) 90°

গ) 100°

ঘ) 120°

২। $\triangle ABC$ এ $\angle A = 90^\circ$ সমকোণ হলে এর

i. অতিভুজ BC

ii. ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} AB \cdot AC$

iii. $BC^2 = AB^2 + AC^2$

নিচের কোনটি সঠিক?


ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে $\angle A = 90^\circ$

৩। PQ এর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.?

ক) 6

খ) 6.5

গ) 7

ঘ) 9.5

৪। ΔABC = কত বর্গ সে.মি.?

ক) 39

খ) 32.5

গ) 30


ঘ) 15

সৃজনশীল প্রশ্ন

৫। ক. $PQST$ কী ধরনের চতুর্ভুজ? পক্ষে যুক্তি দাও।

খ. দেখাও যে, ΔPRT সমকোণী।

গ. প্রমাণ করো যে, $PR^2 = PQ^2 + QR^2$



৬। ΔPQR -এ $\angle P = 90^\circ$, PQ ও PR-এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে M ও N।

ক) সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের একটি অপরটির চারগুণ হলে ক্ষুদ্রতম কোণটি নির্ণয় করো।

খ) প্রমাণ করো যে, $PR^2 + PQ^2 = QR^2$

গ) প্রমাণ করো যে, $5RQ^2 = 4(RM^2 + QN^2)$

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৭। ক) ΔABC -এ $AB = 15$ সে.মি., $BC = 12$ সে.মি. এবং $AC = 9$ সে.মি. হলে, $\angle BAC$ নির্ণয় করো।


খ) ΔABC -এ $\angle C = 90^\circ$, $AB = 5$ সে.মি., $AC = 4$ সে.মি. হলে, BC -মান নির্ণয় করো।

গ) একটি সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব 6 সে.মি. ও অতিভুজ 10 সে.মি হলে, এর ভূমির দৈর্ঘ্য নির্ণয়


দশম অধ্যায়

বৃত্ত


প্রতিদিন আমরা কিছু জিনিস দেখি ও ব্যবহার করি যা বৃত্তাকার : যেমন, গাড়ির চাকা, চুড়ি, ঘড়ি, বোতাম, থালা, মুদ্রা ইত্যাদি। আমরা দেখি যে, ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার অগ্রভাগ গোলাকার পথে ঘুরতে থাকে। সেকেন্ডের কাঁটার অগ্রভাগ যে পথ চিহ্নিত করে একে বৃত্ত বলে। বৃত্তাকার বস্তুকে আমরা নানাভাবে ব্যবহার করি।



চাকা



ঘড়ি



চুড়ি



বোতাম


অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা—

- বৃত্তের ধারণা লাভ করবে।
- পাই (π) -এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ও পরিসীমা নির্ণয় করে সমস্যা সমাধান করতে পারবে।
- বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্য প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধান করতে পারবে এবং পরিমাপক ফিতা ব্যবহার করে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল পরিমাপ করতে পারবে।
- চতুর্ভুজ ও বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সাহায্যে বেলনের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করতে পারবে।

১০.১ বৃত্ত (Circle)

এক টাকার একটি বাংলাদেশি মুদ্রা নিয়ে সাদা কাগজের উপর রেখে মুদ্রাটির মাঝ বরাবর বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে চেপে ধরি। এই অবস্থায় ডান হাতে সরু পেন্সিল নিয়ে মুদ্রাটির গা ঘেঁষে চারদিকে ঘুরিয়ে আনি। মুদ্রাটি সরিয়ে নিলে কাগজে একটি গোলাকার আবদ্ধ বক্ররেখা দেখা যাবে। এটি একটি বৃত্ত।

নিখুঁতভাবে বৃত্ত আঁকার জন্য পেন্সিল কম্পাস ব্যবহার করা হয়। কম্পাসের কাঁটাটি কাগজের ওপর চেপে ধরে অপর প্রান্তে সংযুক্ত পেন্সিলটি কাগজের ওপর চারদিকে ঘুরিয়ে আনলেই একটি বৃত্ত আঁকা হয়ে থাকে, যেমনটি চিত্রে দেখানো হয়েছে। তাহলে বৃত্ত আঁকার সময় নির্দিষ্ট একটি বিন্দু থেকে সমদূরবর্তী বিন্দুগুলোকে আঁকা হয়। এই নির্দিষ্ট বিন্দুটি বৃত্তের কেন্দ্র। কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী যেকোনো বিন্দুর দূরত্বকে বৃত্তের ব্যাসার্ধ বলা হয়।




কাজ :

১। পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে O কেন্দ্রবিশিষ্ট ৪ সে.মি. ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত আঁকো। বৃত্তের উপরে বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি বিন্দু A, B, C, D নিয়ে কেন্দ্র থেকে বিন্দুগুলো পর্যন্ত রেখাংশগুলো আঁকো। রেখাংশগুলোর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করো। কী লক্ষ করো?

১০.২ বৃত্তের জ্যা ও চাপ (Chord and Arc of a Circle)


পাশের চিত্রে, একটি বৃত্ত দেখানো হয়েছে যার কেন্দ্র O । বৃত্তের উপর যেকোনো বিন্দু P, Q নিয়ে এদের সংযোজক রেখাংশ PQ টানি। PQ রেখাংশ বৃত্তটির একটি জ্যা। জ্যা দ্বারা বৃত্তটি দুইটি অংশে বিভক্ত হয়েছে। জ্যাটির দুই পাশের দুই অংশে বৃত্তটির উপর দুইটি বিন্দু Y, Z নিলে ঐ দুইটি অংশের নাম PYQ ও PZQ । জ্যা দ্বারা বিভক্ত বৃত্তের প্রত্যেক অংশকে বৃত্তচাপ বা সংক্ষেপে চাপ বলে। চিত্রে, PQ জ্যা দ্বারা সৃষ্ট চাপ দুইটি হচ্ছে PYQ ও PZQ ।



বৃত্তের যেকোনো দুইটি বিন্দুর সংযোজক রেখাংশ বৃত্তটির একটি জ্যা।
প্রত্যেক জ্যা বৃত্তকে দুইটি চাপে বিভক্ত করে।

১০.৩ ব্যাস ও পরিধি (Diameter and Circumference)

পাশের চিত্রে, AB এমন একটি জ্যা, যা বৃত্তের কেন্দ্র O দিয়ে গেছে। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা বলি, জ্যাটি বৃত্তের একটি ব্যাস। ব্যাসের দৈর্ঘ্যকেও ব্যাস বলা হয়। AB ব্যাসটি দ্বারা সৃষ্ট চাপ দুইটি সমান; এরা প্রত্যেকে একটি অর্ধবৃত্ত। বৃত্তের কেন্দ্রগামী যেকোনো জ্যা, বৃত্তের একটি ব্যাস। ব্যাস বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা। বৃত্তের প্রত্যেক ব্যাস বৃত্তকে দুইটি অর্ধবৃত্তে বিভক্ত করে। ব্যাসের অর্ধেক দৈর্ঘ্যকে ব্যাসার্ধ বলে। ব্যাস ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ।



বৃত্তের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যকে পরিধি বলে। অর্থাৎ বৃত্তস্থিত যেকোনো বিন্দু P থেকে বৃত্ত বরাবর ঘুরে পুনরায় P বিন্দু পর্যন্ত পথের দূরত্বই পরিধি।

বৃত্ত সরলরেখা নয় বলে রুলারের সাহায্যে বৃত্তের পরিধির দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায় না। পরিধি মাপার একটি সহজ উপায় আছে। ছবি আঁকার কাগজে একটি বৃত্ত এঁকে বৃত্ত বরাবর কেটে নাও। পরিধির উপর একটি বিন্দু চিহ্নিত করো। এবার কাগজে একটি রেখাংশ আঁকো এবং বৃত্তাকার কার্ডটি কাগজের উপর খাড়াভাবে রাখো যেন পরিধির চিহ্নিত বিন্দুটি রেখাংশের এক প্রান্তের সাথে মিলে যায়। এখন কার্ডটি রেখাংশ বরাবর গড়িয়ে নাও যতক্ষণ না পরিধির চিহ্নিত বিন্দুটি রেখাংশকে পুনরায় স্পর্শ করে। স্পর্শবিন্দুটি চিহ্নিত করো এবং রেখাংশের প্রান্তবিন্দু থেকে এর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করো। এই পরিমাপই পরিধির দৈর্ঘ্য। লক্ষ করো, ছোট বৃত্তের ব্যাস ছোট, পরিধিও ছোট; অন্যদিকে বড় বৃত্তের ব্যাস বড়, পরিধিও বড়।

১০.৪ বৃত্ত সম্পর্কিত উপপাদ্য (Circle related theorems)

কাজ :

১। ট্রেসিং কাগজে যেকোনো ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত আঁকো। O , বৃত্তের কেন্দ্র নাও। ব্যাস ভিন্ন একটি জ্যা AB আঁকো। O বিন্দুর মধ্য দিয়ে কাগজটি এমনভাবে ভাঁজ করো যেন, জ্যা-এর প্রান্তবিন্দুদ্বয় A ও B মিলে যায়। ভাঁজ বরাবর রেখাংশ OM আঁকো, যা জ্যাকে M বিন্দুতে ছেদ করে। তা হলে M জ্যা-এর মধ্যবিন্দু। $\angle OMA$ ও $\angle OMB$ কোণগুলো পরিমাপ করো। এরা প্রত্যেকে কি এক সমকোণের সমান?

উপপাদ্য ১।


বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাস ভিন্ন কোনো জ্যা-এর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ ঐ জ্যা-এর উপর লম্ব।

মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AB ব্যাস নয় এমন একটি জ্যা

এবং M এই জ্যা-এর মধ্যবিন্দু। O, M যোগ করি।

প্রমাণ করতে হবে যে, OM রেখাংশ AB জ্যা-এর উপর লম্ব।

অঙ্কন : O, A এবং O, B যোগ করি।



প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
(১) $\triangle OAM$ এবং $\triangle OBM$ এ $AM = BM$ $OA = OB$ এবং $OM = OM$ সুতরাং $\triangle OAM \cong \triangle OBM$ $\therefore \angle OMA = \angle OMB$ (২) যেহেতু কোণদ্বয় রৈখিক যুগল কোণ এবং এদের পরিমাপ সমান, সুতরাং $\angle OMA = \angle OMB = ১$ সমকোণ। অতএব, $OM \perp AB$ (প্রমাণিত)	[M, AB এর মধ্যবিন্দু] [উভয়ে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ] [সাধারণ বাহু] [বাহু-বাহু-বাহু উপপাদ্য]

কাজ : প্রমাণ করো যে, বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন অন্য কোনো জ্যা-এর উপর অঙ্কিত লম্ব ঐ জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। [ইঙ্গিত : সমকোণী ত্রিভুজের সর্বসমতা ব্যবহার করো]

অনুসিদ্ধান্ত ১। বৃত্তের যেকোনো জ্যা-এর লম্বসম-দ্বিখণ্ডক কেন্দ্রগামী।

অনুসিদ্ধান্ত ২। যেকোনো সরলরেখা একটি বৃত্তকে দুইয়ের অধিক বিন্দুতে ছেদ করতে পারে না।


অনুশীলনী ১০.১

- ১। প্রমাণ করো যে, কোনো বৃত্তের দুইটি জ্যা পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে তাদের ছেদবিন্দু বৃত্তটির কেন্দ্র হবে।
- ২। প্রমাণ করো যে, দুইটি সমান্তরাল জ্যা-এর মধ্যবিন্দুর সংযোজক সরলরেখা কেন্দ্রগামী এবং জ্যা-দ্বয়ের উপর লম্ব।
- ৩। কোনো বৃত্তের AB ও AC জ্যা দুইটি A বিন্দুগামী ব্যাসার্ধের সাথে সমান কোণ উৎপন্ন করে। প্রমাণ

করো যে, $AB = AC$

- ৪। চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র এবং জ্যা $AB =$ জ্যা AC

প্রমাণ করো যে, $\angle BAO = \angle CAO$




- ৫। কোনো বৃত্ত একটি সমকোণী ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুগুলো দিয়ে যায়। দেখাও যে, বৃত্তটির কেন্দ্র অতিভুজের মধ্যবিন্দু।
- ৬। দুইটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের একটির AB জ্যা অপর বৃত্তকে C ও D বিন্দুতে ছেদ করে।
প্রমাণ করো যে, $AC = BD$

উপপাদ্য ২।

বৃত্তের সকল সমান জ্যা কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী।

মনে করি, O বৃত্তের কেন্দ্র এবং AB ও CD বৃত্তের দুইটি সমান জ্যা।

প্রমাণ করতে হবে যে, O থেকে AB এবং CD জ্যা-দ্বয় সমদূরবর্তী।



অঙ্কন : O থেকে AB এবং CD জ্যা-এর উপর যথাক্রমে

OE এবং OF লম্ব রেখাংশ আঁকি। O, A এবং O, C যোগ করি।

প্রমাণ :


ধাপ	যথার্থতা
(১) $OE \perp AB$ ও $OF \perp CD$ সুতরাং $AE = BE$ এবং $CF = DF$ $\therefore AE = \frac{1}{2} AB$ এবং $CF = \frac{1}{2} CD$ (২) কিন্তু $AB = CD$ বা, $\frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} CD$ $\therefore AE = CF$ (৩) এখন $\triangle OAE$ এবং $\triangle OCF$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে	[কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন যেকোনো জ্যা-এর উপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে] [কল্পনা]

অতিভুজ $OA =$ অতিভুজ OC এবং $AE = CF$ $\therefore \triangle OAE \cong \triangle OCF$ $\therefore OE = OF$ (৪) কিন্তু OE এবং OF কেন্দ্র O থেকে যথাক্রমে AB জ্যা এবং CD জ্যা -এর দূরত্ব। সুতরাং, AB এবং CD জ্যাদ্বয় বৃত্তের কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী। (প্রমাণিত)	[উভয়ে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ] [ধাপ ২] [সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা উপপাদ্য]
--	--

উপপাদ্য ৩

বৃত্তের কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী সকল জ্যা পরস্পর সমান।

মনে করি, O বৃত্তের কেন্দ্র এবং AB ও CD দুইটি জ্যা। O থেকে AB ও CD এর উপর যথাক্রমে OE ও OF লম্ব। তাহলে OE ও OF কেন্দ্র থেকে যথাক্রমে AB ও CD জ্যা -এর দূরত্ব নির্দেশ করে।
 $OE = OF$ হলে প্রমাণ করতে হবে যে, $AB = CD$



অঙ্কন : O, A এবং O, C যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
(১) যেহেতু $OE \perp AB$ এবং $OF \perp CD$. সুতরাং $\angle OEA = \angle OFC =$ এক সমকোণ (২) এখন, $\triangle OAE$ এবং $\triangle OCF$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে অতিভুজ $OA =$ অতিভুজ OC এবং $OE = OF$ $\therefore \triangle OAE \cong \triangle OCF$ $\therefore AE = CF$ (৩) $AE = \frac{1}{2} AB$ এবং $CF = \frac{1}{2} CD$ (৪) সুতরাং $\frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} CD$ অর্থাৎ $AB = CD$	[সমকোণ] [উভয়ে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ] [কল্পনা] [সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা উপপাদ্য] [কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন যেকোনো জ্যা-এর উপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে]

উদাহরণ ৪। প্রমাণ করো যে, বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা।

মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট $ABDC$ একটি বৃত্ত। AB ব্যাস এবং CD ব্যাস ভিন্ন যেকোনো একটি জ্যা।

প্রমাণ করতে হবে যে, $AB > CD$

অঙ্কন: O, C এবং O, D যোগ করি।


প্রমাণ: $OA = OB = OC = OD$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

এখন, $\triangle OCD$ এ

$$OC + OD > CD$$

বা, $OA + OB > CD$

অর্থাৎ, $AB > CD$



[$\because$ ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর]

অনুশীলনী ১০.২

- ১। বৃত্তের দুইটি সমান জ্যা পরস্পরকে ছেদ করলে দেখাও যে, এদের একটির অংশদ্বয় অপরটির অংশদ্বয়ের সমান।
- ২। প্রমাণ করো যে, বৃত্তের সমান জ্যা-এর মধ্যবিন্দুগুলো সমবৃত্ত।
- ৩। দেখাও যে, ব্যাসের দুই প্রান্ত থেকে এর বিপরীত দিকে দুইটি সমান জ্যা অঙ্কন করলে এরা সমান্তরাল হয়।
- ৪। দেখাও যে, ব্যাসের দুই প্রান্ত থেকে এর বিপরীত দিকে দুইটি সমান্তরাল জ্যা আঁকলে এরা সমান হয়।
- ৫। দেখাও যে, বৃত্তের দুইটি জ্যা-এর মধ্যে বৃহত্তর জ্যা-টি ক্ষুদ্রতর জ্যা অপেক্ষা কেন্দ্রের নিকটতর।
৬. O কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে PQ এবং RS দুটি সমান জ্যা এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে M ও N ।
 - ক) 314 বর্গ সে.মি. ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।
 - খ) প্রমাণ করো যে, $OM = ON$ ।
 - গ) PQ এবং RS জ্যাদ্বয় বৃত্তের অভ্যন্তরে পরস্পরকে ছেদ করলে প্রমাণ করো যে, একটির অংশদ্বয় অপরটির অংশদ্বয়ের সমান।

১০.৫ বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত π (Ratio of Circumference and Diameter of a Circle)

বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের মধ্যে কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না বের করতে দলগতভাবে নিচের কাজটি করো:

কাজ:

- ১। তোমরা প্রত্যেকে পছন্দমতো ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধের তিনটি করে বৃত্ত আঁক এবং ব্যাসার্ধ ও পরিধি পরিমাপ করে নিচের সারণিটি পূরণ করো পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত কি ধ্রুবক বলে মনে হয়?

বৃত্ত	ব্যাসার্ধ	পরিধি	ব্যাস	পরিধি / ব্যাস
1	3.5 সে.মি.	22 সে.মি.	7.0 সে.মি.	$22/7 = 3.142$

কোনো বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত ধ্রুবক। একে গ্রিক অক্ষর π (পাই) দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

অর্থাৎ, বৃত্তের পরিধি c ও ব্যাস d হলে অনুপাত $\frac{c}{d} = \pi$ বা $c = \pi d$.

আবার বৃত্তের ব্যাস ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ ; অর্থাৎ, $d = 2r$ অতএব, $c = 2\pi r$

প্রাচীনকাল থেকে গণিতবিদগণ π এর আসন্ন মান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় গণিতবিদ আর্যভট্ট (৪৭৬ – ৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ) π এর আসন্ন মান নির্ণয় করেছেন $\frac{62832}{20000}$ যা প্রায় ৩.১৪১৬। গণিতবিদ

শ্রীনিবাস রামানুজ (১৮৮৭–১৯২০) π এর আসন্ন মান বের করেছেন যা দশমিকের পর মিলিয়ন ঘর পর্যন্ত সঠিক। প্রকৃতপক্ষে, π একটি অমূলদ সংখ্যা। আমাদের দৈনন্দিন হিসাবের প্রয়োজনে ধ্রুবক π এর আসন্ন মান $\frac{22}{7}$ ধরা হয়।

উদাহরণ ১। ১০ সে.মি. ব্যাসের বৃত্তের পরিধি কত? ($\pi \approx 3.14$ ধর)

সমাধান : বৃত্তের ব্যাস $d = 10$ সে.মি

$$\text{বৃত্তের পরিধি} = \pi d$$

$$\approx 3.14 \times 10 \text{ সে.মি.} = 31.4 \text{ সে.মি.}$$

অতএব, ১০ সে.মি. ব্যাসের বৃত্তের পরিধি ৩১.৪ সে.মি. (প্রায়)।

উদাহরণ ২। ১৪ সে.মি. ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কত? ($\pi \approx \frac{22}{7}$ ধর)

সমাধান : বৃত্তের ব্যাসার্ধ (r) = ১৪ সে.মি

$$\text{বৃত্তের পরিধি} = 2\pi r$$

$$\approx 2 \times \frac{22}{7} \times 14 \text{ সে.মি.} = 88 \text{ সে.মি.}$$


অতএব, ১৪ সে.মি. ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি ৮৮ সে.মি. (প্রায়)।

১০.৬ বৃত্তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ সমতলীয় ক্ষেত্র বৃত্তক্ষেত্র। বৃত্তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে নিচের কাজটি করি।

কাজ :

(ক) কাগজে চিত্রের ন্যায় একটি বৃত্ত এঁকে এর অর্ধাংশ রং করো। এবার বৃত্তটি মাঝ বরাবর পর্যায়ক্রমে তিনবার ভাঁজ করো এবং ভাঁজ বরাবর কেটে নাও। বৃত্তটি সমান আটটি অংশে বিভক্ত হলো। বৃত্তের টুকরোগুলোকে চিত্রের ন্যায় সাজালে কী পাওয়া যায়? একটি সামান্তরিকের মতো নয় কি?



(খ) বৃত্তটি সমান ষোলোটি অংশে বিভক্ত করে একইভাবে সাজাও। সাজানোর ফলে কী পেয়েছ?

(গ) বৃত্তটি সমান বৃত্তিংশ অংশে বিভক্ত করে একইভাবে সাজাও। সাজানোর ফলে কী পেয়েছ? প্রায় একটি আয়তক্ষেত্র কি ?

(ঘ) আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত ? ক্ষেত্রফল কত ?

$$\begin{aligned}
 \text{বৃত্তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} &= \text{আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল} = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} \\
 &= \text{পরিধির অর্ধেক} \times \text{বাসার্ধ} \\
 &= \frac{1}{2} \times 2\pi r \times r = \pi r^2 \\
 \therefore \text{বৃত্তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} &= \pi r^2 \text{ বর্গ একক}
 \end{aligned}$$

কাজ :

- ১। (ক) গ্রাফ কাগজে ৫ সে.মি. ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত অঙ্কন করো। ক্ষুদ্রতম বর্গগুলো গণনা করে বৃত্তক্ষেত্রটির আনুমানিক ক্ষেত্রফল বের করো।
- (খ) একই বৃত্তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করো। নির্ণীত ক্ষেত্রফল ও আনুমানিক ক্ষেত্রফলের পার্থক্য বের করো।

উদাহরণ ৩। ৯.৮ মি. ব্যাসের বৃত্তাকার একটি বাগানের ক্ষেত্রফল কত?

সমাধান : বৃত্তাকার বাগানটির ব্যাস, $d = 9.8$ মি.

$$\text{বৃত্তাকার বাগানটির ব্যাসার্ধ } r = \frac{9.8}{2} \text{ মি.} = 4.9 \text{ মি.}$$

$$\begin{aligned}
 \text{বৃত্তাকার বাগানটির ক্ষেত্রফল} &= \pi r^2 \\
 &\approx 3.14 \times 4.9^2 \text{ বর্গমিটার} = 75.39 \text{ বর্গমিটার (প্রায়)}
 \end{aligned}$$

উদাহরণ ৪। পাশের চিত্রে দুইটি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত প্রদর্শিত হয়েছে। বৃত্ত দুইটির ব্যাসার্ধ যথাক্রমে ৯ সে.মি. ও ৪ সে.মি.। বৃত্তদ্বয়ের পরিধির মধ্যবর্তী এলাকার ক্ষেত্রফল কত ?

সমাধান :

বৃহত্তর বৃত্তের ব্যাসার্ধ $R = 9$ সে.মি.

বৃহত্তর বৃত্তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল $= \pi R^2$ বর্গ সেন্টিমিটার

$$\approx 3.14 \times 9^2 \text{ বর্গ সেন্টিমিটার} = 254.34 \text{ বর্গ সেন্টিমিটার}$$


ক্ষুদ্রতর বৃত্তের ব্যাসার্ধ $r = 4$ সে.মি.

ক্ষুদ্রতর বৃত্তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল $= \pi r^2$ বর্গ সেন্টিমিটার

$$\approx 3.14 \times 4^2 \text{ বর্গ সেন্টিমিটার} = 50.24 \text{ বর্গ সেন্টিমিটার (প্রায়)}$$


বৃত্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী এলাকার ক্ষেত্রফল $= (254.34 - 50.24)$ বর্গ সেন্টিমিটার (প্রায়)

$$= 204.10 \text{ বর্গ সেন্টিমিটার (প্রায়)}$$




১০.৭ বেলন বা সিলিন্ডার (Cylinder)

একটি আয়তাকার (চিত্র-১) বা বর্গাকার ক্ষেত্রকে তার যেকোনো এক বাহুকে স্থির রেখে ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণ একবার ঘোরানো হলে একটি ঘনবস্তু (চিত্র-২) উৎপন্ন হয়। এরূপ ঘনবস্তুকে বলা হয় সমবৃত্তভূমিক বেলন বা সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডার (Right circular cylinder)। স্থির রেখাটিকে বেলনটির অক্ষ ও এর বিপরীত বাহুকে বেলনটির সৃজকরেখা বলা হয়। এটি বেলনটির উচ্চতা। অপর বাহুটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে বেলনটির ব্যাসার্ধ।



চিত্র-১



চিত্র-২

বেলনের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় : মনে করি, একটি সমবৃত্তভূমিক

বেলনের ব্যাসার্ধ r এবং উচ্চতা h । বেলনটিকে (যেমন, টিনের

একটি ফাঁপা কৌটা) তার প্রান্ততলদ্বয়ের সাথে লম্ব বরাবর কেটে সমতল আকারের করা হলে হবে একটি আয়তক্ষেত্র, যার প্রান্তদ্বয় হিসেবে যে দুই বাহু পাওয়া যাবে তাদের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য হবে $2\pi r$ (বৃত্তের পরিধি) এবং অপর বাহু হবে বেলনটির উচ্চতা।

অতএব, সমবৃত্তভূমিক বেলনটির সমগ্র পৃষ্ঠের বা তলের

ক্ষেত্রফল $=$ প্রান্ত তলদ্বয়ের ক্ষেত্রফল $+$ বক্রতলের (যা একটি আয়তক্ষেত্র) ক্ষেত্রফল

$$= 2 \times \pi r^2 + 2 \pi r \times h$$

$$= 2 \pi r^2 + 2 \pi r h$$

$$= 2 \pi r (r + h) \text{ বর্গ একক}$$


উদাহরণ ৫। একটি সমবৃত্তভূমিক বেলনের ব্যাসার্ধ ৪.৫ সে.মি. ও উচ্চতা ৬ সে.মি.। বেলনটির বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো ($\pi = 3.14$)।

সমাধান : প্রদত্ত সমবৃত্তভূমিক বেলনটির ব্যাসার্ধ $r = 4.5$ সে.মি. ও উচ্চতা $h = 6$ সে.মি.।

$\therefore$ বেলনটির বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল

$$= 2\pi r h = 2 \times 3.14 \times 4.5 \times 6 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 6.28 \times 27 \text{ বর্গ সে.মি} = 169.56 \text{ বর্গ সে.মি}$$



অনুশীলনী ১০.৩

১। একক ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল—

- ক) 1 বর্গ একক খ) 2 বর্গ একক গ) π বর্গ একক ঘ) π^2 বর্গ একক

২। 3 সে.মি. এবং 2 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট এককেন্দ্রিক দুইটি বৃত্তক্ষেত্রের পরিধিদ্বয়ের মাকের অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

- ক) π খ) 3π গ) 4π ঘ) 5π

৩। কোন গাড়ির চাকার ব্যাস 38 সে.মি. হলে দুই বার ঘুরে চাকাটি কত সে.মি (প্রায়) দূরত্ব অতিক্রম করবে?

- ক) 59.69 সে.মি. খ) 76 সে.মি. গ) 119.38 সে.মি. ঘ) 238.64 সে.মি.


৪। নিম্নবর্ণিত ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের পরিধি নির্ণয় করো :

- (ক) 10 সে.মি. (খ) 14 সে.মি. (গ) 21 সে.মি.

৫। একটি বৃত্তাকার শিটের পরিধি 154 সে.মি. হলে, এর ব্যাসার্ধ কত? শিটের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

৬। একজন মালী 21 মি. ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার বাগানের চারদিকে দুইবার ঘুরিয়ে দড়ির বেড়া দিতে চায়। প্রতি মিটার দড়ির মূল্য 18 টাকা হলে, তাকে কত টাকার দড়ি কিনতে হবে ?

৭। পাশের চিত্রের ক্ষেত্রটির পরিসীমা নির্ণয় করো।



৮। 14 সে.মি. ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার বোর্ড থেকে 1.5 সে.মি. ব্যাসার্ধের দুইটি বৃত্তাকার অংশ এবং 3 সে.মি. দৈর্ঘ্য ও 1 সে.মি. প্রস্থের একটি আয়তাকার অংশ কেটে নেয়া হলো। বোর্ডের বাকি অংশের ক্ষেত্রফল বের করো।



৯। 5.5 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি সমবৃত্তভূমিক বেলনের উচ্চতা 8 সে.মি.। বেলনটির সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো ($\pi = 3.14$)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 3 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্র থেকে 6 সে.মি. দৈর্ঘ্যের জ্যা -এর দূরত্ব কত সে.মি.?

- ক) 6 খ) 3 গ) 2 ঘ) 0

২। $2r$ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের—

i. পরিধি $4\pi r$ একক

ii. ব্যাস $4r$ একক

iii. ক্ষেত্রফল $= 2\pi r^2$ বর্গ একক

নিচের কোনটি সঠিক?


ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

◆ চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে O বৃত্তটির কেন্দ্র। $BE = 4$ cm

৩। $OE = OF$ হলে, $CD =$ কত সে.মি.?

ক) 3 cm

খ) 4cm

গ) 6cm

ঘ) 8cm

৪। $AB = CD$ এবং $OE = 3$ সে.মি. হলে, বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত সে.মি.?

ক) 3

খ) 4

গ) 5

ঘ) 6


সৃজনশীল প্রশ্ন

৫। O কেন্দ্রবিশিষ্ট দুইটি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত ABC ও PQR

ক) ABC বৃত্তের পরিধি নির্ণয় করো।

খ) প্রমাণ করতে হবে যে, $AM = BM$

গ) প্রতি বর্গমিটার 75 টাকা হিসাবে গাঢ় অংশে ঘাস লাগাতে কত খরচ হবে নির্ণয় করো।



সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৬। ক) একটি বৃত্তের পরিধি 44 সে.মি. হলে, এর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।

খ) একটি বৃত্তের ব্যাস 12 সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

গ) একটি সমবৃত্তভূমি বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ 4.5 সে.মি. ও উচ্চতা 5 সে.মি. হলে, এর বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

ঘ) একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 81π বর্গ সে.মি.। মাঠটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।

একাদশ অধ্যায়

তথ্য ও উপাত্ত

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ও দ্রুত উন্নয়নে তথ্য ও উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রেখে চলেছে। তথ্য ও উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় গবেষণা এবং অব্যাহত গবেষণার ফল হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নয়ন। তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপনে ব্যাপকতা লাভ করেছে সংখ্যার ব্যবহার। আর সংখ্যাসূচক তথ্য হচ্ছে পরিসংখ্যান। তাই পরিসংখ্যানের মৌলিক ধারণা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুসমূহ জানা আবশ্যিক। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে পরিসংখ্যানের মৌলিক বিষয়গুলো ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ অধ্যায়ে কেন্দ্রীয় প্রবণতা, এর পরিমাপক গড়, মধ্যক ও প্রচুরক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা—

- কেন্দ্রীয় প্রবণতা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে গড়, মধ্যক ও প্রচুরক নির্ণয় করে সমস্যা সমাধান করতে পারবে।
- আয়তলেখ ও পাইচিত্র অঙ্কন করতে পারবে।

১১.১ তথ্য ও উপাত্ত (Information and Data)

আগের শ্রেণিতে আমরা এ সম্বন্ধে মৌলিক ধারণা লাভ করেছি এবং বিস্তারিত জেনেছি। এখানে আমরা স্বল্প পরিসরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমরা জানি, সংখ্যাভিত্তিক কোনো তথ্য বা ঘটনা হচ্ছে একটি পরিসংখ্যান। আর তথ্য বা ঘটনা-নির্দেশক সংখ্যাগুলো হচ্ছে পরিসংখ্যানের উপাত্ত। ধরা যাক, ৫০ নম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ২০ জন প্রার্থীর গণিতের প্রাপ্ত নম্বর হলো ২৫, ৪৫, ৪০, ২০, ৩৫, ৩০, ৩৫, ৩০, ৪০, ৪১, ৪৬, ২০, ২৫, ৩০, ৪৫, ৪২, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৩০। এখানে, গণিতে প্রাপ্ত সংখ্যা-নির্দেশিত নম্বরসমূহ একটি পরিসংখ্যান। আর নম্বরগুলোর প্রত্যেকটি পরিসংখ্যানের উপাত্ত। এ উপাত্তগুলো সহজে সরাসরি উৎস থেকে সংগ্রহ করা যায়। সরাসরি উৎস থেকে সংগৃহীত উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেশি। সরাসরি উৎস থেকে সংগৃহীত হয়, এমন উপাত্ত হলো প্রাথমিক উপাত্ত। মাধ্যমিক উপাত্ত পরোক্ষ উৎস থেকে সংগৃহীত হয় বিধায় এর নির্ভরযোগ্যতা অনেক কম। উপরে বর্ণিত উপাত্তের নম্বরগুলো এলোমেলোভাবে আছে। নম্বরগুলো মানের কোনো ক্রমে সাজানো নেই। এ ধরনের উপাত্ত হলো অবিন্যস্ত উপাত্ত। এ উপাত্তের নম্বরগুলো মানের যেকোনো ক্রমে সাজালে হবে বিন্যস্ত উপাত্ত। নম্বরগুলো মানের উর্ধ্বক্রমে সাজালে হয় ২০, ২০, ২৫, ২৫, ৩০, ৩০, ৩০, ৩০, ৩৫, ৩৫, ৪০, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৫, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫০ যা একটি বিন্যস্ত উপাত্ত। অবিন্যস্ত উপাত্ত এভাবে বিন্যস্ত করা বেশ জটিল এবং ভুল হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে অবিন্যস্ত উপাত্তসমূহ অতি সহজে বিন্যস্ত উপাত্তে রূপান্তর করা যায় এবং গণসংখ্যা নিবেশন সারণির সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়।

১১.২ গণসংখ্যা নিবেশন সারণি (Frequency Distribution Table)

উপাত্তের গণসংখ্যা সারণি তৈরি করতে যে কয়েকটি ধাপ ব্যবহার করতে হয় তা হলো :

(১) পরিসর নির্ণয়, (২) শ্রেণিব্যাপ্তি নির্ণয়, (৩) শ্রেণিসংখ্যা নির্ণয়, (৪) ট্যালি চিহ্নের সাহায্যে গণসংখ্যা নির্ণয়।

অনুসন্ধানাধীন উপাত্তের পরিসর = (সর্বোচ্চ সংখ্যা – সর্বনিম্ন সংখ্যা) + ১

শ্রেণিব্যাপ্তি : অনুসন্ধানলব্ধ যেকোনো উপাত্তের পরিসর নির্ধারণের পর শ্রেণিব্যাপ্তি নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। উপাত্তগুলোকে সুবিধাজনক ব্যবধান নিয়ে কতকগুলো শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। উপাত্তের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এগুলো সাধারণত শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। শ্রেণিতে ভাগ করার নির্ধারিত কোনো নিয়ম নেই। তবে সচরাচর প্রত্যেক শ্রেণিব্যবধান সর্বনিম্ন ৫ ও সর্বোচ্চ ১৫-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। সুতরাং প্রত্যেক শ্রেণির একটি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান থাকে। যেকোনো শ্রেণির সর্বনিম্ন মানকে এর নিম্নসীমা এবং সর্বোচ্চ মানকে এর উর্ধ্বসীমা বলা হয়। আর যেকোনো শ্রেণির উর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমার ব্যবধান হলো সেই শ্রেণির শ্রেণিব্যাপ্তি। উদাহরণস্বরূপ, মনে করি, ১০-২০ হলো একটি শ্রেণি, এর সর্বনিম্ন মান ১০ ও সর্বোচ্চ মান ২০ এবং শ্রেণিব্যাপ্তি হবে $(২০-১০) + ১ = ১১$ । শ্রেণি ব্যাপ্তি সবসময় সমান রাখা শ্রেয়।

শ্রেণিসংখ্যা : শ্রেণিসংখ্যা হচ্ছে পরিসরকে যতগুলো শ্রেণিতে ভাগ করা হয় এর সংখ্যা।

অতএব, শ্রেণিসংখ্যা = $\frac{\text{পরিসর}}{\text{শ্রেণিব্যাপ্তি}}$ (দশমিকের ক্ষেত্রে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তরিত)।

ট্যালি চিহ্ন : উপাত্তের সংখ্যাসূচক তথ্যরাশির মান কোনো না কোনো শ্রেণিতে পড়ে। শ্রেণির বিপরীতে সাংখ্যিক মানের জন্য ট্যালি চিহ্ন দিতে হয়। কোনো শ্রেণিতে পাঁচটি ট্যালি চিহ্ন দিতে হলে চারটি দেওয়ার পর পঞ্চমটি আড়াআড়িভাবে দিতে হয়, যেমন- ‘/|||’।

গণসংখ্যা : শ্রেণিসমূহের মধ্যে সংখ্যাসূচক তথ্যরাশির মানগুলো ট্যালি চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং এর মাধ্যমে গণসংখ্যা বা ঘটনসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। যে শ্রেণিতে যতগুলো ট্যালি চিহ্ন পড়বে তার সাংখ্যিক মান হবে ঐ শ্রেণির গণসংখ্যা বা ঘটনসংখ্যা, যা ট্যালি চিহ্নের বিপরীতে গণসংখ্যা কলামে লেখা হয়।

উপরে বর্ণিত বিবেচনাধীন উপাত্তের পরিসর, শ্রেণিব্যাপ্তি ও শ্রেণিসংখ্যা নিচে দেওয়া হলো :

$$\begin{aligned}\text{পরিসর} &= (\text{উপাত্তের সর্বোচ্চ সাংখ্যিক মান} - \text{সর্বনিম্ন সাংখ্যিক মান}) + ১ \\ &= (৫০ - ২০) + ১ = ৩১।\end{aligned}$$

শ্রেণিব্যাপ্তি/শ্রেণি ব্যবধান ধরা যায় ৫। তাহলে শ্রেণিসংখ্যা হবে $\frac{৩১}{৫} = ৬.২$ যা পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর করলে হবে ৭। অতএব শ্রেণিসংখ্যা ৭। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বর্ণিত উপাত্তের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি প্রস্তুত করা হলো :

শ্রেণিব্যাপ্তি	ট্যালি চিহ্ন	ঘটনসংখ্যা বা গণসংখ্যা
২০-২৪	//	২
২৫-২৯	//	২
৩০-৩৪	////	৪
৩৫-৩৯	//	২
৪০-৪৪	////	৪
৪৫-৪৯	////	৫
৫০-৫৪	/	১
মোট	২০	২০

কাজ :

তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে ২০ জনের দল গঠন করো এবং দলের সদস্যদের উচ্চতার গণসংখ্যা সারণি তৈরি করো।

১১.৩ লেখচিত্র (Diagram)

তথ্য ও উপাত্ত লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। কোনো পরিসংখ্যানে ব্যবহৃত উপাত্ত লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলে তা বোঝা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য খুব সুবিধাজনক হয়। অধিকন্তু চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত উপাত্ত চিত্তাকর্ষকও হয়। তাই বোঝা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উপাত্তসমূহের গণসংখ্যা নিবেশনের চিত্র লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। গণসংখ্যা নিবেশন উপস্থাপনে বিভিন্ন রকম লেখচিত্রের ব্যবহার থাকলেও এখানে কেবল আয়তলেখ ও পাইচিত্র নিয়ে আলোচনা করা হবে।


আয়তলেখ (Histogram) : গণসংখ্যা নিবেশনের একটি লেখচিত্র হচ্ছে আয়তলেখ। আয়তলেখ অঙ্কনের জন্য ছক কাগজে x ও y -অক্ষ আঁকা হয়। x -অক্ষ বরাবর শ্রেণিব্যাপ্তি এবং y -অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা নিয়ে আয়তলেখ আঁকা হয়। আয়তের ভূমি হয় শ্রেণিব্যাপ্তি এবং উচ্চতা হয় গণসংখ্যা।

উদাহরণ ১। নিচে ৫০ জন শিক্ষার্থীর উচ্চতার গণসংখ্যা নিবেশন দেওয়া হলো। একটি আয়তলেখ আঁকো।

উচ্চতার শ্রেণিব্যাপ্তি (সেমিতে)	১১৪-১২৪	১২৪-১৩৪	১৩৪-১৪৪	১৪৪-১৫৪	১৫৪-১৬৪	১৬৪-১৭৪
গণসংখ্যা (শিক্ষার্থীর সংখ্যা)	৩	৫	১০	২০	৮	৪

ছক কাগজের ১ ঘর সমান শ্রেণিব্যাপ্তির ২ একক ধরে x -অক্ষে শ্রেণিব্যাপ্তি এবং ছক কাগজের ১ ঘর সমান গণসংখ্যার ১ একক ধরে y -অক্ষে গণসংখ্যা নিবেশন স্থাপন করে গণসংখ্যা নিবেশনের আয়তলেখ আঁকা হলো। x -অক্ষের মূলবিন্দু থেকে ১১৪ ঘর পর্যন্ত ভাঙা চিহ্ন দিয়ে আগের ঘরগুলো বিদ্যমান বোঝানো হয়েছে।

ফর্মা-২১, গণিত-অষ্টম শ্রেণি



কাজ : (ক) ৩০ জন নিয়ে দল গঠন করো। দলের সদস্যদের গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করো।
(খ) গণসংখ্যা নিবেশনের আয়তলেখ আঁকো।

পাইচিত্র (Pie Chart): পাইচিত্রও একটি লেখচিত্র। অনেক সময় সংগৃহীত পরিসংখ্যান কয়েকটি উপাদানের সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয় অথবা একে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এ সকল ভাগকে একটি বৃত্তের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অংশে প্রকাশ করলে যে লেখচিত্র পাওয়া যায় তাই পাইচিত্র। পাইচিত্রকে বৃত্তলেখও বলা হয়। আমরা জানি, বৃত্তের কেন্দ্রে সৃষ্ট কোণের পরিমাণ 360° । কোনো পরিসংখ্যান 360° এর অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হলে তা হবে পাইচিত্র।

আমরা জানি, ক্রিকেটখেলায় ১, ২, ৩, ৪, ও ৬ করে রান সংগৃহীত হয়। তাছাড়া নো-বল ও ওয়াইড বলের জন্য অতিরিক্ত রান সংগৃহীত হয়। কোনো এক খেলায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সংগৃহীত রান নিচের সারণিতে দেওয়া হলো :

রান সংগ্রহ	১ করে	২ করে	৩ করে	৪ করে	৬ করে	অতিরিক্ত রান	মোট
বিভিন্ন প্রকারের সংগৃহীত রান	৬৬	৫০	৩৬	৪৮	৩০	১০	২৪০

ক্রিকেট খেলার উপাত্ত পাইচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলে, বোঝার জন্য যেমন সহজ হয় তেমনি চিত্তাকর্ষকও হয়। আমরা জানি, বৃত্তের কেন্দ্রে সৃষ্ট কোণ ৩৬০° । উপরে বর্ণিত উপাত্ত ৩৬০° -এর অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হলে, উপাত্তের পাইচিত্র পাওয়া যাবে।

$$২৪০ \text{ রানের জন্য কোণ} = ৩৬০^\circ$$

$$\therefore ১ \text{ " " " " } = \frac{৩৬০^\circ}{২৪০}$$

$$\therefore ৬৬ \text{ " " " " } = \frac{৬৬ \times ৩৬০^\circ}{২৪০} = ৯৯^\circ$$


$$৫০ \text{ রানের জন্য কোণ} = \frac{৫০}{২৪০} \times ৩৬০^\circ = ৭৫^\circ$$

$$৩৬ \text{ রানের জন্য কোণ} = \frac{৩৬}{২৪০} \times ৩৬০^\circ = ৫৪^\circ$$

$$৪৮ \text{ রানের জন্য কোণ} = \frac{৪৮}{২৪০} \times ৩৬০^\circ = ৭২^\circ$$

$$৩০ \text{ রানের জন্য কোণ} = \frac{৩০}{২৪০} \times ৩৬০^\circ = ৪৫^\circ$$

$$১০ \text{ রানের জন্য কোণ} = \frac{১০}{২৪০} \times ৩৬০^\circ = ১৫^\circ$$



এখন, প্রাপ্ত কোণগুলো ৩৬০° -এর অংশ হিসাবে আঁকা হলো যা বর্ণিত উপাত্তের পাইচিত্র।

উদাহরণ ২। কোনো এক বছরে দুর্ঘটনাজনিত কারণে সংঘটিত মৃত্যুর সারণি নিচে দেওয়া হলো। একটি পাইচিত্র আঁকো।


দুর্ঘটনা	বাস	ট্রাক	কার	নৌযান	মোট
মৃতের সংখ্যা	৪৫০	৩৫০	২৫০	১৫০	১২০০

$$\text{সমাধান : } \text{বাস দুর্ঘটনায় মৃত } ৪৫০ \text{ জনের জন্য কোণ} = \frac{৪৫০}{১২০০} \times ৩৬০^\circ = ১৩৫^\circ$$

$$\text{ট্রাক দুর্ঘটনায় মৃত } ৩৫০ \text{ জনের জন্য কোণ} = \frac{৩৫০}{১২০০} \times ৩৬০^\circ = ১০৫^\circ$$

$$\text{কার দুর্ঘটনায় মৃত } ২৫০ \text{ জনের জন্য কোণ} = \frac{২৫০}{১২০০} \times ৩৬০^\circ = ৭৫^\circ$$

$$\text{নৌযান দুর্ঘটনায় মৃত } ১৫০ \text{ জনের জন্য কোণ} = \frac{১৫০}{১২০০} \times ৩৬০^\circ = ৪৫^\circ$$



এখন, কোণগুলো ৩৬০° -এর অংশ হিসাবে আঁকা হলো, যা নির্ণেয় পাইচিত্র।

উদাহরণ ৩। দুর্ঘটনায় মৃত ৪৫০ জনের মধ্যে কতজন নারী তা পাইচিত্রে দেখানো হয়েছে।


নারীর জন্য নির্দেশিত কোণ ৮০° । নারীর সংখ্যা কত ?

সমাধান : আমরা জানি, বৃত্তের কেন্দ্রে সৃষ্ট কোণ ৩৬০° ।

সুতরাং ৩৬০° -এর জন্য ৪৫০ জন

$$\therefore 1^\circ \text{-এর জন্য } \frac{৪৫০}{৩৬০} \text{ জন}$$

$$\therefore ৮০^\circ \text{-এর জন্য } \frac{৪৫০}{৩৬০} \times ৮০ \text{ জন} = ১০০ \text{ জন}$$



$\therefore$ নির্ণেয় নারীর সংখ্যা ১০০ জন।

কাজ :

- ১। তোমাদের শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ৬ জন করে নিয়ে দল গঠন করো। দলের সদস্যরা নিজেদের উচ্চতা মাপ এবং প্রাপ্ত উপাত্ত পাইচিত্রের মাধ্যমে দেখাও।
- ২। তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলের বয়সের উপাত্ত নিয়ে পাইচিত্র আঁকো। প্রত্যেকের বয়সের নির্ধারিত কোণের জন্য কার বয়স কত তা নির্ণয়ের জন্য পাশের শিক্ষার্থীর সাথে খাতা বদল করো।

১১.৪ কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central Tendency)

ধরা যাক, কোনো একটি সমস্যা সমাধানে ২৫ জন ছাত্রীর যে সময় (সেকেন্ডে) লাগে তা হলো

২২, ১৬, ২০, ৩০, ২৫, ৩৬, ৩৫, ৩৭, ৪০, ৪৩, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৫, ৪৮, ৫০, ৬৪, ৫০, ৬০, ৫৫, ৬২, ৬০।

সংখ্যাগুলো মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজালে হয় :

১৬, ২০, ২২, ২৫, ৩০, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪০, ৪৩, ৪৩, ৪৩, ৪৪, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬০, ৬২, ৬৪। বর্ণিত উপাত্তসমূহ মাঝামাঝি মান ৪৩ বা ৪৪ এ পুঞ্জীভূত। গণসংখ্যা সারণিতে এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বর্ণিত উপাত্তের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করলে হয়

ব্যাপ্তি	১৬-২৫	২৬-৩৫	৩৬-৪৫	৪৬-৫৫	৫৬-৬৫
গণসংখ্যা	৪	২	১০	৫	৪

এই গণসংখ্যা নিবেশন সারণিতে দেখা যাচ্ছে ৩৬-৪৫ শ্রেণিতে গণসংখ্যা সর্বাধিক। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, উপাত্তসমূহ মাঝামাঝি বা কেন্দ্রের মানের দিকে পুঞ্জীভূত হয়। মাঝামাঝি বা কেন্দ্রের মানের দিকে উপাত্তসমূহের পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রবণতাকে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলা হয়। কেন্দ্রীয় মান উপাত্তসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংখ্যা যার দ্বারা কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ করা হয়। সাধারণভাবে, কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ হলো (১) গাণিতিক গড় বা গড় (২) মধ্যক (৩) প্রচুরক।

১১.৫ গাণিতিক গড় (Arithmetic Mean)

আমরা জানি, উপাত্তসমূহের সংখ্যাসূচক মানের সমষ্টিকে যদি উপাত্তসমূহের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়, তবে গাণিতিক গড় পাওয়া যায়। মনে করি, উপাত্তসমূহের সংখ্যা n এবং এদের সংখ্যাসূচক মান $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ।

যদি উপাত্তসমূহের গাণিতিক গড় মান $\bar{x}$ হয়, তবে $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ । এখানে,

Σ (সিগমা) একটি গ্রিক অক্ষর। যা দ্বারা উপাত্তের সংখ্যাসূচক মানসমূহের যোগফল বোঝানো হয়েছে।

উদাহরণ ৪। ৫০ নম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় কোনো শ্রেণির ২০ জন শিক্ষার্থীর গণিতের প্রাপ্ত নম্বর ৪০, ৪১, ৪৫, ১৮, ৪১, ২০, ৪৫, ৪১, ৪৫, ২৫, ২০, ৪০, ১৮, ২০, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৪৮, ৪৯, ১৯। প্রাপ্ত নম্বরের গাণিতিক গড় নির্ণয় করো।

সমাধান : এখানে $n = ২০, x_1 = ৪০, x_2 = ৪১, x_3 = ৪৫, \dots$ ইত্যাদি

গাণিতিক গড় যদি $\bar{x}$ হয়, তবে $\bar{x} = \frac{\text{নম্বরগুলোর সমষ্টি}}{\text{নম্বরগুলোর সংখ্যা}}$

$$\therefore \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{৪০ + ৪১ + ৪৫ + \dots + ১৯}{২০} = \frac{৭১৫}{২০} = ৩৫.৭৫$$

$\therefore$ গাণিতিক গড় ৩৫.৭৫

অবিন্যস্ত উপাত্তের গাণিতিক গড় নির্ণয় (সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি) :

উপাত্তের সংখ্যা যদি বেশি হয় তবে আগের পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করা বেশ জটিল হয় এবং বেশিসংখ্যক উপাত্তের সংখ্যাসূচক মানের সমষ্টি নির্ণয় করতে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা বেশ সুবিধাজনক।

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে উপাত্তসমূহের কেন্দ্রীয় প্রবণতা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে এদের সম্ভাব্য গড় অনুমান করা হয়। উপরের উদাহরণে প্রদত্ত উপাত্তের কেন্দ্রীয় প্রবণতা ভালোভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, গাণিতিক গড় ৩০ থেকে ৪৬ এর মধ্যে একটি সংখ্যা। মনে করি, গাণিতিক গড় ৩০। এখন প্রত্যেক সংখ্যা থেকে অনুমিত গড় ৩০ বিয়োগ করে বিয়োগফল নির্ণয় করতে হবে। সংখ্যাটি ৩০ থেকে বড় হলে বিয়োগফল ধনাত্মক এবং ছোট হলে বিয়োগফল ঋণাত্মক হবে। এরপরে সকল বিয়োগফলের বীজগাণিতিক সমষ্টি নির্ণয় করতে হয়। পরপর দুইটি বিয়োগফল যোগ করে ক্রমযোজিত সমষ্টি নির্ণয়ের মাধ্যমে সকল বিয়োগফলের সমষ্টি অতি সহজে নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ, বিয়োগফলের যোগফল ক্রমযোজিত যোগফলের সমান হবে। উপরের উদাহরণে ব্যবহৃত উপাত্তের গাণিতিক গড় কীভাবে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করা হয় তা নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো। মনে করি, উপাত্তসমূহ x_i ($i=1, 2, \dots, n$) এর অনুমিত গড় a ($= ৩০$)।

পাশে উপস্থাপিত সারণি থেকে,
ক্রমযোজিত যোগফল = ১১৫
এবং মোট উপাত্ত সংখ্যা=২০

$$\therefore \text{ক্রমযোজিত যোগফলের গড়} = \frac{১১৫}{২০} = ৫.৭৫$$

সুতরাং প্রকৃত গড়

$$\begin{aligned} &= \text{অনুমিত গড়} + \text{ক্রমযোজিত যোগফলের গড়} \\ &= ৩০ + ৫.৭৫ = ৩৫.৭৫ \end{aligned}$$

মন্তব্য : সুবিধার্থে এবং সময় সাশ্রয়ের জন্য কলামের মধ্যকার যোগ-বিয়োগ মনে মনে করে সরাসরি ফলাফল লেখা যায়।

কাজ : তোমরা উপরের উপাত্তের আলোকে অনুমিত গড় ৩৫ ধরে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গাণিতিক গড় নির্ণয় করো।

উপাত্ত x_i	$x_i - a$	ক্রমযোজিত যোগফল
৪০	$৪০ - ৩০ = ১০$	১০
৪১	$৪১ - ৩০ = ১১$	$১০ + ১১ = ২১$
৪৫	$৪৫ - ৩০ = ১৫$	$২১ + ১৫ = ৩৬$
১৮	$১৮ - ৩০ = -১২$	$৩৬ - ১২ = ২৪$
৪১	$৪১ - ৩০ = ১১$	$২৪ + ১১ = ৩৫$
২০	$২০ - ৩০ = -১০$	$৩৫ - ১০ = ২৫$
৪৫	$৪৫ - ৩০ = ১৫$	$২৫ + ১৫ = ৪০$
৪১	$৪১ - ৩০ = ১১$	$৪০ + ১১ = ৫১$
৪৫	$৪৫ - ৩০ = ১৫$	$৫১ + ১৫ = ৬৬$
২৫	$২৫ - ৩০ = -৫$	$৬৬ - ৫ = ৬১$
২০	$২০ - ৩০ = -১০$	$৬১ - ১০ = ৫১$
৪০	$৪০ - ৩০ = ১০$	$৫১ + ১০ = ৬১$
১৮	$১৮ - ৩০ = -১২$	$৬১ - ১২ = ৪৯$
২০	$২০ - ৩০ = -১০$	$৪৯ - ১০ = ৩৯$
৪৫	$৪৫ - ৩০ = ১৫$	$৩৯ + ১৫ = ৫৪$
৪৭	$৪৭ - ৩০ = ১৭$	$৫৪ + ১৭ = ৭১$
৪৮	$৪৮ - ৩০ = ১৮$	$৭১ + ১৮ = ৮৯$
৪৮	$৪৮ - ৩০ = ১৮$	$৮৯ + ১৮ = ১০৭$
৪৯	$৪৯ - ৩০ = ১৯$	$১০৭ + ১৯ = ১২৬$
১৯	$১৯ - ৩০ = -১১$	$১২৬ - ১১ = ১১৫$

বিন্যস্ত উপাত্তের গাণিতিক গড়

উদাহরণ ৪-এর ২০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে একই নম্বর একাধিক শিক্ষার্থী পেয়েছে।

প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি পাশে দেওয়া হলো :

প্রাপ্ত নম্বর x_i $i = 1, \dots, k$	গণসংখ্যা f_i $i = 1, \dots, k$	$f_i x_i$
১৮	২	৩৬
১৯	১	১৯
২০	৩	৬০
২৫	১	২৫
৪০	২	৮০
৪১	৩	১২৩
৪৫	৪	১৮০
৪৭	১	৪৭
৪৮	২	৯৬
৪৯	১	৪৯
$k=১০$	$k = ১০, n = ২০$	মোট = ৭১৫

$$\text{প্রাপ্ত নম্বরের গড়} = \frac{f_i x_i \text{ এর সমষ্টি}}{\text{মোট গণসংখ্যা}} = \frac{৭১৫}{২০} = ৩৫.৭৫$$

সূত্র ১। গাণিতিক গড় (বিন্যস্ত উপাত্ত) : যদি n সংখ্যক উপাত্তের k সংখ্যক মান $x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$

এর গণসংখ্যা যথাক্রমে $f_1, f_2, \dots, f_k$ হয়, তবে উপাত্তের গাণিতিক গড় $= \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k f_i x_i}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k f_i x_i$ যেখানে n হলো মোট গণসংখ্যা।

উদাহরণ ৫। নিচে কোনো একটি শ্রেণির ১০০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো। প্রাপ্ত নম্বরের গাণিতিক গড় নির্ণয় করো।

শ্রেণিব্যাপ্তি	২৫-৩৪	৩৫-৪৪	৪৫-৫৪	৫৫-৬৪	৬৫-৭৪	৭৫-৮৪	৮৫-৯৪
গণসংখ্যা	৫	১০	১৫	২০	৩০	১৬	৪

সমাধান : এখানে শ্রেণিব্যাপ্তি দেওয়া আছে বিধায় শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত নম্বর কত তা জানা যায় না। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রেণির শ্রেণি মধ্যমান নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়।

$$\text{শ্রেণি মধ্যমান} = \frac{\text{শ্রেণির উর্ধ্বমান} + \text{শ্রেণির নিম্নমান}}{২}$$

যদি শ্রেণি মধ্যমান $x_i (i = ১, \dots, k)$ হয় তবে মধ্যমান সংবলিত সারণি হবে নিম্নরূপ :

শ্রেণি ব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যমান (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	($f_i x_i$)
২৫ – ৩৪	২৯.৫	৫	১৪৭.৫
৩৫ – ৪৪	৩৯.৫	১০	৩৯৫.০
৪৫ – ৫৪	৪৯.৫	১৫	৭৪২.৫
৫৫ – ৬৪	৫৯.৫	২০	১১৯০.০
৬৫ – ৭৪	৬৯.৫	৩০	২০৮৫.০
৭৫ – ৮৪	৭৯.৫	১৬	১২৭২.০
৮৫ – ৯৪	৮৯.৫	৪	৩৫৮.০
	মোট	১০০	৬১৯০.০০

$$\begin{aligned} \text{নির্ণেয় গাণিতিক গড়} &= \frac{১}{n} \sum_{i=১}^k f_i x_i = \frac{১}{১০০} \times ৬১৯০ \\ &= ৬১.৯ \end{aligned}$$

১১.৬ মধ্যক (Median)

আমরা ৭ম শ্রেণিতে পরিসংখ্যানে অনুসন্ধানাধীন উপাত্তসমূহের মধ্যক সম্বন্ধে জেনেছি।

ধরা যাক, ৫, ৩, ৪, ৮, ৬, ৭, ৯, ১১, ১০ কতকগুলো সংখ্যা। এ সংখ্যাগুলোকে মানের ক্রমানুসারে সাজালে হয়, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১। ক্রমবিন্যস্ত সংখ্যাগুলোকে সমান দুই ভাগ করলে হয়

$$\boxed{৩, ৪, ৫, ৬, ৭} \quad \boxed{৮, ৯, ১০, ১১}$$

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ৭ সংখ্যাগুলোকে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে এবং এর অবস্থান মাঝে। সুতরাং এখানে মধ্যপদ হলো ৫ম পদ। এই ৫ম পদ বা মধ্যপদের মান ৭। অতএব, সংখ্যাগুলোর মধ্যক হলো ৭। এখানে প্রদত্ত উপাত্তগুলো বা সংখ্যাগুলো বিজোড় সংখ্যক। আর যদি সংখ্যাগুলো জোড় সংখ্যক হয়, যেমন ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২১, ২২ তবে এর মধ্যক কী হবে? সংখ্যাগুলোকে সমান দুই ভাগ করলে হবে

৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ১৬, ১৮, ১৯, ২১, ২২

দেখা যাচ্ছে যে, ১৩ ও ১৫ সংখ্যাগুলোকে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে এবং এদের অবস্থান মাঝামাঝি। এখানে মধ্যপদ ৬ষ্ঠ ও ৭ম পদ। সুতরাং মধ্যক হবে ৬ষ্ঠ ও ৭ম পদের সংখ্যা দুইটির গড় মান। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পদের সংখ্যার গড় মান $\frac{১৩+১৫}{২}$ বা ১৪। অর্থাৎ, এখানে মধ্যক ১৪।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, যদি n সংখ্যক উপাত্ত থাকে এবং n যদি বিজোড় সংখ্যা হয় তবে উপাত্তগুলোর মধ্যক হবে $\frac{n+১}{২}$ তম পদের মান। আর n যদি জোড় সংখ্যা হয় তবে মধ্যক হবে $\frac{n}{২}$ তম ও $\left(\frac{n}{২} + ১\right)$ তম পদ দুইটির সাংখ্যিক মানের গড়।

উপাত্তগুলোকে মানের ক্রমানুসারে সাজালে যে মান উপাত্তগুলোকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে সেই মানই হবে উপাত্তগুলোর মধ্যক। সমান দুই ভাগের মাঝখানে দুইটি উপাত্ত থাকলে তাদের গড়ই হবে মধ্যক।

উদাহরণ ৬। নিচের সংখ্যাগুলোর মধ্যক নির্ণয় কর : ২৩, ১১, ২৫, ১৫, ২১, ১২, ১৭, ১৮, ২২, ২৭, ২৯, ৩০, ১৬, ১৯।

সমাধান : সংখ্যাগুলোকে মানের ক্রমানুসারে ঊর্ধ্বক্রমে সাজানো হলো-

১১, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯, ৩০

এখানে $n = ১৪$, যা জোড় সংখ্যা।

$$\therefore \text{মধ্যক} = \frac{\frac{১৪}{২} \text{ তম ও } \left(\frac{১৪}{২} + ১\right) \text{ তম পদ দুইটির মানের যোগফল}}{২}$$

$$= \frac{৭ম পদ ও ৮ম পদ দুইটির মানের যোগফল}{২}$$

$$\therefore \text{মধ্যক} = \frac{১৯ + ২১}{২} = \frac{৪০}{২} = ২০$$

অতএব, মধ্যক ২০।

কাজ : ১। তোমাদের শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের থেকে ১৯ জন, ২০ জন ও ২১ জন নিয়ে ৩টি দল গঠন করো। প্রত্যেক দল তার সদস্যদের রোল নম্বরগুলো নিয়ে দলের মধ্যক নির্ণয় করো।

উদাহরণ ৭। নিচে ৫০ জন ছাত্রীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো। মধ্যক নির্ণয় করো।

প্রাপ্ত নম্বর	৪৫	৫০	৬০	৬৫	৭০	৭৫	৮০	৯০	৯৫	১০০
গণসংখ্যা	৩	২	৫	৪	১০	১৫	৫	৩	২	১

ফর্ম-২২, গণিত-অষ্টম শ্রেণি

সমাধান : মধ্যক নির্ণয়ের গণসংখ্যা সারণি

প্রাপ্ত নম্বর	গণসংখ্যা	যোজিত গণসংখ্যা
৪৫	৩	৩
৫০	২	৫
৬০	৫	১০
৬৫	৪	১৪
৭০	১০	২৪
৭৫	১৫	৩৯
৮০	৫	৪৪
৯০	৩	৪৭
৯৫	২	৪৯
১০০	১	৫০

এখানে, $n = ৫০$, যা জোড় সংখ্যা

$$\begin{aligned} \therefore \text{মধ্যক} &= \frac{\frac{৫০}{২} \text{ তম ও } \left(\frac{৫০}{২} + ১\right) \text{ তম পদ দুইটির সাংখ্যিক মানের যোগফল}}{২} \\ &= \frac{২৫ \text{ ও } ২৬ \text{ তম পদ দুইটির সাংখ্যিক মানের যোগফল}}{২} \\ &= \frac{৭৫ + ৭৫}{২} \text{ বা } ৭৫। \end{aligned}$$

$\therefore$ ছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যক ৭৫।

লক্ষ করি : এখানে ২৫তম থেকে ৩৯ তম প্রত্যেকটি পদের মান ৭৫।

কাজ : তোমাদের শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে ২টি দল গঠন করো। একটি সমস্যা সমাধানে প্রত্যেকের কত সময় লাগে (ক) তার গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করো, (খ) সারণি হতে মধ্যক নির্ণয় করো।

১১.৭ প্রচুরক (Mode)

মনে করি, ১১, ৯, ১০, ১২, ১১, ১২, ১৪, ১১, ১০, ২০, ২১, ১১, ৯ ও ১৮ একটি উপাত্ত। উপাত্তটি মানের উর্ধ্বক্রমে সাজালে হয়—

৯, ৯, ১০, ১০, ১১, ১১, ১১, ১১, ১২, ১২, ১৪, ১৮, ২০, ২১।

বিন্যাসকৃত উপাত্তটি লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, ১১ সংখ্যাটি ৪ বার উপস্থাপিত হয়েছে যা উপস্থাপনায় সর্বাধিক বার। যেহেতু উপাত্তে ১১ সংখ্যাটি সবচেয়ে বেশিবার আছে, সেহেতু এখানে ১১ হলো উপাত্তগুলোর প্রচুরক :

কোনো উপাত্তে যে সংখ্যাটি সবচেয়ে বেশিবার থাকে তাকে প্রচুরক বলে।

উদাহরণ ৮। নিচে ৩০ জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো। উপাত্তগুলোর প্রচুরক নির্ণয় করো।

৭৫, ৩৫, ৪০, ৮০, ৬৫, ৮০, ৮০, ৯০, ৯৫, ৮০, ৬৫, ৬০, ৭৫, ৮০, ৪০, ৬৭, ৭০, ৭২, ৬৯, ৭৮, ৮০, ৮০, ৬৫, ৭৫, ৭৫, ৮৮, ৯৩, ৮০, ৭৫, ৬৫।

সমাধান : উপাত্তগুলোকে মানের উর্ধ্বক্রমে সাজানো হলো : ৩৫, ৪০, ৪০, ৬০, ৬৫, ৬৫, ৬৫, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৫, ৭৫, ৭৫, ৭৫, ৭৫, ৭৮, ৮০, ৮০, ৮০, ৮০, ৮০, ৮০, ৮০, ৮০, ৮০, ৮৮, ৯০, ৯৩, ৯৫।

উপাত্তগুলোর উপস্থাপনায় ৪০ আছে ২ বার, ৬৫ আছে ৪ বার, ৭৫ আছে ৫ বার, ৮০ আছে ৮ বার এবং বাকি নম্বরগুলো ১ বার করে আছে। এখানে ৮০ আছে সর্বাধিক ৮ বার। সুতরাং উপাত্তগুলোর প্রচুরক ৮০।

নির্ণেয় প্রচুরক ৮০।

উদাহরণ ৯। নিচের উপাত্তসমূহের প্রচুরক নির্ণয় করো :

৪, ৬, ৯, ২০, ১০, ৮, ১৮, ১৯, ২১, ২৪, ২৩, ৩০।

সমাধান : উপাত্তসমূহকে মানের উর্ধ্বক্রমে সাজানো হলো :

৪, ৬, ৮, ৯, ১০, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ৩০।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোনো সংখ্যাই একাধিকবার ব্যবহৃত হয়নি। তাই উপাত্তগুলোর প্রচুরক নেই।

অনুশীলনী ১১

১। ২৫ জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর নিচে দেওয়া হলো :

৭২, ৮৫, ৭৮, ৮৪, ৭৮, ৭৫, ৬৯, ৬৭, ৮৮, ৮০, ৭৪, ৭৭, ৭৯, ৬৯, ৭৪, ৭৩, ৮৩, ৬৫, ৭৫, ৬৯, ৬৩, ৭৫, ৮৬, ৬৬, ৭১।

(ক) প্রাপ্ত নম্বরের সরাসরি গড় নির্ণয় করো।

(খ) শ্রেণিব্যাপ্তি ৫ নিয়ে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করো এবং সারণি থেকে গড় নির্ণয় করো।

(গ) সরাসরিভাবে প্রাপ্ত গড়ের সাথে ‘খ’ থেকে প্রাপ্ত গড়ের পার্থক্য দেখাও।

২। নিচে একটি সারণি দেওয়া হলো। এর গড় মান নির্ণয় করো। উপাত্তগুলোর আয়তলেখ আঁকো :

প্রাপ্ত নম্বর	৬-১০	১১-১৫	১৬-২০	২১-২৫	২৬-৩০	৩১-৩৫	৩৬-৪০	৪১-৪৫
গণসংখ্যা	৫	১৭	৩০	৩৮	৩৫	১০	৭	৩

৩। নিচের সারণি থেকে গড় নির্ণয় করো :

দৈনিক আয় (টাকায়)	২২১০	২২১৫	২২২০	২২২৫	২২৩০	২২৩৫	২২৪০	২২৪৫	২২৫০
গণসংখ্যা	২	৩	৫	৭	৬	৫	৫	৪	৩

৪। নিচে ৪০ জন গ্রহীণীর সাপ্তাহিক সঞ্চয় (টাকায়) নিচে দেওয়া হলো :

১৫৫, ১৭৩, ১৬৬, ১৪৩, ১৬৮, ১৬০, ১৫৬, ১৪৬, ১৬২, ১৫৮, ১৫৯, ১৪৮, ১৫০, ১৪৭, ১৩২, ১৩৬, ১৫৬, ১৪০, ১৫৫, ১৪৫, ১৩৫, ১৫১, ১৪১, ১৬৯, ১৪০, ১২৫, ১২২, ১৪০, ১৩৭, ১৭৫, ১৪৫, ১৫০, ১৬৪, ১৪২, ১৫৬, ১৫২, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৭ ও ১৬৭।

সাপ্তাহিক জমানোর গড়, মধ্যক ও প্রচুরক নির্ণয় করো।

৫। নিচের উপাত্তসমূহের গড় এবং উপাত্তের আয়তলেখ আঁকো :

বয়স (বছর)	৫-৬	৭-৮	৯-১০	১১-১২	১৩-১৪	১৫-১৬	১৭-১৮
গণসংখ্যা	২৫	২৭	২৮	৩১	২৯	২৮	২২

৬। একটি কারখানার ১০০ শ্রমিকের মাসিক মজুরির গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো। শ্রমিকদের মাসিক মজুরির গড় কত? উপাত্তগুলোর আয়তলেখ আঁকো :

মাসিক মজুরি (শত টাকায়)	৫১-৫৫	৫৬-৬০	৬১-৬৫	৬৬-৭০	৭১-৭৫	৭৬-৮০	৮১-৮৫	৮৬-৯০
গণসংখ্যা	৬	২০	৩০	১৫	১১	৮	৬	৪

৭। ৮ম শ্রেণির ৩০ জন শিক্ষার্থীর ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর হলো :

৪৫, ৪২, ৬০, ৬১, ৫৮, ৫৩, ৪৮, ৫২, ৫১, ৪৯, ৭৩, ৫২, ৫৭, ৭১, ৬৪, ৪৯, ৫৬, ৪৮, ৬৭, ৬৩, ৭০, ৫৯, ৫৪, ৪৬, ৪৩, ৫৬, ৫৯, ৪৩, ৬৮, ৫২।

(ক) শ্রেণিব্যবধান ৫ ধরে শ্রেণিসংখ্যা কত?

(খ) শ্রেণিব্যবধান ৫ ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করো।

(গ) সারণি থেকে গড় নির্ণয় করো।

৮। ৫০ জন শিক্ষার্থীর দৈনিক সঞ্চয় নিচে দেওয়া হলো :

সঞ্চয় (টাকায়)	৪১-৫০	৫১-৬০	৬১-৭০	৭১-৮০	৮১-৯০	৯১-১০০
গণসংখ্যা	৬	৮	১৩	১০	৮	৫

(ক) ক্রমযোজিত গণসংখ্যার সারণি তৈরি করো।

(খ) সারণি থেকে গড় নির্ণয় করো।

৯। নিচের সারণিতে ২০০ জন শিক্ষার্থীর পছন্দের ফল দেখানো হলো। প্রদত্ত উপাত্তের পাইচিত্র আঁকো।

ফল	আম	কাঁঠাল	লিচু	জামরুল
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৭০	৩০	৮০	২০

১০। ৭২০ জন শিক্ষার্থীর পছন্দের বিষয় পাইচিত্রে উপস্থাপন করা হলো। উপাত্তগুলো সংখ্যায় প্রকাশ করো।



১১। ৫০ জন ছাত্রীর গণিতের নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

প্রাপ্ত নম্বর	৬০	৬৫	৭০	৭৫	৮০	৮৫
গণসংখ্যা	৫	৮	১১	১৫	৮	৩

ক. মধ্যক নির্ণয় করো।

খ. গড় নির্ণয় করো।

গ. প্রদত্ত উপাত্তের পাইচিত্র আঁকো।

১২। নিচে ৪০ জন গৃহিণীর সাপ্তাহিক সঞ্চয় (টাকায়) নিচে দেওয়া হলো:

১৫৫, ১৭৩, ১৬৬, ১৪৩, ১৬৮, ১৬০, ১৫৬, ১৪৬, ১৬২, ১৫৮, ১৫৯, ১৪৮, ১৫০, ১৪৭, ১৩২, ১৩৬, ১৫৪, ১৪০, ১৫৫, ১৪৫, ১৩৫, ১৫১, ১৪১, ১৬৯, ১৪০, ১২৫, ১২২, ১৪০, ১৩৭, ১৭৫, ১৪৫, ১৫০, ১৪২, ১৬৪, ১৫৬, ১৫২, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৭ ও ১৬৭।

ক. উপাত্তগুলো মানের উর্ধ্বক্রমে সাজাও।

খ. মধ্যক ও প্রচুরক নির্ণয় করো।

গ. শ্রেণি ব্যবধান ৫ ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করে গড় নির্ণয় করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ৮, ১২, ১৬, ১৭, ২০ সংখ্যাগুলোর গড় কত ?

(ক) ১০.৫

(খ) ১২.৫

(গ) ১৩.৬

(ঘ) ১৪.৬

২। ১০, ১২, ১৪, ১৮, ১৯, ২৫ সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত ?

(ক) ১১.৫

(খ) ১৪.৬

(গ) ১৬

(ঘ) ১৮.৬

৩। ৬, ১২, ৭, ১২, ১১, ১২, ১১, ৭, ১১ এর প্রচুরক কোনটি ?

(ক) ১১ ও ৭ (খ) ১১ ও ১২ (গ) ৭ ও ১২ (ঘ) ৬ ও ৭

◆ নিচে তোমাদের শ্রেণির ৪০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

শ্রেণিব্যাপ্তি	৪১ – ৫৫	৫৬ – ৭০	৭১ – ৮৫	৮৬ – ১০০
গণসংখ্যা	৬	১০	২০	৪

এই সারণির আলোকে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

৪। উপাত্তগুলোর শ্রেণিব্যাপ্তি কোনটি ?

(ক) ৫ (খ) ১০ (গ) ১২ (ঘ) ১৫

৫। দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যমান কোনটি ?

(ক) ৪৮ (খ) ৬৩ (গ) ৭৮ (ঘ) ৯৩

সৃজনশীল প্রশ্ন

৬। নিচের একটি সারণি দেওয়া হলো—

শ্রেণিব্যাপ্তি	২০-২৯	৩০-৩৯	৪০-৪৯	৫০-৫৯	৬০-৬৯
গণসংখ্যা	১০	৬	১৮	১২	৮

ক. ৭, ৫, ৪, ৯, ৩, ৮ উপাত্তগুলোর মধ্যক নির্ণয় করো।

খ. প্রদত্ত সারণি থেকে গড় নির্ণয় করো।

গ. উপাত্তগুলোর আয়তলেখ আঁকো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৭। ক) ১২০ জন ছাত্রের মধ্যে ২০ জন ছাত্রের জন্য পাই চিত্রে নির্ধারিত কোণ নির্ণয় করো।

খ) ১৬, ১৪, ৪, ৩, ৬, ৫, ৯, ১৩, ২, ৮ সংখ্যাগুলোর গড় নির্ণয় করো।

গ) ১১, ১৭, ১২, ৩, ৪, ৯, ৬, ১৬ উপাত্তগুলোর মধ্যক নির্ণয় করো।

ঘ) ৪, ৩, ৩, ১১, ১২, ১৩, ১১, ১৫, ১৭ উপাত্তগুলোর প্রচুরক নির্ণয় করো।

ঙ) কতগুলো উপাত্তের সর্বনিম্ন মান ২৫, সর্বোচ্চ মান ৭৪ এবং শ্রেণিব্যাপ্তি ৫ হলে শ্রেণিসংখ্যা নির্ণয় করো।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ২.১

১। ৪০০ টাকা	২। ২৬৫০ টাকা	৩। লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না	
৪। ১০৫০ টাকা	৫। ১৮০ টাকা	৬। ৯%	৭। ১২.৫%
৮। ৭৫০০ টাকা	৯। ১৪০০০ টাকা	১০। ১২৩০ টাকা	১১। ৯৬০ টাকা
১২। ১৬০০ টাকা	১৩। আসল ১২০০ টাকা, মুনাফা ১০.৫%		১৪। ৯.২%
১৫। ১১%	১৬। ১২ বছর	১৭। আসল ৪০০০ টাকা, ৫ বছর	১৮। ৩০,০০০ টাকা

অনুশীলনী ২.২

১। ঘ	২। ১০৬৪৮ টাকা	৩। ১৫৫ টাকা	৪। ৬২৫০ টাকা	৫। ১১৭৭২.২৫ টাকা,
১৭৭২.২৫ টাকা	৬। ৬৭,২৪,০০০ জন	৭। ১৬৭২ টাকা		

অনুশীলনী ৩

৩। ৬৩৬ বর্গমিটার	৪। ৪০২.৩৪ মিটার (প্রায়)	৫। ৬০ মিটার	৬। ১৮৬ বর্গমিটার
৭। ৫২০.৮ বর্গমিটার	৮। ৪৮৬৪ বর্গমিটার	৯। ২৪ মিটার	১০। ৩ মিটার
১১। ২৪০৮.৬৪ গ্রাম			
১২। ৬৭৩.৫৪৭ ঘন সে. মি.	১৩। ৪৪০০০ লিটার, ৪৪০০০ কিলোগ্রাম	১৪। ৭৫০ টাকা	১৫। ৩৭.৫
মিটার	১৬। ৭৬৫৬ টাকা	১৭। ৫৬৯.৫০ টাকা	১৮। ৫২টি, ১০,৪০০ টাকা
১৯। ৪৫০ ঘন সে. মি.			
২০। ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট	২১। ৯৭.৯২ সে. মি.		

অনুশীলনী ৪.১

- ১। (ক) $25a^2 + 70ab + 49b^2$ (খ) $36x^2 + 36x + 9$ (গ) $49p^2 - 28pq + 4q^2$
- (ঘ) $a^2x^2 - 2abxy + b^2y^2$ (ঙ) $x^6 + 2x^4y + x^2y^2$ (চ) $121a^2 - 264ab + 144b^2$
- (ছ) $36x^4y^2 - 60x^3y^3 + 25x^2y^4$ (জ) $x^2 + 2xy + y^2$ (ঝ) $x^2y^2z^2 + 2abcxyz + a^2b^2c^2$
- (ঞ) $a^4x^6 - 2a^2b^2x^3y^4 + b^4y^8$ (ট) 11664 (ঠ) 367236 (ড) 356409
- (ঢ) $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ca$ (ণ) $a^2x^2 + b^2 + 2abx + 4b + 4ax + 4$
- (ত) $x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 + 2xy^2z - 2xyz^2 - 2x^2yz$
- (থ) $9p^2 + 4q^2 + 25r^2 + 12pq - 20qr - 30pr$
- (দ) $x^4 + y^4 + z^4 - 2x^2y^2 + 2y^2z^2 - 2z^2x^2$
- (ধ) $49a^4 + 64b^4 + 25c^4 + 112a^2b^2 - 80b^2c^2 - 70c^2a^2$
- ২। (ক) $4x^2$ (খ) $9a^2$ (গ) $36x^4$ (ঘ) $9x^2$ (ঙ) 16
- ৩। (ক) $x^2 - 49$ (খ) $25x^2 - 169$ (গ) $x^2y^2 - y^2z^2$
- (ঘ) $a^2x^2 - b^2$ (ঙ) $a^2 + 7a + 12$ (চ) $a^2x^2 + 7ax + 12$
- (ছ) $36x^2 + 24x - 221$ (জ) $a^8 - b^8$ (ঝ) $a^2x^2 - b^2y^2 - c^2z^2 + 2bcyz$
- (ঞ) $9a^2 - 45a + 50$ (ট) $25a^2 + 4b^2 - 9c^2 + 20ab$
- (ঠ) $a^2x^2 + b^2y^2 + 8ax + 8by + 2abxy + 15$
- ৪। 576 ৫। 11 ৬। 194 ৭। 168100 ১১। 36, 90 ১২। 178, 40
- ১৩। (ক) $(3p + 2q)^2 - (2p - 5q)^2$ (খ) $(8b - a)^2 - (b + 7a)^2$
- (গ) $(5x)^2 - (2x - 5y)^2$ (ঘ) $(5x)^2 - (13)^2$

অনুশীলনী ৪.২

১। (ক) $27x^3 + 27x^2y + 9xy^2 + y^3$

(খ) $x^6 + 3x^4y + 3x^2y^2 + y^3$

(গ) $125p^3 + 150p^2q + 60pq^2 + 8q^3$

(ঘ) $a^6b^3 + 3a^4b^2c^2d + 3a^2bc^4d^2 + c^6d^3$

(ঙ) $216p^3 - 756p^2 + 882p - 343$

(চ) $a^3x^3 - 3a^2x^2by + 3axb^2y^2 - b^3y^3$

(ছ) $8p^6 - 36p^4r^2 + 54p^2r^4 - 27r^6$

(জ) $x^9 + 6x^6 + 12x^3 + 8$

(ঝ) $8m^3 + 27n^3 + 125p^3 + 36m^2n - 60m^2p + 54mn^2 + 150mp^2 - 135n^2p + 225p^2n - 180mnp$

(ঞ) $x^6 - y^6 + z^6 - 3x^4y^2 + 3x^2y^4 + 3x^4z^2 + 3y^4z^2 + 3x^2z^4 - 3y^2z^4 - 6x^2y^2z^2$

(ট) $a^6b^6 - 3a^4b^4c^2d^2 + 3a^2b^2c^4d^4 - c^6d^6$ (ঠ) $a^6b^3 - 3a^4b^5c + 3a^2b^7c^2 - b^9c^3$

(ড) $x^9 - 6x^6y^3 + 12x^3y^6 - 8y^9$

(ঢ) $1331a^3 - 4356a^2b + 4752ab^2 - 1728b^3$

(ণ) $x^9 + 3x^6y^3 + 3x^3y^6 + y^9$

২। (ক) $216x^3$

(খ) $1000q^3$

(গ) $64y^3$

(ঘ) 216

(ঙ) $8x^3$

৩। 152

৫। 793

৬। 170

৭। 27

৯। 0

১০। 722

১১। 1

১৪। 140

১৫। (ক) $a^6 + b^6$

(খ) $a^3x^3 - b^3y^3$

(গ) $8a^3b^6 - 1$

(ঘ) $x^6 + a^3$

(ঙ) $343a^3 + 64b^3$

(চ) $64a^6 - 1$

(ছ) $x^6 - a^6$

(জ) $15625a^6 - 729b^6$

ଅନୁଶୀଳନୀ ୮.୭

- ୧ । $(a+2)(a^2-2a+4)$ ୨ । $(2x+7)(4x^2-14x+49)$
- ୩ । $a(2a+3b)(4a^2-6ab+9b^2)$ ୪ । $(2x+1)(4x^2-2x+1)$
- ୫ । $(4a-5b)(16a^2+20ab+25b^2)$ ୬ । $(9a-4bc^2)(81a^2+36abc^2+16b^2c^4)$
- ୭ । $b^3(3a+4c)(9a^2-12ac+16c^2)$ ୮ । $7(2x-3y)(4x^2+6xy+9y^2)$
- ୯ । $3x(1+5x)(1-5x)$ ୧୦ । $(2x+y)(2x-y)$ ୧୧ । $3a(y+4)(y-4)$
- ୧୨ । $(a-b+p)(a-b-p)$ ୧୩ । $(4y+a+3)(4y-a-3)$ ୧୪ । $a(2+p)(4-2p+p^2)$
- ୧୫ । $2(a+2b)(a^2-2ab+4b^2)$ ୧୬ । $(x-y+1)(x-y-1)$ ୧୭ । $(a-1)(a-2b+1)$
- ୧୮ । $(x+1)^2(x-1)^2$ ୧୯ । $(x-6)^2$
- ୨୦ । $(x+y)(x-y)(x^2-xy+y^2)(x^2+xy+y^2)$
- ୨୧ । $(x-y+z)(x^2+y^2-2xy-xz+yz+z^2)$
- ୨୨ । $8(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$ ୨୩ । $(x+4)(x+10)$ ୨୪ । $(x+15)(x-8)$
- ୨୫ । $(x-26)(x-25)$ ୨୬ । $(a+3b)(a+4b)$ ୨୭ । $(p+10q)(p-8q)$
- ୨୮ । $(x-8y)(x+5y)$ ୨୯ । $(x^2-x+8)(x^2-x-5)$ ୩୦ । $(a^2+b^2+4)(a^2+b^2-22)$
- ୩୧ । $(a+2)(a-2)(a+5)(a+9)$ ୩୨ । $(x+a+b)(x+2a+3b)$ ୩୩ । $(2x+3)(3x-5)$
- ୩୪ । $(x+a+1)(x-a-2)$ ୩୫ । $(x+4)(3x-1)$ ୩୬ । $(3x+2)(x-6)$
- ୩୭ । $(x-7)(2x+5)$ ୩୮ । $(x-2y)(2x-y)$ ୩୯ । $(2y-x)(7x^2-10xy+4y^2)$
- ୪୦ । $(2p+3q)(5p-2q)$ ୪୧ । $(x+y-2)(2x+2y+1)$ ୪୨ । $(x+a)(ax+1)$
- ୪୩ । $(3x-4y)(5x+3y)$ ୪୪ । $(a-2b)(a^2-ab+b^2)$

অনুশীলনী ৪.৪

৬। ক ৭। (১) (ক), (২) (খ), (৩) (ঘ)

$$৮। 18a^2c^2 \quad ৯। 5x^2y^2a^3b^2 \quad ১০। (x-3) \quad ১১। 2(x+y) \quad ১২। ab(a^2+ab+b^2)$$

$$১৩। a(a+2) \quad ১৪। a^7b^4c^3 \quad ১৫। 30a^2b^3c^3 \quad ১৬। 60x^4y^4z^2 \quad ১৭। (x+2)^2(x^3-8)$$

$$১৮। (2x-1)(3x+1)(x+2) \quad ১৯। (a-b)^2(a+b)^3(a^2-ab+b^2)^2$$

অনুশীলনী ৫.১

$$১। \quad (ক) \frac{4yz^2}{9x^3} \quad (খ) \frac{36x}{y} \quad (গ) \frac{x^2+y^2}{xy(x+y)} \quad (ঘ) \frac{a+b}{a^2+ab+b^2} \quad (ঙ) \frac{x-1}{x+5}$$

$$(চ) \frac{x-3}{x-5} \quad (ছ) \frac{x^2+xy+y^2}{(x+y)^2} \quad (জ) \frac{a-b-c}{a+b-c}$$

$$২। \quad (ক) \frac{x^2z}{xyz}, \frac{xy^2}{xyz}, \frac{yz^2}{xyz} \quad (খ) \frac{z(x-y)}{xyz}, \frac{x(y-z)}{xyz}, \frac{y(z-x)}{xyz}$$

$$(গ) \frac{x^2(x+y)}{x(x^2-y^2)}, \frac{xy(x-y)}{x(x^2-y^2)}, \frac{z(x-y)}{x(x^2-y^2)}$$

$$(ঘ) \frac{(x+y)(x^3+y^3)}{(x-y)^2(x^3+y^3)}, \frac{(x-y)^3}{(x-y)^2(x^3+y^3)}, \frac{(y-z)(x-y)(x^2-xy+y^2)}{(x-y)^2(x^3+y^3)}$$

$$(ঙ) \frac{a(a^3-b^3)}{(a^3+b^3)(a^3-b^3)}, \frac{b((a-b)(a^3+b^3))}{(a^3+b^3)(a^3-b^3)}, \frac{c(a^3+b^3)}{(a^3+b^3)(a^3-b^3)}$$

$$(চ) \frac{(x-4)(x-5)}{(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}, \frac{(x-2)(x-5)}{(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}, \frac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}$$

$$(ছ) \frac{c^2(a-b)}{a^2b^2c^2}, \frac{a^2(b-c)}{a^2b^2c^2}, \frac{b^2(c-a)}{a^2b^2c^2}$$

$$(জ) \frac{(x-y)(y+z)(z+x)}{(x+y)(y+z)(z+x)}, \frac{(y-z)(x+y)(z+x)}{(x+y)(y+z)(z+x)}, \frac{(z-x)(x+y)(y+z)}{(x+y)(y+z)(z+x)}$$

$$৩। (ক) \frac{a^2+2ab-b^2}{ab} \quad (খ) \frac{a^2+b^2+c^2}{abc} \quad (গ) \frac{3xyz-x^2y-y^2z-z^2x}{xyz}$$

$$(ঘ) \frac{2(x^2+y^2)}{x^2-y^2} \quad (ঙ) \frac{3x^2-18x+26}{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)} \quad (চ) \frac{3a^4+a^2b^2-b^4}{(a^3+b^3)(a^3-b^3)}$$

$$(ছ) \frac{2}{x-2} \quad (জ) \frac{x^6+2x^4+x^2+6}{x^8-1}$$

$$৪। (ক) \frac{ax+3a-a^2}{x^2-9} \quad (খ) \frac{x^2+y^2}{xy(x^2-y^2)} \quad (গ) \frac{2}{x^4+x^2+1} \quad (ঘ) \frac{8ab}{a^2-16b^2} \quad (ঙ) \frac{2y}{x^2-y^2}$$

$$৫। \quad (ক) 0 \quad (খ) \frac{x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx}{(y+z)(x+y)(z+x)} \quad (গ) 0 \quad (ঘ) 0$$

$$(ঙ) \frac{6xy^2}{(x^2 - y^2)(4x^2 - y^2)} \quad (চ) \frac{12x^4}{x^6 - 64} \quad (ছ) \frac{8x^4}{x^8 - 1} \quad (জ) \frac{2(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)}{(x-y)(y-z)(z-x)}$$

$$(ঝ) \frac{3a - 2b}{a^2 + b^2 - c^2 - 2ab} \quad (ঞ) \frac{2ab + 2bc + 2ca - a^2 - b^2 - c^2}{(a+b+c)(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)}$$

অনুশীলনী ৫.২

$$৭। \quad (ক) \frac{15a^2b^2c^4}{x^2y^2z^4} \quad (খ) \frac{32a^2b^2y^3z^3}{45x^4} \quad (গ) 1 \quad (ঘ) \frac{x(x-1)^3}{(x+1)^2(x^2-4x+5)} \quad (ঙ) \frac{x^2 + y^2}{(x^2 - xy + y^2)^2}$$

$$(চ) \frac{(1-b)(1-x)}{bx} \quad (ছ) \frac{(x-2)^2(x+4)}{(x-3)^2(x+3)} \quad (জ) a(a-b) \quad (ঝ) (x-y)$$

$$৮। \quad (ক) \frac{45zx^3}{8ay^2} \quad (খ) \frac{27bc}{64a} \quad (গ) \frac{9a^2b^2c^2}{x^2y^2z^2} \quad (ঘ) \frac{x}{x+y} \quad (ঙ) \frac{(a+b)^2}{(a-b)^3} \quad (চ) (x-y)^2$$

$$(ছ) (a+b)^2 \quad (জ) \frac{(x-1)(x-3)}{(x+2)(x+4)} \quad (ঝ) \frac{(x-7)}{(x+6)}$$

$$৯। \quad (ক) \frac{x^2 - y^2}{x^2 y^2} \quad (খ) -\frac{1}{x^2} \quad (গ) \frac{-2ca}{(a+b)(a+b+c)} \quad (ঘ) \frac{a}{(1-a^2)(1+a+a^2)}$$

$$(ঙ) \frac{4x^2}{x^2 - y^2} \quad (চ) 1 \quad (ছ) 1 \quad (জ) \frac{1}{2ab} \quad (ঝ) \frac{a-b}{x-y} \quad (ঞ) \frac{b}{a}$$

$$১০। \quad (ক) \frac{1}{x-3} \quad (খ) \frac{3x^2 + y^2}{2xy} \quad (গ) 1 \quad (ঘ) (a^2 + b^2)$$

অনুশীলনী ৬.১

(ক) ১। (3, 1) ২। (2, 1) ৩। (2, 2) ৪। (1, 1) ৫। (2, 3)

৬। $(a+b, b-a)$ ৭। $\left(\frac{ab}{a+b}, \frac{ab}{a+b}\right)$ ৮। $\left(\frac{ab}{a+b}, \frac{-ab}{a+b}\right)$

৯। (1, 1) ১০। (2, 3) ১১। (2, 1) ১২। (2, 3)

(খ) ১৩। (5, 1) ১৪। (2, 1) ১৫। (3, 1) ১৬। (3, 2) ১৭। (2, 3) ১৮। (2, 3)

১৯। (4, 2) ২০। $\left(\frac{b^2+ac}{a^2+b}, \frac{ab-c}{a^2+b}\right)$ ২১। (4, 3) ২২। (6, -2) ২৩। (2, 1)

২৪। (2, 3) ২৫। (6, 2) ২৬। $(a, -b)$

অনুশীলনী ৬.২

৫। 60, 40 ৬। 120, 40 ৭। 11, 13 ৮। পিতার 65 বছর ও পুত্রের বয়স 25 বছর

৯। ভগ্নাংশটি $\frac{3}{4}$ ১০। প্রকৃত ভগ্নাংশটি $\frac{3}{11}$ ১১। 37 বা 73 ১২। দৈর্ঘ্য 50 মিটার এবং প্রস্থ 25 মিটার

১৩। খাতার মূল্য 16 টাকা ও পেন্সিলের মূল্য 6 টাকা

১৪। 4000 টাকা ও 1000 টাকা।

১৫। (ক) (4, 2) (খ) (3, 2) (গ) (5, 3) (ঘ) (5, -2) (ঙ) (-5, -5) (চ) (2, 1)

অনুশীলনী ৭

৬। (ক) $\{5, 7, 9, 11, 13\}$ (খ) $\{2, 3\}$ (গ) $\{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33\}$ (ঘ) $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ৭। (ক) $\{x : x \text{ স্বাভাবিক সংখ্যা এবং } 2 < x < 9\}$ (খ) $\{x : x, 4 \text{ -এর গুণিতক এবং } x < 28\}$ (গ) $\{x : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 5 < x < 19\}$ ৮। (ক) $\{1, 2, 3, a\}$ (খ) $\{a\}$ (গ) $\{2\}$ (ঘ) $\{1, 2, 3, a, b\}$ (ঙ) $\{2, a\}$ ১০। $\{1, 3, 5, 7, 21, 35\}$

অনুশীলনী ৮.১

১৮। 340 বর্গ সে.মি.

১৯। 253.5 বর্গ সে.মি.

অনুশীলনী ১০.৩

৪। (ক) 62.8 সে.মি. (প্রায়) (খ) 87.92 সে.মি. (প্রায়) (গ) 131.88 সে.মি. (প্রায়)

৫। 24.5 সে.মি. ; 886.5 সে.মি. (প্রায়) ৬। 4752 টাকা ৮। 598.86 বর্গ সে.মি. (প্রায়)

৯। 466.29 বর্গ সে.মি.

অনুশীলনী ১১

- ১। (ক) ৭৫ (খ) ৭৫.০২ (গ) ০.০২ ২। ২৩.৩১ প্রায় ৩। ২২৩০.৩৩ টাকা
- ৪। গড় ১৫০.৪৩ টাকা, মধ্যক ১৫০ টাকা, প্রচুরক ১৪০ ও ১৫৬ টাকা ৫। গড় ১১.৪৪ বছর
- ৬। গড় ৬৬.৬৫ টাকা ৭। (ক) ৭ (গ) ৫৫.৮৩ (প্রায়) ৮। (খ) ৬৯.৭
- ১০। বাংলায় ১৮০ জন, ইংরেজিতে ৬০ জন, গণিতে ১০০ জন, বিজ্ঞানে ১২০ জন, ধর্মে ১৬০ জন, সংগীতে ১০০ জন।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম শ্রেণি : গণিত

বিদ্যা পরম ধন।

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।